

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### FLUOXETINA EUROGENERICI 20 mg compresse orodispersibili

Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è FLUOXETINA EUROGENERICI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere FLUOXETINA EUROGENERICI
3. Come prendere FLUOXETINA EUROGENERICI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FLUOXETINA EUROGENERICI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è FLUOXETINA EUROGENERICI e a cosa serve**

FLUOXETINA EUROGENERICI contiene il principio attivo fluoxetina cloridrato che appartiene ad un gruppo di medicinali antidepressivi chiamati inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).

Questo medicinale è utilizzato per trattare le seguenti condizioni:

- per attenuare i sintomi della depressione maggiore;
- per trattare i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo, un disturbo comportamentale caratterizzato da pensieri ossessivi e ripetitivi;
- un disturbo alimentare chiamato bulimia nervosa. Insieme alla psicoterapia aiuta a ridurre i comportamenti tipici di questa malattia (abbuffate e condotte di eliminazione).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere FLUOXETINA EUROGENERICI**

##### **Non prenda FLUOXETINA EUROGENERICI**

- se è allergico alla fluoxetina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se sta assumendo altri medicinali usati per trattare la depressione, noti come inibitori delle monoaminoossidasi (IMAO non selettivi irreversibili, ad esempio iproniazide) poiché possono verificarsi reazioni gravi e talvolta fatali;
- se sta assumendo metoprololo, un medicinale utilizzato per trattare alcuni disturbi del cuore (insufficienza cardiaca).

Il trattamento con fluoxetina deve essere iniziato solo 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con un IMAO irreversibile (come ad esempio tranilcipromina). Tuttavia il trattamento con fluoxetina può essere iniziato il

giorno seguente l'interruzione del trattamento con alcuni IMAO chiamati IMAO reversibili di Tipo A (come ad esempio moclobemide).

**Non prenda** un IMAO per almeno 5 settimane dopo la sospensione del trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI.

Se FLUOXETINA EUROGENERICI le è stato prescritto per un lungo periodo di tempo o ad alte dosi, è necessario che il medico tenga presente un intervallo di tempo più lungo.

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere FLUOXETINA EUROGENERICI se si trova in una di queste condizioni:

- se presenta una reazione cutanea o altre manifestazioni di natura allergica. In questo caso smetta subito di prendere il medicinale e contatti immediatamente il suo medico;
- se soffre o ha sofferto di convulsioni. Se ha una crisi convulsiva o va incontro ad un aumento nella frequenza delle convulsioni, contatti immediatamente il medico; può essere necessario interrompere l'assunzione di questo medicinale;
- se soffre o ha sofferto in passato di disturbi dell'umore e del comportamento (mania/ipomania). Se ha un episodio di mania, contatti immediatamente il medico perché può essere necessario interrompere l'assunzione di questo medicinale;
- se soffre di problemi al fegato o ai reni, il medico può decidere di aggiustare il dosaggio;
- se soffre o qualcuno della sua famiglia ha sofferto di problemi al cuore (sindrome congenita del QT lungo, prolungamento del tratto QT, infarto del miocardio acuto, insufficienza cardiaca scompensata, bradicardia); se durante il trattamento con questo medicinale si verificano disturbi del battito del cuore (aritmie cardiache). In questo caso contatti il suo medico e interrompa il trattamento;
- se manifesta riduzione dei livelli di potassio (ipopotassiemia) o di magnesio (ipomagnesemia) nel sangue,
- se soffre di diabete, il medico può decidere di aggiustare il dosaggio di insulina o di un altro trattamento antidiabetico;
- se sviluppa necessità di muoversi in continuazione (acatisia), questo disturbo potrebbe manifestarsi durante le prime settimane di trattamento. Potrebbe essere indicato un adattamento del dosaggio;
- se nota la comparsa di lesioni della pelle sanguinanti, lividi (ecchimosi) e macchie rosse puntiformi (porpora) o se in passato ha sofferto di sanguinamenti;
- se sta prendendo altri medicinali che migliorano la fluidità del sangue, medicinali per il trattamento della depressione (IMAO) o per il trattamento di alcuni tumori (tamoxifene), (vedere i paragrafi "Non prenda FLUOXETINA EUROGENERICI" e "Altri medicinali e FLUOXETINA EUROGENERICI");
- se soffre di pressione alta all'interno dell'occhio o rischia di sviluppare questa malattia (aumentata pressione intraoculare, glaucoma acuto ad angolo chiuso);
- se si deve sottoporre o è già in cura con una terapia elettroconvulsiva (ECT).

Interrompa immediatamente il trattamento con questo medicinale ed informi il medico se manifesta febbre, rigidità muscolare o tremore, modificazioni del suo stato mentale come stato confusionale, irritabilità, agitazione estrema, delirio. Questi possono essere i sintomi di una malattia chiamata sindrome serotoninergica, che sebbene si manifesti raramente, può dare luogo a coma e condizioni potenzialmente pericolose per la vita.

## **Pensieri di suicidio e peggioramento della sua depressione o del suo disturbo d'ansia**

Nel corso delle prime settimane di trattamento o in quelle immediatamente successive, soprattutto se soffre di altri problemi della mente (patologie psichiatriche), può avere pensieri autolesivi e pensare di farsi del male o di suicidarsi. Per tale motivo, il medico deve tenerla sotto stretto controllo, specialmente all'inizio del trattamento o quando la dose viene aumentata, se in passato ha già manifestato questi disturbi e se è giovane (età inferiore a 25 anni). Informi immediatamente il medico se avverte questi disturbi o se qualcuno che si prende cura di lei nota cambiamenti nel suo comportamento. Può essere d'aiuto informare un parente o un buon amico che lei soffre di depressione o di un disturbo d'ansia e chiedere loro di leggere questo foglio illustrativo. Può chiedere loro di dirle se pensano che la sua depressione o la sua ansia stiano peggiorando o se sono preoccupati per qualche cambiamento nel suo comportamento.

## **Bambini e adolescenti**

FLUOXETINA EUROGENERICI **NON deve essere** usato nel trattamento di bambini ed adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Questo medicinale può essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni solo per il trattamento degli episodi di depressione maggiore di grado moderato o grave (in associazione con la psicoterapia) e non deve essere usato per trattare altre situazioni. Si deve prestare molta attenzione all'uso di questo medicinale nei pazienti di età inferiore a 18 anni, perché possono presentare un aumento del rischio di disturbi emotivi come il tentativo di suicidio, pensieri suicidari ed atteggiamento ostile (soprattutto comportamento aggressivo, oppositivo e ira); informi il medico se nota uno qualsiasi di questi sintomi. Inoltre, in questo gruppo di età sono disponibili solo informazioni limitate per quanto concerne la sicurezza nel lungo termine sulla crescita, sulla pubertà, sullo sviluppo mentale, emotivo e comportamentale.

## **Altri medicinali e FLUOXETINA EUROGENERICI**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Questo medicinale può influenzare il meccanismo di azione di altri medicinali.

Prenda questo medicinale **con cautela** ed informi il medico se sta assumendo:

- altri medicinali usati per il trattamento della depressione come gli inibitori delle monoamino ossidasi -IMAO non selettivi, irreversibili (ad esempio **iproniazide**) non devono essere usati in associazione a questo medicinale (vedere paragrafo "Non prenda FLUOXETINA EUROGENERICI "). Gli IMAO di Tipo A (quali **linezolid** e **metiltionio cloruro**) possono essere utilizzati solo in caso di assoluta necessità e sotto stretto controllo del medico che le prescriverà la dose più bassa possibile. Gli IMAO di Tipo B (quali la **selegilina**) possono essere usati con FLUOXETINA EUROGENERICI purché il medico la mantenga sotto stretto controllo, poiché possono verificarsi reazioni gravi e talvolta letali (sindrome serotoninergica (vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni");
- **metoprololo**, un medicinale utilizzato per trattare alcuni disturbi del cuore (insufficienza cardiaca, vedere paragrafo "Non prenda FLUOXETINA EUROGENERICI");
- **tamoxifene**, un medicinale utilizzato per il trattamento di alcuni tumori;
- medicinali usati per la cura dell'epilessia come **fenitoina**, **carbamazepina**, **oxcarbazepina**;

- medicinali usati per trattare l'ansia come l'**alprazolam** e il **diazepam**;
- medicinali usati per trattare disturbi della mente come **aloperidolo, clozapina, pimozide, risperidone butirrofenoni, fenotiazine**;
- altri medicinali usati per trattare la depressione come **imipramina, desipramina, telegilina bupropione e triptofano**;
- **tramadolo**, un medicinale usato per il trattamento del dolore;
- medicinali usati per mal di testa cronico (**triptani**);
- medicinali contenenti **litio**, usati per trattare i disturbi della mente;
- medicinali usati per problemi del battito del cuore (antiaritmici) come **flecainide, encainide propafenone**;
- **nebivololo**, un medicinale utilizzato per trattare problemi al cuore o la pressione del sangue alta;
- **warfarin** o altri medicinali usati per fluidificare il sangue;
- **acido acetilsalicilico** e altri medicinali antiinfiammatori (FANS);
- medicinali utilizzati per trattare le infezioni come **sparfloxacin, moxifloxacin, eritromicina IV e pentamidina**;
- medicinali utilizzati per trattare la malaria come l'**alofantrina, cloroquina e meflochina**;
- medicinali antistaminici utilizzati per trattare le allergie come **astemizolo, mizolastina, meclizina ciproheptadina**;
- **atomoxetina**, un medicinale utilizzato per trattare alcuni disturbi del comportamento;
- medicinali utilizzati per trattare la pressione del sangue alta (**diuretici**);
- **desmopressina**, un medicinale utilizzato per trattare il diabete;
- **terapia elettroconvulsiva (ECT)**;
- prodotti erboristici contenenti l'Erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*).

## **FLUOXETINA EUROGENERICI e alcol**

Non beva alcol durante il trattamento con questo medicinale.

## **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda questo medicinale se è in corso una gravidanza, se non in caso di assoluta necessità, perché può causare gravi problemi al suo bambino.

Quando assunto durante la gravidanza, in particolare negli ultimi 3 mesi di gravidanza, medicinali come FLUOXETINA EUROGENERICI possono aumentare il rischio di una grave condizione nei bambini, chiamata ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN), che fa respirare il bambino più velocemente e lo fa apparire bluastro. Questi sintomi di solito si manifestano durante le prime 24 ore dalla nascita del bambino. Se ciò accade al suo bimbo, deve contattare immediatamente l'ostetrica e/o il medico.

Se ha assunto questo medicinale durante le ultime fasi della gravidanza, il suo bambino può manifestare irritabilità, tremore, alterazione del tono muscolare (ipotonia), pianto continuo, difficoltà a dormire o a succhiare.

FLUOXETINA EUROGENERICI è escreta nel latte materno e questo può causare problemi al bambino.

Se il trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI è ritenuto necessario, deve essere presa in considerazione la sospensione dell'allattamento al seno;

comunque, se l'allattamento al seno viene continuato, deve essere prescritta la più bassa dose efficace di fluoxetina.

Questo medicinale può influire sulla qualità dello sperma. L'effetto scompare con l'interruzione del trattamento (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati").

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari perché può ridurre la capacità di giudizio e la reattività in situazioni di pericolo. Pertanto, faccia attenzione prima di mettersi alla guida o di utilizzare macchinari.

### **FLUOXETINA EUROGENERICI contiene sorbitolo**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come prendere FLUOXETINA EUROGENERICI**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

FLUOXETINA EUROGENERICI può essere somministrata in dose singola o frazionata, durante o lontano dai pasti. Lasci sciogliere la compressa in bocca senza masticarla oppure la sciogla in acqua, diluendo a piacere.

Il medico regolerà la dose in base alle sue esigenze. Non modifichi la dose senza aver consultato il medico (vedere paragrafo "Se interrompe il trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI").

### **Trattamento di episodi di depressione maggiore**

La **dose raccomandata**, per adulti e anziani, è di 20 mg al giorno. Se necessario il medico rivedrà e aggiusterà il dosaggio entro 3-4 settimane dall'inizio della terapia. La dose può essere aumentata fino ad un massimo di 60 mg al giorno. Variazioni del dosaggio devono essere effettuate con attenzione, per assicurarsi che lei assuma la più bassa dose efficace. Potrebbe non sentirsi bene subito all'inizio del trattamento per la depressione. Solitamente questo è dovuto al fatto che un miglioramento dei sintomi depressivi potrebbe non verificarsi fino a dopo le prime settimane. I pazienti con depressione devono essere trattati per almeno 6 mesi.

### **Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo**

La **dose raccomandata**, per adulti e anziani, è di 20 mg al giorno. Se necessario, il medico rivaluterà il dosaggio se dopo 2 settimane non si notano miglioramenti. Il dosaggio può essere gradualmente aumentato fino ad un massimo di 60 mg al giorno. Variazioni del dosaggio devono essere effettuate con attenzione, per assicurarsi che lei assuma la più bassa dose efficace. Se entro 10 settimane non si osserva alcun miglioramento, il suo medico riconsidererà il suo trattamento.

### **Trattamento della bulimia nervosa**

La **dose raccomandata**, per adulti e anziani, è di 60 mg al giorno.  
**Se prende più FLUOXETINA EUROGENERICI di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di FLUOXETINA EUROGENERICI, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

I sintomi del sovradosaggio sono nausea, vomito, convulsioni, problemi al cuore (disfunzione cardiovascolare variabile dall'aritmia asintomatica all'arresto cardiaco), problemi respiratori (disfunzione polmonare) e disturbi della mente variabili dall'agitazione al coma. Molto raramente si sono verificati casi di morte.

### **Se dimentica di prendere FLUOXETINA EUROGENERICI**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

### **Se interrompe il trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI**

**Non interrompa** il trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI improvvisamente o senza prima averlo concordato con il medico.

Alla sospensione del trattamento con questo medicinale possono manifestarsi i seguenti **sintomi da sospensione**: capogiro, disturbi della sensibilità come sensazione di formicolio alle braccia e alle gambe (parestesie, sensazione di scossa elettrica), disturbi del sonno come incapacità a prendere sonno (insonnia) e sogni che sembrano reali (sogni vividi), insolita stanchezza o debolezza (astenia), agitazione o ansia, nausea, vomito, diarrea, mal di testa (cefalea), tremore, sudorazione, sensazione di un aumento dei battiti del cuore (palpitazioni), instabilità emotiva, irritabilità, disturbi della vista.

Questi sintomi si manifestano entro i primi giorni dall'interruzione del trattamento e generalmente si risolvono entro 2 settimane, anche se in alcuni soggetti possono essere prolungati (2-3 mesi o più).

L'interruzione brusca deve essere evitata. Quando smette di prendere FLUOXETINA EUROGENERICI, il medico l'aiuterà a ridurre la dose gradatamente nell'arco di alcune settimane o mesi, ciò dovrebbe aiutare a ridurre la probabilità di comparsa di effetti da sospensione.

Se dovesse osservare la comparsa di questi sintomi al momento dell'interruzione del trattamento, contatti il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati si manifestano soprattutto all'inizio della terapia, per poi successivamente scomparire.

Se durante il trattamento pensa di farsi del male o ha pensieri di suicidio, si **rivolga immediatamente al medico** ed interrompa l'assunzione del medicinale.

Possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati:

**Molto comuni** (possono interessare più di 1 persona su 10):

- problemi del sonno (insonnia);
- diarrea, nausea;
- mal di testa (cefalea);
- affaticamento.

**Comuni**(possono interessare fino a 1 persona su 10)

- diminuzione dell'appetito (inclusa anoressia);
- ansia, nervosismo, irrequietezza, tensione, diminuzione del desiderio sessuale, disturbi del sonno (sogni anomali);
- disturbo dell'attenzione, capogiri, alterazione del gusto (disgeusia), eccessiva stanchezza (letargia), sonnolenza, tremori;
- visione offuscata;
- sensazione di un aumento dei battiti del cuore (palpitazioni);
- arrossamento;
- sbadiglio;
- vomito, problemi alla digestione (dispepsia), bocca secca;
- irritazioni della pelle (eruzione cutanea, orticaria), prurito, eccessiva sudorazione (iperidrosi);
- dolore alle articolazioni (artralgia);
- frequente necessità di urinare (minzione frequente);
- sanguinamento della vagina, problemi sessuali nell'uomo (disfunzione erettile, disturbi dell'eiaculazione);
- stato di agitazione, brividi;
- perdita di peso.

**Non comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- disturbi della concentrazione e del processo cognitivo (depersonalizzazione), disturbi dell'umore (umore "alto", euforia), pensieri anomali, orgasmo anomalo; digrignamento dei denti (bruxismo); pensieri e comportamento suicidario;
- movimenti eccessivi e involontari (iperattività psicomotoria, mioclono); disturbi del movimento (discinesia, atassia); disturbo dell'equilibrio, problemi di memoria;
- dilatazione della pupilla (midriasi);
- percezione di ronzii nelle orecchie (tinnito);
- abbassamento della pressione del sangue (ipotensione);
- problemi di respirazione (dispnea);
- perdita di sangue dal naso (epistassi);
- problemi a deglutire (disfagia), sanguinamento a livello di stomaco e intestino (emorragia gastrointestinale);
- perdita di peli e capelli (alopecia); aumentata tendenza alla formazione di lividi, sudore freddo;
- contrazioni involontarie dei muscoli (spasmi muscolari);
- emissione difficoltosa di urina (disuria);
- problemi sessuali;
- sensazione di malessere, di anormalità, di caldo o di freddo.

**Rari**(possono interessare fino a 1 persona su 1000)

- riduzione del numero di piastrine nel sangue (trombocitopenia);
- riduzione dei globuli bianchi nel sangue (neutropenia, leucopenia);
- gravi reazioni allergiche (reazione anafilattica, malattia da siero);
- secrezione inappropriata dell'ormone che regola la produzione di urina (ormone antidiuretico);
- riduzione dei livelli di sodio nell'organismo (iponatriemia);
- disturbi dell'umore (ipomania, mania), vedere e sentire cose che non esistono (allucinazioni), agitazione, attacchi di panico, confusione, disturbi del linguaggio (disfemia), aggressività;
- convulsioni, irrequietezza e necessità di muoversi continuamente (acatisia), sindrome buccoglossale, sindrome serotoninergica, che si manifesta con sintomi quali: febbre, rigidità muscolare o tremore, modificazioni del suo

- stato mentale come stato confusionale, irritabilità ed agitazione estrema (vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni");
- disturbi del ritmo con cui batte il cuore (aritmia ventricolare, torsioni di punta, prolungamento del tratto QT);
  - infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite), dilatazione dei vasi sanguigni (vasodilatazione);
  - infiammazione della faringe (faringite), problemi ai polmoni (processi infiammatori di istopatologia variabile e/o fibrosi);
  - dolore all'esofago;
  - infiammazione del fegato (epatite idiosincronica);
  - gonfiore del viso della bocca e della lingua (angioedema), formazione di lividi, reazioni cutanee causate da esposizione al sole (reazione di fotosensibilità), macchie rosse puntiformi (porpora), reazioni gravi della pelle come eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, sindrome di Lyell;
  - dolore ai muscoli (mialgia);
  - difficoltà ad urinare (ritenzione urinaria, disturbo della minzione);
  - erezione prolungata e dolorosa (priapismo), improvvisa produzione di latte dal seno (galattorrea), nell'uomo; aumento dei livelli di prolattina (iperprolattinemia);
  - sanguinamento delle mucose;
  - aumento dei livelli di enzimi prodotti dal fegato (aumento dei livelli di transaminasi e della gamma-glutamilttransferasi).

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili)

- tic nervosi, agitazione psicomotoria;
- problemi al cuore (angina pectoris, blocco atrioventricolare di 1° grado);
- aumento della pressione del sangue (ipertensione);
- abbassamento della concentrazione di glucosio nel sangue (ipoglicemia);
- aumento del rischio di fratture ossee, in seguito all'assunzione con altri medicinali usati per il trattamento della depressione chiamati antidepressivi triciclici (TCA);
- sintomi da sospensione (vedere paragrafo "Se interrompe il trattamento con FLUOXETINA EUROGENERICI").

### **Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini e negli adolescenti**

- comportamenti correlati al suicidio (tentativo di suicidio e pensieri suicidari);
- atteggiamento ostile (sono stati segnalati i seguenti eventi: rabbia, irritabilità, aggressività, agitazione, sindrome da attivazione), reazioni maniacali, incluse mania e ipomania;
- perdita di sangue dal naso (epistassi);
- ritardo della crescita;
- ritardata maturazione sessuale o una disfunzione sessuale;
- alterazione dei fosfati del sangue (fosfatasi alcalina).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l' Agenzia Italiana del Farmaco - Sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare FLUOXETINA EUROGENERICI**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.



Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene FLUOXETINA EUROGENERICI**

- Il principio attivo è fluoxetina cloridrato. Ogni compressa contiene 20 mg di fluoxetina (come fluoxetina cloridrato).
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, mannitolo, sorbitolo, aroma di anice, aroma di menta, silice colloidale, amido di mais, sodio stearil fumarato, povidone.

### **Descrizione dell'aspetto di FLUOXETINA EUROGENERICI e contenuto della confezione**

Astuccio da 12 o 28 compresse orodispersibili.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano

### **Produttore**

SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. - Strada Paduni 240 - 03012 Anagni (FR)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**