

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **POTASSIO CANRENOATO EG 100 mg compresse rivestite con film**

#### **Medicinale equivalente**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è POTASSIO CANRENOATO EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO EG
3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è POTASSIO CANRENOATO EG e a cosa serve**

POTASSIO CANRENOATO EG contiene il principio attivo potassio canrenoato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati diuretici risparmiatori del potassio che agiscono contrastando l'azione dell'aldosterone, che regola i livelli di sodio, di potassio e il volume dei liquidi nell'organismo.

POTASSIO CANRENOATO EG viene usato per trattare:

- elevati livelli di aldosterone nel sangue (iperaldosteronismo primario);
- disturbi causati da un accumulo di liquidi nell'organismo (stati edematosi) da iperaldosteronismo secondario come problemi al cuore (scompenso cardiaco congestizio), malattie al fegato (cirrosi epatica in fase ascitica) o ai reni (sindrome nefrosica);
- pressione alta del sangue (ipertensione arteriosa essenziale), nel caso in cui altre terapie non siano efficaci o tollerate.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere POTASSIO CANRENOATO EG**

##### **Non prenda POTASSIO CANRENOATO EG**

- se è allergico al potassio canrenoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha gravi problemi ai reni (insufficienza renale acuta e cronica);
- se non riesce a urinare (anuria);
- se ha elevati livelli di potassio nel sangue (iperpotassiemia);
- se ha bassi livelli di sodio nel sangue (iposodiemia).

## **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere POTASSIO CANRENOATO EG

Durante il trattamento con questo medicinale, e prima di un intervento chirurgico, il medico le prescriverà degli esami per controllare i livelli di sali minerali nel sangue, perché possono manifestarsi aumenti dei livelli di potassio (iperpotassiemia), di azoto (azotemia) o delle sostanze acide nel sangue (acidosi metabolica) oppure di una riduzione dei livelli di sodio (iposodiemia). Il medico deciderà se interrompere la terapia in caso di alterazioni importanti dei livelli dei sali nel sangue.

Eviti di assumere alimenti ricchi di potassio durante il trattamento con questo medicinale.

**Per chi svolge attività sportiva:** l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

## **Bambini**

Nella primissima infanzia questo medicinale va somministrato solamente in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico.

## **Altri medicinali e POTASSIO CANRENOATO EG**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

POTASSIO CANRENOATO EG se assunto contemporaneamente ai seguenti farmaci può potenziarne l'effetto::

- medicinali usati per abbassare la pressione del sangue (antipertensivi);
- medicinali che bloccano i gangli, ossia i centri nervosi periferici (medicinali ganglioplegici)

In questi casi il medico può valutare un aggiustamento della dose

La somministrazione contemporanea di POTASSIO CANRENOATO EG con medicinali usati per alleviare il dolore e l'infiammazione (acido acetilsalicilico e suoi derivati) riduce l'attività diuretica (di produzione dell'urina) .

## **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Se è in corso una gravidanza il medicinale le sarà prescritto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico, che valuterà se i benefici per lei sono superiori ai rischi per il feto.

Questo medicinale non deve essere usato durante l'allattamento.

## **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **POTASSIO CANRENOATO EG contiene lattosio**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale

### **3. Come prendere POTASSIO CANRENOATO EG**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La **dose raccomandata** va da 50 mg (mezza compressa) a 200 mg (2 compresse) al giorno, in relazione al tipo e alla gravità della malattia, secondo prescrizione medica.

#### **Uso nei pazienti anziani**

Nei pazienti anziani, la dose deve essere attentamente stabilita dal medico, che valuterà un'eventuale riduzione del dosaggio.

#### **Se prende più POTASSIO CANRENOATO EG di quanto deve**

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, informi immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Alle dosi raccomandate non sono noti casi di sovradosaggio.

#### **Se dimentica di prendere POTASSIO CANRENOATO EG**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati: nausea, dolori addominali (crampi);

- sonnolenza;

Occasionalmente con l'uso di medicinali contenenti sostanze simili al potassio canrenoato, sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati, tutti generalmente reversibili con l'interruzione del trattamento.:

- reazioni allergiche della pelle come eruzioni cutanee;
- aumento della temperatura corporea;
- perdita della coordinazione muscolare (atassia);
- crescita del seno nell'uomo (ginecomastia) e ciclo mestruale irregolare nelle donne;
- crescita di peli nelle donne (irsutismo);
- alterazione transitoria del desiderio sessuale (disturbi della libido).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli

effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare POTASSIO CANRENOATO EG**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene POTASSIO CANRENOATO EG**

- Il principio attivo è potassio canrenoato. Ogni compressa contiene 100 mg di potassio canrenoato.
- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, lattosio, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato, silice precipitata.
- I componenti del film di rivestimento sono: idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 4000, talco, titanio diossido (E171).

### **Descrizione dell'aspetto di POTASSIO CANRENOATO EG e contenuto della confezione**

Confezioni da 20 compresse rivestite con film.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

EG S.p.A. - Via Pavia,6 - 20136 Milano - Italia.

### **Produttore**

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. - Via R. Follereau, 25 - 24027 Nembro (BG) - Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**