

## Foglio illustrativo: Informazioni per il paziente

**ROSUVASTATINA EG 5 mg compresse rivestite con film**  
**ROSUVASTATINA EG 10 mg compresse rivestite con film**  
**ROSUVASTATINA EG 20 mg compresse rivestite con film**  
**ROSUVASTATINA EG 40 mg compresse rivestite con film**

Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di iniziare a prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è ROSUVASTATINA EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ROSUVASTATINA EG
3. Come prendere ROSUVASTATINA EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ROSUVASTATINA EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Che cos'è ROSUVASTATINA EG e a cosa serve**

ROSUVASTATINA EG contiene il principio attivo rosuvastatina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati statine.

#### **ROSUVASTATINA EG le è stato prescritto perché:**

- i suoi livelli di colesterolo sono alti. Questo implica che lei è a rischio per infarto o ictus.

Le è stato consigliato di prendere una statina perché la variazione della dieta e maggiore esercizio fisico non sono stati sufficienti a correggere i livelli di colesterolo. Deve continuare a seguire la sua dieta a basso contenuto di colesterolo e svolgere esercizio fisico durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG.

oppure

- mostra altri fattori che la rendono maggiormente a rischio di sviluppare infarto, ictus o problemi di salute correlati.

Infarto, ictus e altri problemi possono essere causati da una malattia detta arteriosclerosi. L'aterosclerosi è dovuta all'accumulo di depositi grassi nelle arterie.

## **Perché è importante continuare a prendere ROSUVASTATINA EG**

ROSUVASTATINA EG è usato per correggere i livelli delle sostanze grasse nel sangue chiamate lipidi, tra le quali la più comune è il colesterolo.

Diversi tipi di colesterolo sono riscontrabili nel sangue - il colesterolo "cattivo" (LDL-C) e il colesterolo "buono" (HDL-C).

- ROSUVASTATINA EG può ridurre i livelli di colesterolo "cattivo" ed aumentare i livelli del colesterolo "buono".
- Agisce contribuendo a bloccare la produzione del colesterolo "cattivo" da parte dell'organismo. Migliora inoltre la capacità del suo corpo a rimuoverlo dal sangue.

Nella maggior parte delle persone gli effetti del colesterolo elevato non vengono percepiti poiché questa condizione non è associata ad alcun sintomo. Se tuttavia tale condizione non viene trattata, possono accumularsi depositi di grasso alle pareti dei vasi sanguigni causandone il restringimento.

Questo restringimento può causare talvolta un blocco del flusso sanguigno a cuore e cervello e di conseguenza causare un attacco cardiaco o un ictus. Riducendo i livelli di colesterolo si riduce il rischio di infarto, ictus o di problemi di salute correlati.

Deve **continuare a prendere ROSUVASTATINA EG** anche dopo che sono stati raggiunti i livelli di colesterolo desiderati, poiché esso **impedisce ai livelli di colesterolo di risalire nuovamente** e causare l'accumulo dei depositi di grasso. Deve tuttavia sospendere il trattamento se il medico lo prescrive o se resta incinta.

## **2. Cosa deve sapere prima di prendere ROSUVASTATINA EG**

### **Non prenda ROSUVASTATINA EG:**

- **Se ha avuto una reazione allergica alla rosuvastatina** o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- **Se è incinta** o sta allattando il suo bambino al seno. Se resta incinta durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG **smetta immediatamente di prenderlo e si rivolga al medico**. Le donne devono evitare di rimanere incinte durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG impiegando opportuni metodi contraccettivi.
- **Se ha una malattia del fegato.**
- **Se soffre di gravi problemi renali.**
- **Se soffre ripetutamente di inspiegabili dolori muscolari.**
- **Se prende un medicinale chiamato ciclosporina** (usato, ad esempio, in seguito ad un trapianto di organo).

Se una delle situazioni sopra indicate la riguarda (o ha dei dubbi al riguardo), **si rivolga nuovamente al medico**.

### **Non prenda inoltre ROSUVASTATINA EG 40 mg (il dosaggio più alto):**

- **Se ha problemi renali di moderata intensità** (nel dubbio consulti il medico).

- **Se la sua tiroide** non funziona correttamente.
- **Se ha precedenti di ripetuti o inspiegabili dolori muscolari**, una storia personale o familiare di problemi muscolari o precedenti di problemi muscolari associati all'assunzione di altri medicinali ipocolesterolemici.
- Se beve regolarmente grandi quantità di alcool.
- **Se lei è di origine asiatica** (giapponese, cinese, filippino, vietnamita, coreano e indiano).
- Se assume altri medicinali detti fibrati **per abbassare il colesterolo**.

Se una delle situazioni sopra indicate la riguarda (o ha dei dubbi al riguardo), **si rivolga nuovamente al medico**.

### **Avvertenze e precauzioni**

Prima di prendere questo medicinale consulti il medico o il farmacista.

- **Se ha problemi ai reni.**
- **Se ha problemi al fegato.**
- **Se ha precedenti di ripetuti o inspiegabili dolori muscolari**, una storia personale o familiare di problemi muscolari o precedenti di problemi muscolari associati all'assunzione di altri medicinali ipocolesterolemici. Segnali immediatamente al medico la comparsa di inspiegabili dolori muscolari, soprattutto se associati a malessere o febbre. Comunichi inoltre al medico o al farmacista se soffre di una persistente debolezza muscolare.
- **Se beve regolarmente grandi quantità di alcool.**
- **Se la sua tiroide** non funziona correttamente.
- **Se assume altri medicinali detti fibrati** per abbassare il colesterolo. Legga attentamente questo foglio illustrativo anche se ha già assunto in passato altri medicinali ipocolesterolemici.
- **Se prende farmaci per il trattamento dell'infezione da HIV**, ad esempio ritonavir con lopinavir e/o atazanavir, consulti il paragrafo "Altri medicinali e ROSUVASTATINA EG".

### **Bambini e adolescenti**

- **Se il paziente ha meno di 10 anni:** ROSUVASTATINA EG non deve essere somministrato a bambini con meno di 10 anni.
- **Se il paziente ha meno di 18 anni:** ROSUVASTATINA EG 40 mg non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.
- **Se ha più di 70 anni** (poiché il medico deve stabilire l'esatta dose iniziale di ROSUVASTATINA EG adatta per lei).
- **Se soffre di una grave insufficienza respiratoria.**
- **Se lei è di origine asiatica** - vale a dire giapponese, cinese, filippino, vietnamita, coreano e indiano. Il medico deve stabilire l'esatta dose iniziale di ROSUVASTATINA EG adatta a lei.

Se una qualsiasi delle condizioni sopra la riguarda (o se ha dei dubbi al riguardo):

**Non prenda ROSUVASTATINA EG 40 mg (dosaggio più alto) e consulti il medico o il farmacista prima di prendere qualsiasi dosaggio di ROSUVASTATINA EG.**

In un piccolo numero di persone le statine possono compromettere la funzionalità del fegato. Questo può essere verificato tramite un semplice test che determina l'eventuale aumento dei livelli degli enzimi epatici nel sangue.

Per questa ragione il medico eseguirà questo esame del sangue (test di funzionalità epatica) di solito prima e durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG.

Durante il trattamento con questo medicinale il medico la terrà sotto attento controllo se lei soffre di diabete o è a rischio di sviluppare questa malattia. Alti livelli di zuccheri e grassi nel sangue, essere sovrappeso e la pressione alta sono condizioni per cui si è probabilmente a rischio di sviluppare il diabete.

### **Altri medicinali e ROSUVASTATINA EG**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali: ciclosporina (usata per esempio, in seguito ad un trapianto di organi), warfarin (o qualsiasi altro medicinale usato per fluidificare il sangue), fibrati (come gemfibrozil, fenofibrato) o qualsiasi altro medicinale usato per abbassare il colesterolo (come ezetimibe), rimedi contro l'indigestione (per neutralizzare l'acido nello stomaco), eritromicina (un antibiotico), un contraccettivo orale (pillola), terapia ormonale sostitutiva o ritonavir con lopinavir e/o atazanavir (usati per trattare l'infezione da HIV - vedere "Avvertenze e precauzioni"). Gli effetti di questi medicinali possono essere alterati da ROSUVASTATINA EG o, al contrario, possono alterare l'effetto di ROSUVASTATINA EG.

### **Gravidanza e allattamento**

**Non prenda ROSUVASTATINA EG** se è incinta o sta allattando il suo bambino al seno. Se resta incinta durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG **smetta immediatamente di prenderlo** e si rivolga al medico. Le donne devono evitare di rimanere incinte durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG impiegando opportuni metodi contraccettivi.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

La maggior parte delle persone possono mettersi alla guida di veicoli e operare su macchinari durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG, che non comprometterà la loro capacità a svolgere queste attività. Alcune persone possono tuttavia manifestare vertigini durante il trattamento con ROSUVASTATINA EG. Se accusa vertigini, si rivolga al medico prima di mettersi alla guida o utilizzare macchinari.

### **ROSUVASTATINA EG contiene lattosio**

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri (lattosio o zucchero del latte), si rivolga al medico prima di prendere ROSUVASTATINA EG.

**Per l'elenco completo degli eccipienti vedere il paragrafo "Contenuto della confezione e altre informazioni".**

## **3. Come prendere ROSUVASTATINA EG**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

## **Dosi abituali negli adulti**

### **Se sta prendendo ROSUVASTATINA EG per ridurre alti livelli di colesterolo:**

#### **Dose iniziale**

Il trattamento con ROSUVASTATINA EG deve iniziare con una dose di 5 mg o 10 mg, anche se ha preso una dose maggiore di una diversa statina in precedenza. La scelta della dose iniziale dipende:

- dai livelli di colesterolo
- dal livello di rischio che si verifichi un infarto o un ictus
- se un fattore la rende più sensibile a sviluppare possibili effetti indesiderati.

Verifichi con il medico o il farmacista quale dose iniziale di ROSUVASTATINA EG è la migliore nel suo caso.

Il medico potrebbe decidere di prescrivere la dose più bassa (5 mg) se:

- **Lei è di origine asiatica** (giapponese, cinese, filippino, vietnamita, coreano e indiano).
- Lei ha **più di 70 anni** di età.
- Lei ha problemi renali di moderata intensità.
- Lei è a rischio per dolori muscolari (miopatia).

#### **Aumento della dose e dose massima**

Il medico può decidere di aumentare la dose. In questo modo può prendere la quantità di ROSUVASTATINA EG adatta per lei. Se ha iniziato con una dose di 5 mg, il medico può decidere di raddoppiarla a 10 mg e quindi aumentarla a 20 mg e poi a 40 mg, se necessario. Se ha iniziato con una dose di 10 mg, il medico può decidere di raddoppiarla a 20 mg e quindi aumentarla a 40 mg, se necessario. Ogni adattamento posologico deve avvenire ad intervalli di quattro settimane.

La dose massima giornaliera di ROSUVASTATINA EG è 40 mg. Questo dosaggio è inteso solo per pazienti con alti livelli di colesterolo e ad alto rischio di attacchi di cuore o ictus, i cui livelli di colesterolo non si abbassano a sufficienza con la dose da 20 mg.

### **Se sta prendendo ROSUVASTATINA EG per ridurre il rischio di avere un attacco di cuore, ictus o problemi di salute correlati:**

Si raccomanda la dose di 20 mg/die. Il medico può tuttavia decidere di prescrivere una dose più bassa nel caso lei mostri uno qualsiasi dei fattori sopra menzionati.

#### **Uso nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 10 e 17 anni**

La dose iniziale usuale equivale a 5 mg. Il medico può aumentare la dose per individuare la giusta quantità di ROSUVASTATINA EG per lei. La massima dose giornaliera di ROSUVASTATINA EG è di 20 mg. Prenda questa dose una volta al giorno. ROSUVASTATINA EG compresse da 40 mg non deve essere somministrato ai bambini.

#### **Come assumere le compresse**

Ingoi ogni compressa intera con un sorso d'acqua.

**Prenda ROSUVASTATINA EG una volta al giorno.** Può prenderlo in qualsiasi momento nel corso della giornata con o senza cibo.  
Cerchi di prendere la compressa ogni giorno alla stessa ora per ricordarsene.

### **Controlli regolari dei livelli di colesterolo**

E' importante che lei si sottoponga regolarmente a visite mediche per stabilire i livelli di colesterolo nel sangue e assicurarsi che siano stati raggiunti e vengano mantenuti i livelli corretti.

Il medico potrebbe decidere di aumentare la dose in modo che lei prenda la quantità di ROSUVASTATINA EG adatta a lei.

### **Se prende più ROSUVASTATINA EG di quanto deve**

Consulti il medico o si rechi al più vicino Pronto Soccorso.

Se viene ricoverato o viene trattato per un'altra condizione informi il personale sanitario che sta prendendo ROSUVASTATINA EG.

### **Se dimentica di prendere ROSUVASTATINA EG**

Non si preoccupi, prenda semplicemente la dose successiva all'ora stabilita. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

### **Se smette di prendere ROSUVASTATINA EG**

Se vuole smettere di prendere ROSUVASTATINA EG consulti il medico. I suoi livelli di colesterolo potrebbero aumentare nuovamente se smette di prendere ROSUVASTATINA EG.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

E' importante che lei conosca quali possono essere i possibili effetti indesiderati. Si tratta solitamente di effetti indesiderati lievi che scompaiono dopo un breve periodo.

**Smetta di prendere ROSUVASTATINA EG e si rivolga immediatamente al medico se manifesta** una qualsiasi delle seguenti reazioni allergiche:

- Difficoltà respiratorie associate o meno a gonfiore al viso, alle labbra, lingua e/o gola.
- Rigonfiamento di viso, labbra, lingua e/o gola con possibili difficoltà nella deglutizione.
- Grave prurito alla pelle (con protuberanze).

**Smetta inoltre di prendere ROSUVASTATINA EG e si rivolga immediatamente al medico se si manifestano dolori insoliti ai muscoli** che perdurano più a lungo di quanto ci si aspetti. I sintomi muscolari sono più frequenti nei bambini e negli adolescenti che negli adulti. Come con altre statine, un numero molto limitato di persone ha manifestato degli effetti

muscolari spiacevoli che raramente si sono evoluti a diventare un danno muscolare potenzialmente fatale, la cosiddetta rabdomiolisi.

**Possibili effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 su 10 persone):**

- Mal di testa
- Mal di stomaco
- Stipsi
- Sensazione di malessere
- Dolore muscolare
- Sensazione di debolezza
- Capogiri
- Aumento della quantità di proteine nelle urine - questa condizione si normalizza di solito spontaneamente senza dover interrompere il trattamento con ROSUVASTATINA EG compresse (solo per ROSUVASTATINA EG 40 mg).
- Diabete. La probabilità che si verifichi è maggiore in caso di alti livelli di zuccheri e grassi nel sangue, se lei è sovrappeso e se la sua pressione sanguigna è alta. Il medico la terrà sotto controllo durante il trattamento con questo medicinale.

**Possibili effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 su 100 persone):**

- Eruzione cutanea, prurito o altre reazioni cutanee.
- Aumento della quantità di proteine nelle urine - questa condizione si normalizza di solito spontaneamente senza dover interrompere il trattamento con ROSUVASTATINA EG compresse (solo per ROSUVASTATINA EG 5 mg, 10 mg e 20 mg).

**Possibili effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone):**

- Grave reazione allergica - i cui segni consistono in gonfiore di viso, labbra, lingua e/o gola, difficoltà a respirare e deglutire, grave prurito della pelle (con protuberanze). **Se pensa di avere una reazione allergica, smetta di prendere ROSUVASTATINA EG e richieda immediatamente assistenza medica.**
- Danno muscolare negli adulti - in via preventiva, **smetta di prendere ROSUVASTATINA EG e si rivolga immediatamente al medico se si manifestano dolori insoliti** ai muscoli che perdurano più a lungo di quanto ci si aspetti.
- Grave dolore allo stomaco (infiammazione del pancreas)
- Aumento degli enzimi epatici nel sangue

**Possibili effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 su 10.000 persone):**

- Ittero (ingiallimento della cute e degli occhi)
- Epatite (infiammazione del fegato)
- Tracce di sangue nelle urine
- Danneggiamento dei nervi delle gambe e delle braccia (tipo intorpidimento)
- Dolore articolare
- Perdita di memoria
- Ingrossamento del seno negli uomini (ginecomastia).

## **Effetti indesiderati la cui frequenza non è nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):**

- diarrea (feci molli)
- Sindrome di Stevens-Johnson (grave condizione caratterizzata dalla formazione di vesciche sulla pelle, in bocca, sugli occhi e ai genitali)
- tosse
- respiro corto
- edema (gonfiore)
- disturbi del sonno, inclusi insonnia e incubi
- problemi di tipo sessuale
- depressione
- problemi respiratori, inclusi tosse persistente e/o respiro corto o febbre
- strappo tendineo
- persistente debolezza muscolare.

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare ROSUVASTATINA EG**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'astuccio/blister/etichetta dopo l'abbreviazione SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene ROSUVASTATINA EG:**

Il principio attivo di ROSUVASTATINA EG è la rosuvastatina.

5 mg: Ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

10 mg: Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

20 mg: Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).



40 mg: Ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato  
Povidone K 30  
Crosopovidone tipo A  
Cellulosa, in polvere  
Copovidone  
Silice colloidale anidra  
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Alcool polivinilico  
Macrogol (MW 3350)  
Titanio diossido (E171)  
Talco.

### **Descrizione dell'aspetto di ROSUVASTATINA EG e contenuto della confezione**

ROSUVASTATINA EG 5 mg compresse rivestite con film

Compresses rivestite con film di colore bianco, rotonde, biconvesse con un diametro di 5 mm.

ROSUVASTATINA EG 10 mg compresse rivestite con film

Compresses rivestite con film di colore bianco, rotonde, biconvesse con un diametro di 7 mm.

ROSUVASTATINA EG 20 mg compresse rivestite con film

Compresses rivestite con film di colore bianco, rotonde, biconvesse con un diametro di 9 mm.

ROSUVASTATINA EG 40 mg compresse rivestite con film

Compresses rivestite con film, di colore bianco, ovali, biconvesse con una lunghezza di 16,3 e uno spessore di 7,6 mm.

Le compresse sono fornite in blister realizzati con una pellicola combinata di OPA-Alu-PVC sigillata con un foglio di alluminio.

Confezioni:

5 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (dosi singole), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196, 252 compresse rivestite con film.

10 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (dosi singole), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196, 252 compresse rivestite con film.

20 mg: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50x1 (dosi singole), 50, 60, 90, 98, 100, 154, 196, 252 compresse rivestite con film.

40 mg: 28, 30, 50x1 (dosi singole), 90, 98, 100, 154, 196, 252 compresse rivestite con film.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

EG S.p.A., Via Pavia 6, 20136 Milano

**Produttore**

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania  
STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria  
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Paesi Bassi  
Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanda

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

AT Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg Filmtabletten  
BE Rosuvastatine EG 5 / 10 / 20 / 40 mg filmomhulde tabletten  
CZ ROSUVASTATIN STADA 10 / 20 / 40 mg  
DK Rosuvastatin STADA  
ES Rosuvastatina STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG  
FI Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen  
FR ROSUVASTATINE EG 5 / 10 / 20 mg, comprimé pelliculé  
IE Rosuvastatin Clonmel 5 / 10 / 20 / 40 mg film-coated tablets  
IT ROSUVASTATINA EG  
LU Rosuvastatine EG 5 / 10 / 20 / 40 mg comprimés pelliculés  
NL Rosuvastatine CF 5 / 10 / 20 / 40 mg, filmomhulde tabletten  
PT Rosuvastatina Ciclum  
RO Rosuvastatină Stada 10 / 20 mg comprimate filmate  
SE Rosuvastatin STADA 5 / 10 / 20 / 40 mg filmdragerad tablett  
SI Rosuvastatin STADA 10 / 20 / 40 mg filmsko obložene tablete

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**