

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente
Lecrosine 40 mg/ml collirio, soluzione
Sodio cromoglicato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le indicazioni contenute in questo foglio illustrativo o le istruzioni del medico o del farmacista.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se avesse bisogno di maggiori informazioni o di consigli, si rivolga al farmacista.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se i sintomi non migliorano o se peggiorano nel giro di due giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lecrosine e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lecrosine
3. Come usare Lecrosine
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lecrosine
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lecrosine e a cosa serve

Lecrosine contiene il principio attivo detto sodio cromoglicato. Appartiene a un gruppo di medicinali chiamati antiallergici.

Lecrosine è utilizzato per il trattamento dei sintomi oculari di origine allergica. Agisce bloccando il rilascio di sostanze naturali negli occhi come l'istamina che possono causare una reazione allergica. I segni di una reazione allergica includono prurito oculare, occhi arrossati, lacrimazione e palpebre gonfie. In genere sono interessati entrambi gli occhi.

Tali sintomi si verificano generalmente in primavera o in estate, quando il polline proveniente dalle piante entra in contatto con gli occhi delle persone con una sensibilità a tali piante.

Si rivolga al medico se i sintomi non migliorano o se peggiorano nel giro di due giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare Lecrosine

Non usi Lecrosine

se è allergico al sodio cromoglicato o a uno qualsiasi degli altri componenti di Lecrosine (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lecrosine se i sintomi riguardano un solo occhio, dal momento che le reazioni allergiche normalmente interessano entrambi gli occhi.

Altri medicinali e Lecrosine

Durante l'uso concomitante con un altro collirio, devono trascorrere almeno 15 minuti tra l'applicazione di un collirio e l'altro.

Gravidanza e allattamento

Non sono stati dimostrati effetti avversi sul feto. Lecrosine può essere utilizzato in gravidanza e durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Come altri colliri, Lecrosine può causare visione offuscata temporanea. In tale evenienza, non guidi né utilizzi macchinari fino a quando la vista non sia tornata normale.

Lenti a contatto

Lecrosine non contiene alcun conservante. Pertanto, può essere utilizzato con le lenti a contatto.

3. Come usare Lecrosine

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le indicazioni contenute in questo foglio illustrativo o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.


Il dosaggio raccomandato per i bambini e gli adulti è di **1-2 gocce in ciascun occhio due volte al giorno**.

Prima dell'instillazione del collirio:

- Si lavi le mani prima di aprire il flacone
- Dopo la prima apertura del flacone, scarti la prima goccia
- Scegli la posizione per lei più comoda per l'instillazione delle gocce (seduto, sdraiato sulla schiena o in piedi di fronte a uno specchio)

Instillazione:


1. Tenga il flacone appena sotto il tappo e ruoti il tappo per aprire il flacone. Non tocchi niente con la punta del flacone per evitare di contaminare la soluzione.



2. Reclini la testa all'indietro e tenga il flacone sopra l'occhio.



3. Abbassi la palpebra inferiore e guardi verso l'alto. Prema delicatamente il flacone e per far fuoriuscire



una goccia. Tenga presente che potrebbero passare alcuni secondi tra la pressione del flacone e la fuoriuscita della goccia. Non preme troppo forte.

4. Sbatta le palpebre per consentire al medicinale di distribuirsi sull'occhio.



5. Agiti il flacone una volta verso il basso per eliminare l'eventuale soluzione rimasta sulla parte superiore del flacone. Segua le istruzioni ai punti da 2. a 4. per instillare Lecrosine anche nell'altro occhio.
6. Prima di richiudere il flacone, lo agiti una volta verso il basso per mantenere asciutta la superficie intorno alla punta.

Alla fine potrebbe restare nel flacone una piccola quantità di soluzione. Ciò è dovuto al fatto che tutti i flaconi sono riempiti con più soluzione rispetto a quella necessaria, per assicurare che venga sempre erogata la dose da 5 ml o 10 ml.

Se i suoi occhi non migliorano o se peggiorano dopo due giorni di utilizzo di Lecrosine, si rivolga al medico o al farmacista.

Si consiglia di usare il collirio regolarmente, tutti i giorni, durante il periodo di maggiore concentrazione di pollini nell'aria, per mantenere la condizione controllata.

Se prende più Lecrosine di quanto deve

Non vi sono reazioni note correlate al sovradosaggio di Lecrosine.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Lecrosine può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono state riportate reazioni allergiche (di ipersensibilità). Tuttavia, non è nota la frequenza di tali reazioni.

Se nota la comparsa di sintomi quali eruzioni cutanee, difficoltà a deglutire o a respirare, gonfiore di labbra, viso, gola e lingua e un peggioramento dell'arrossamento, contatti immediatamente il suo medico.

Un effetto indesiderato comune (può interessare fino a 1 persona su 10) è il bruciore locale durante l'applicazione.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lecrosine

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a una temperatura inferiore a 25 °C. Non congelare.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad/EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Dopo la prima apertura, la soluzione può essere utilizzata per **8 settimane**. Il flacone deve essere mantenuto ben chiuso.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lecrosine

- Il principio attivo è il sodio cromoglicato. 1 ml di soluzione contiene 40 mg di sodio cromoglicato.
- Gli altri componenti sono glicerolo, disodio edetato, alcol polivinilico, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di Lecrosine e contenuto della confezione

Lecrosine è una soluzione limpida, incolore o leggermente giallastra fornita in un flacone di plastica bianco con un contagocce bianco con punta blu e tappo a vite di plastica bianco.

Confezioni: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml e 1 x 10 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Santen Oy,
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere
Finlandia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il