

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

### Cartexan 400 mg capsule rigide

Condroitin sodio solfato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale**

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Cartexan e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Cartexan
3. Come prendere Cartexan
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Cartexan
6. Altre informazioni

### **1. CHE COS'È CARTEXAN E A COSA SERVE**

Il principio attivo di Cartexan, il condroitin solfato, è una sostanza normalmente presente negli esseri umani, essendo una delle componenti strutturali della cartilagine articolare.

Cartexan serve per il trattamento sintomatico dell'artrosi del ginocchio e dell'anca. L'esordio dell'azione è lento (entro 6-8 settimane), pertanto si raccomandano altri medicinali per il trattamento del dolore acuto e recente. Gli effetti del trattamento generalmente persistono per 2-3 mesi dopo l'interruzione dello stesso.

### **2. CHE COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE CARTEXAN**

#### **Non prenda Cartexan:**

- se è allergico (ipersensibile) al condroitin solfato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Cartexan.

#### **Faccia particolare attenzione con Cartexan:**

- se è affetto da patologia cardiaca (insufficienza cardiaca) o da insufficienza renale. Cartexan può provocare accumulo di fluidi corporei e gonfiore.
- se è affetto da insufficienza epatica.
- se usa farmaci che alterano le proprietà coagulanti del sangue (come l'acido acetilsalicilico, il dipiridamolo, o il clopidogrel).
- se usa analgesici, poiché l'utilizzo del condroitin solfato può diminuire la necessità di antidolorifici.

#### **Altri medicinali**

Informi il dottore o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi medicinali non soggetti a prescrizione medica. Questo riguarda in particolare i medicinali in grado di alterare le proprietà coagulanti del sangue (come il warfarin, l'acido acetilsalicilico, il dipiridamolo, oppure il clopidogrel). Se assume il warfarin, il medico può richiedere il controllo dell'INR più frequentemente dopo l'inizio oppure l'interruzione dell'utilizzo di Cartexan.

**Cartexan con cibi e bevande:**

Cartexan può essere assunto prima, durante o dopo i pasti. Se è soggetto a problemi addominali, si consiglia di assumere dopo i pasti.

Le capsule non vanno masticate, ma ingoiate intere con un'adeguata quantità di liquido (ad esempio un bicchiere d'acqua).

**Gravidanza e allattamento:**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di assumere qualsiasi medicinale.

Al momento non sono disponibili dati riguardo l'utilizzo di Cartexan durante la gravidanza e l'allattamento, pertanto il medicinale non deve essere utilizzato durante la gravidanza o allattamento.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari:**

Cartexan ha dimostrato di non alterare le capacità di guida e di utilizzo di macchinari.

**3. COME PRENDERE CARTEXAN**

Prenda Cartexan seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le capsule non vanno masticate, ma ingoiate intere con un'adeguata quantità di liquido (ad esempio un bicchiere d'acqua).

La dose raccomandata è di 800 mg, vale a dire 2 capsule una volta al giorno per tre mesi.

Nei casi più gravi, la dose raccomandata è di 1200 mg, vale a dire 3 capsule al giorno per le prime 4-6 settimane di trattamento e successivamente 800 mg al giorno fino alla fine del periodo di trattamento di 3 mesi. La dose giornaliera di 1200 mg può essere assunta una volta al giorno oppure suddivisa in tre dosi, vale a dire 1 capsula tre volte al giorno.

Il trattamento schema posologico prevede periodi di trattamento di tre mesi ripetuti, con un intervallo di sospensione di due mesi.

Cartexan non è raccomandato nei bambini.

**Se prende più Cartexan di quanto deve:**

È stata osservata una segnalazione di sovradosaggio non intenzionale e accidentale senza che vi siano state conseguenze per il paziente (né vomito, né nausea e neppure alterazione delle concentrazioni degli elettroliti ematici). Sulla base degli studi, non ci si aspetta la comparsa di nessun effetto dannoso e nemmeno di sintomi. In caso di sovradosaggio deve contattare sempre un medico del Centro Antiveleni più vicino.

**Se dimentica di prendere Cartexan:**

Non sono previsti effetti particolari. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose singola, ma continui il trattamento assumendo la dose normale il giorno successivo.

**Se interrompe il trattamento con Cartexan:**

Non sono previsti effetti particolari.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

**4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, Cartexan può provocare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Effetti indesiderati rari e molto rari** (in meno di 1 paziente su 1000):

*Disturbi gastrointestinali:* disturbi gastrointestinali (come dolore all'addome superiore, nausea o diarrea).

*Affezioni cutanee o sottocutanee:* eritema, eruzione cutanea papulare, dermatite irritativa, orticaria, eczema, prurito cutaneo.

*Sintomi generali:* edema.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati:**

In caso di qualsiasi effetto indesiderato, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere, anche in caso di effetti indesiderati non elencati in questo foglio. Può anche segnalare gli effetti indesiderati direttamente al seguente indirizzo:

Agenzia Italiana del Farmaco

Sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

## **5. COME CONSERVARE CARTEXAN**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Non conservi a temperature superiori ai 30 °C. Conservi il prodotto nella confezione originale per proteggerlo dall'umidità.

#### **Scadenza**

Non usi Cartexan dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. ALTRE INFORMAZIONI**

#### **Cosa contiene Cartexan**

- Il principio attivo è il condroitin sodio solfato. Ciascuna capsula contiene 400 mg di condroitin sodio solfato.
- Gli altri componenti sono: magnesio stearato. Gli eccipienti nel rivestimento della capsula sono gelatina, biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), eritrosina (E127) e ossido di ferro rosso (E172).

#### **Descrizione dell'aspetto di Cartexan e contenuto della confezione**

Cartexan è disponibile in confezioni da 24, 60 e 180 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano disponibili sul mercato.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Bioibérica, S.A.

Ctra. Nacional II, Km.680,6.

08389 Palafolls. Barcellona

Spagna

**Produttore**

J.URIACH & Cia.

Camí Reial, 51-57. Pol. Ind. Riera de Caldes.

08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcellona

Spagna

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco