

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI 2250 mg supposte

Glicerolo

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI
3. Come usare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI e a cosa serve

SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI contiene il principio attivo glicerolo che appartiene alla categoria dei lassativi che sono medicinali utilizzati per facilitare l'espulsione delle feci. Questo medicinale è indicato per il trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

Non usi SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

- se è allergico al glicerolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta;
- se ha nausea o vomito;
- se soffre di ostruzione o restringimento (stenosi) dell'intestino;
- se soffre di sanguinamento rettale di origine sconosciuta;
- se soffre di gonfiore dei vasi sanguigni presenti intorno all'ano (flogosi emorroidale);
- se è in grave stato di disidratazione;

- se soffre di infiammazione dell'intestino associata alla presenza di lesioni sanguinanti (rettocolite emorragica).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI.

Se è anziano e/o non è in buone condizioni di salute informi il medico prima di usare questo medicinale.

Usi i medicinali che stimolano l'espulsione delle feci (lassativi) il meno frequentemente possibile e comunque per non più di 7 giorni. L'utilizzo dei lassativi per periodi di tempo maggiori, richiede la prescrizione del medico, dopo adeguata valutazione delle condizioni del paziente.

Se soffre di stitichezza che dura per lunghi periodi (cronica) o che è frequente, richieda sempre l'intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione dei medicinali e la sorveglianza durante la terapia. Consulti il medico quando la necessità del lassativo deriva da un improvviso cambiamento delle precedenti abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni) che duri da più di due settimane o quando l'uso del lassativo non riesce a produrre effetti. Beva almeno 6-8 bicchieri al giorno di acqua o altri liquidi per favorire l'ammorbidimento delle feci quando usa i lassativi.

Se usa eccessivamente, frequentemente o in modo scorretto i lassativi, potrebbe andare incontro a diarrea duratura con conseguente perdita di acqua, sali minerali (soprattutto potassio) e altre sostanze nutritive essenziali. Nei casi più gravi di abuso si può manifestare un'eccessiva perdita di liquidi (disidratazione) o un abbassamento dei livelli di potassio nel sangue (ipopotassiemia) che possono provocare problemi al cuore o all'attività dei muscoli, soprattutto se sta assumendo glicosidi cardiaci, diuretici o corticosteroidi durante il trattamento con questo medicinale.

L'abuso di lassativi, specialmente quelli di contatto (lassativi stimolanti), può causare dipendenza (la necessità di aumentare sempre di più il dosaggio), stitichezza cronica e perdita delle normali funzioni intestinali (atonìa intestinale).

Bambini

Nei bambini al di sotto dei 12 anni di età usi SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI solo dopo aver consultato il medico.

Altri medicinali e SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Se sta assumendo medicinali utilizzati per il trattamento di problemi allo stomaco (antiacidi), usi SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI almeno un'ora dopo.

Usi questo medicinale almeno due ore dopo aver assunto un altro medicinale.

SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI con bevande

Il latte può modificare l'effetto di questo medicinale. Prima di usare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI, lasci trascorrere almeno un'ora.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Prenda questo medicinale durante la gravidanza e l'allattamento solo se necessario e sempre dietro controllo diretto del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

3. Come usare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione. Usi inizialmente le dosi minime previste

La dose raccomandata negli adulti e negli adolescenti di età maggiore di 12 anni è 1 supposta al bisogno o secondo prescrizione medica.

Usi preferibilmente questo medicinale la sera.

Se le sembra che le supposte siano troppo molli, metta i contenitori nell'acqua fredda prima di aprirli.

Usi i lassativi il meno frequentemente possibile e per non più di sette giorni (vedere il paragrafo Avvertenze e precauzioni).

Se usa più SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI di quanto deve

Se usa questo medicinale troppo spesso, per troppo tempo o in quantità eccessive si possono manifestare dolori addominali e diarrea persistente che causano perdite di liquidi, sali minerali (specialmente potassio) e altre sostanze nutritive essenziali che devono essere rimpiazzate (vedere il paragrafo Avvertenze e precauzioni).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

- Dolori in forma di crampi isolati o coliche addominali più frequenti nei casi di stitichezza grave.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI

- Il principio attivo è glicerolo. Ogni supposta contiene 2250 mg di glicerolo
- Gli altri componenti sono: sodio stearato, , sodio carbonato. anidro.

Descrizione dell'aspetto di SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI e contenuto della confezione

SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI 2250 mg supposte. Astuccio da 6, 12 o 18 supposte.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Marco Viti Farmaceutici S.p.A. - Via Mentana, 38 - 36100 Vicenza - Italia.

Produttore

Zeta Farmaceutici S.p.A. - Via Galvani, 10 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: