

## **Foglio illustrativo: Informazioni per il paziente**

### **AMOXICILLINA ABC 1 g compresse solubili**

Amoxicillina

Medicinale Equivalente

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è AMOXICILLINAABCe a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendereAMOXICILLINAABC
3. Come prendereAMOXICILLINAABC
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare AMOXICILLINAABC
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è AMOXICILLINAABCe a cosa serve**

AMOXICILLINAABCcontiene il principio attivo amoxicillina, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati penicilline.

AMOXICILLINA ABCè un antibiotico utilizzato contro le infezioni dovute a batteri.

AMOXICILLINA ABCè indicato negli adulti per curare le infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina come:

- infezioni delle vie respiratorie acute e croniche;
- infezioni di orecchie, naso, faringe, laringe e bocca;
- infezioni del tratto urinario e dei genitali;
- infezioni dell'intestino e delle vie biliari;
- infezioni della pelle e dei tessuti molli;
- infezioni che richiedono un intervento chirurgico.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendereAMOXICILLINAABC**

##### **Non prenda AMOXICILLINAABC**

- se è allergico all'amoxicillina, a sostanze simili (penicilline e cefalosporine) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);

- se soffre di infezioni causate da batteri che producono delle sostanze che distruggono questo medicinale (penicillinasi);
- se soffre di una malattia causata da un virus chiamata “mononucleosi infettiva”.
- se il paziente è un bambino

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere AMOXICILLINAABC se:

- ha già sofferto di una grave reazione allergica con gonfiore del viso e della gola e con difficoltà respiratoria con questo o altri medicinali;
- ha problemi al fegato o ai reni. Il medico potrebbe monitorare la funzionalità del suo fegato o dei suoi reni.

Informi immediatamente il medico se manifesta diarrea grave e persistente durante o dopo il trattamento.

Se prende questo medicinale per periodi prolungati o ad alte dosi può soffrire di infezioni alla bocca o alla vagina causate dalla *Candida*. Il suo medico monitorerà l'insorgenza di tali infezioni.

### **Altri medicinali e AMOXICILLINAABC**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- antibiotici come la penicillina G e le cefalosporine;
- allopurinolo, utilizzato per la gotta. In questo caso c'è un aumento del rischio di eruzione cutanea.
- antibiotici aminoglicosidi;
- probenecid, utilizzato per la gotta;
- medicinali, usati per le infiammazioni come acido acetilsalicilico, fenilbutazone o altri medicinali antinfiammatori ad alte dosi.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

In gravidanza e nella primissima infanzia AMOXICILLINA ABC deve essere somministrato solo nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

L'amoxicillina non influenza la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

## **3. Come prendere AMOXICILLINAABC**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Sciolga la compressa in mezzo bicchiere d'acqua oppure la ingerisca con acqua.

La dose raccomandata per gli adulti è di 1 compressa 2 volte al giorno. Il medico può decidere di modificare la dose e la durata del trattamento a seconda del tipo di infezione.

### **Se prende più AMOXICILLINA ABC di quanto deve**

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio con AMOXICILLINA ABC.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di AMOXICILLINA ABC avverta immediatamente il medico o si rivolga al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.

### **Se dimentica di prendere AMOXICILLINA ABC**

Se dimentica di prendere una dose lo faccia appena se ne ricorda, a meno che non sia quasi l'ora di prendere la dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)

- grave condizione della pelle che può interessare la bocca e altre parti del corpo (eritema multiforme);
  - altre gravi reazioni cutanee possono includere alterazioni del colore della pelle, formazione di rilievi sotto la pelle, formazione di vescicole, pustole, esfoliazione, arrossamento, dolore, prurito e desquamazione. Possono essere associati a febbre, mal di testa e dolori diffusi in tutto il corpo.
  - sintomi simil-influenzali con eruzione cutanea, febbre, ghiandole gonfie e risultati anormali degli esami del sangue (inclusi aumento del numero di globuli bianchi (eosinofilia) e innalzamento degli enzimi epatici) (Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici).

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati (la cui frequenza non è nota, ovvero non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili):

- aumento di alcuni tipi di globuli bianchi (eosinofilia).

- gonfiore del viso, delle labbra, della bocca, della lingua o della gola che può causare difficoltà nella deglutizione e nella respirazione (angioedema), malattie risultanti dalla distruzione dei globuli rossi;
- alterazione della conta delle cellule del sangue (come anemia, leucopenia, neutropenia, agranulocitosi e trombocitopenia), malattia rara del sangue (porpora trombocitopenica), aggregazione piastrinica anormale, alterazione dei valori di coagulazione del sangue;
- improvvisa reazione allergica potenzialmente fatale con sintomi quali abbassamento improvviso e grave della pressione del sangue, accelerazione e rallentamento del battito del cuore, stanchezza o debolezza inusuali, ansia, agitazione, capogiro, perdita di coscienza, difficoltà della respirazione o della deglutizione, prurito generalizzato specialmente alle piante dei piedi e alle palme delle mani, orticaria con o senza angioedema (aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate più frequentemente alle estremità, ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra), arrossamento della cute specialmente intorno alle orecchie, colorazione bluastra della pelle, sudorazione abbondante, nausea, vomito, dolore e crampi allo stomaco, diarrea;
- eruzione cutanea accompagnata da infiammazione e dolore delle articolazioni, dolore ai muscoli e febbre (tipo malattia da siero);
- infezioni dovute a microrganismi resistenti all'amoxicillina;
- lingua gonfia, dolorante e arrossata (glossite), dolore alla bocca (stomatite), infiammazione dell'intestino (colite pseudomembranosa);
- malattia del rene (nefrite interstiziale acuta);
- problemi al fegato, aumento moderato delle transaminasi;
- diarrea, vomito, mancanza o riduzione dell'appetito, dolore allo stomaco, infiammazione dello stomaco
- mal di testa, capogiro.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale

#### **5. Come conservare AMOXICILLINAABC**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene AMOXICILLINAABC**

Il principio attivo è amoxicillina. Ogni compressa contiene 1,148 g di amoxicillina.

Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, crospovidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, sodio saccharinato, aroma fragola.

### **Descrizione dell'aspetto di AMOXICILLINAABC e contenuto della confezione**

Blister da 12 compresse solubili da 1 g.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

ABC Farmaceutici S.p.A - Corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino

### **Produttore**

LA.FA.RE S.r.l - Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - 80056 Ercolano (Na)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**