

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

Lercanidipina Mylan Generics 10 mg compresse rivestite con film

Lercanidipina cloridrato

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lercanidipina Mylan Generics e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics
3. Come prendere Lercanidipina Mylan Generics
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina Mylan Generics
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lercanidipina Mylan Generics e a che cosa serve

Lercanidipina Mylan Generics contiene il principio attivo lercanidipina.

Lercanidipina appartiene ad un gruppo di medicinali detti bloccanti del canale del calcio (derivati diidropiridinici), che sono usati per trattare la pressione sanguigna alta (ipertensione). Lercanidipina agisce dilatando i vasi sanguigni e aumentando il flusso di sangue che scorre attraverso di essi, contribuendo a ridurre la pressione.

Lercanidipina Mylan Generics è utilizzata per trattare la pressione alta negli adulti di età superiore ai 18 anni (non è raccomandato per i bambini fino a 18 anni).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics

Non prenda Lercanidipina Mylan Generics

- Se è allergico alla lercanidipina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha avuto reazioni allergiche a medicinali strettamente correlati alla lercanidipina (come amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacidipina)
- Se è in gravidanza o se sta allattando, se sta pianificando una gravidanza o se è una donna in età fertile e non sta utilizzando un efficace metodo contraccettivo.
- Se soffre di alcune malattie cardiache
 - insufficienza cardiaca non trattata
 - ostruzione al flusso del sangue dal cuore
 - angina instabile (angina a riposo o in aumento progressivo)
 - se ha avuto un attacco cardiaco meno di un mese fa

- Se ha gravi problemi ai reni o al fegato
- Se sta prendendo uno dei seguenti medicinali/cibi:
 - farmaci antimicotici (quali ketoconazolo o itraconazolo)
 - antibiotici macrolidici (quali eritromicina o troleandomicina)
 - antivirali (come ritonavir, un medicinale per trattare l'AIDS)
 - ciclosporina (un medicinale usato per prevenire il rigetto dopo un trapianto)
 - pompelmo o succo di pompelmo.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics.

- Se soffre di alcune condizioni cardiache come disturbi del ritmo cardiaco e non ha un pacemaker o se ha un'angina pre-esistente
- Se ha problemi ai reni o al fegato da lievi a moderati

Alcuni medicinali simili alla lercanidipina (diidropiridine come amlodipina o felodipina ad esempio) sono noti per causare dolore toracico o angina. Molto raramente, i pazienti affetti da angina pre-esistente possono manifestare un aumento della frequenza, della durata o della gravità di questi attacchi. Sono stati osservati casi molto rari di attacco cardiaco.

Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di lercanidipina in bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Altri medicinali e Lercanidipina Mylan Generics.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non assuma Lercanidipina Mylan Generics se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- medicinali antifungini (come ketoconazolo o itraconazolo)
- antibiotici macrolidi (come eritromicina o troleandomicina)
- antivirali (come ritonavir, un medicinale per il trattamento dell'AIDS)
- ciclosporina (un medicinale usato per prevenire il rigetto dopo un trapianto)

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Beta-bloccanti (ad esempio metoprololo)
- Cimetidina (un medicinale per l'ulcera, l'indigestione o il bruciore gastrico)
- Digossina (un medicinale per trattare problemi del cuore)
- Midazolam (un medicinale che aiuta a dormire ma può essere usato per altri motivi)
- Rifampicina (un medicinale per la tubercolosi)
- Terfenadina o astemizolo (medicinali per trattare le allergie)
- Medicinali per trattare un battito cardiaco accelerato (ad esempio amiodarone o chinidina)
- Medicinali per trattare l'epilessia (fenitoina o carbamazepina)

Lercanidipina Mylan Generics con cibi, bevande e alcol

Non beva alcol durante il trattamento con Lercanidipina Mylan Generics poiché ciò può aumentare l'efficacia di questo medicinale nel ridurre la sua pressione sanguigna.

Non assuma Lercanidipina Mylan Generics compresse con pompelmo o succo di pompelmo.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Gravidanza

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se è una donna in età fertile e non sta usando un mezzo di contraccezione efficace, non prenda lercanidipina dal momento che medicinali come la lercanidipina possono interferire con lo sviluppo del feto.

Allattamento

Non prenda lercanidipina se sta allattando poiché lercanidipina può passare nel latte materno.

Fertilità

È stato segnalato che medicinali come la lercanidipina possono influenzare lo sperma. Se sta cercando di avere un bambino, informi il medico o l'infermiere che sta assumendo questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Si deve prestare attenzione a causa della possibilità di capogiri, debolezza o stanchezza e raramente sonnolenza. Non si metta alla guida di veicoli o utilizzi macchinari finché non sa come il suo corpo risponde al trattamento con Lercanidipina Mylan Generics.

Lercanidipina Mylan Generics contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Lercanidipina Mylan Generics

Prenda sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è una compressa rivestita con film di Lercanidipina Mylan Generics 10 mg al giorno sempre alla stessa ora, preferibilmente al mattino, almeno 15 minuti prima della colazione. Se necessario, il medico può decidere di aumentare la sua dose fino a 20 mg al giorno. L'assunzione di lercanidipina con il cibo, in particolare un pasto contenente molti grassi, aumenta la quantità di medicinale che entra nel corpo, che potrebbe aumentare il rischio di sviluppare effetti indesiderati.

Le compresse devono essere ingerite intere con un po' d'acqua. La linea di incisione è solamente per aiutarla a rompere la compressa, se ha difficoltà a deglutirla intera.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti fino ai 18 anni di età.

Anziani e pazienti con problemi epatici o renali da lievi a moderati

Il medico le dirà se ha bisogno di una dose più bassa di questo medicinale. Se il medico aumenta la dose a 20 mg, le prescriverà dei controlli regolari.

Se prende più Lercanidipina Mylan Generics di quanto deve

Non prenda più medicinale di quanto il medico o il farmacista le dice.

Contatti immediatamente il medico o il più vicino ospedale nel caso di sovradosaggio. Porti con sé le compresse rimaste o questo foglio; ciò può essere di aiuto allo staff medico. Superare il dosaggio

corretto può causare un eccessivo abbassamento della pressione sanguigna (ipotensione), un battito cardiaco molto veloce e perdita di coscienza.

Se dimentica di prendere Lercanidipina Mylan Generics

Se dimentica di prendere una compressa, lo faccia entro le 12 ore successive all'ora in cui la assume usualmente. Se sono passate più di 12 ore non prenda la compressa dimenticata ma assuma quella successiva al solito orario. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina Mylan Generics

Se interrompe improvvisamente l'assunzione di questo medicinale, la sua pressione potrebbe salire di nuovo. Parli con il medico prima di interrompere il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica uno dei seguenti effetti indesiderati, smetta di prendere questo medicinale e cerchi immediatamente cure mediche:

- reazione allergica (ipersensibilità), che può causare prurito, eruzione cutanea e orticaria, sudorazione, gonfiore del viso, della lingua o della gola, gravi difficoltà respiratorie.
- dolore toracico, spesso diffuso a braccia e collo (angina pectoris)
- calo della pressione sanguigna (ipotensione), che può causare capogiri

Se soffre di angina pre-esistente, con il gruppo di medicinali a cui appartiene lercanidipina può verificarsi raramente un aumento nella frequenza, durata o gravità di questi episodi acuti, con possibilità di avere un attacco cardiaco.

Altri possibili effetti indesiderati

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- Mal di testa
- Capogiri
- Battito cardiaco accelerato
- Palpitazioni (tonfo al cuore o accelerazione del battito cardiaco)
- Improvviso arrossamento della cute (vampate)
- Gonfiore delle mani e dei piedi

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- Sonnolenza
- Sentirsi male (nausea) e stare male (vomito)
- Diarrea
- Eruzione cutanea
- Dolore muscolare
- Passaggio di grandi quantità di urina
- Debolezza e stanchezza
- Indigestione e dolore allo stomaco

Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- Svenimento (sincope)
- Gonfiore delle gengive
- Aumento del livello degli enzimi epatici (rilevati da esami del sangue) che indica un'alterazione della funzionalità del fegato
- Necessità di urinare con maggiore frequenza

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina Mylan Generics

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sull'etichetta e sul blister dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare precauzione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina Mylan Generics

La sostanza attiva è lercanidipina cloridrato. Una compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 9,4 mg di lercanidipina.

Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina Mylan Generics e contenuto della confezione

Lercanidipina Mylan Generics 10 mg: compresse rivestite con film giallo-marrone, rotonde, biconvesse, con impresso "LR sopra 1" da un lato e linea di frattura dall'altro.

Lercanidipina Mylan Generics 10 mg compresse rivestite con film sono disponibili in blister da 7, 14, 28, 35, 50, 56, 98 e 100 e in flaconi da 500 e 1.000*.

Non ingerire la capsula dissecante contenuta nel flacone.

* È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano.

Produttore

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE**Lercanidipina Mylan Generics 20 mg compresse rivestite con film**

Lercanidipina cloridrato

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lercanidipina Mylan Generics e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics
3. Come prendere Lercanidipina Mylan Generics
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina Mylan Generics
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lercanidipina Mylan Generics e a che cosa serve

Lercanidipina Mylan Generics contiene il principio attivo lercanidipina.

Lercanidipina Mylan Generics appartiene ad un gruppo di medicinali detti bloccanti del canale del calcio (derivati diidropiridinici), che sono usati per trattare la pressione sanguigna alta (ipertensione). Lercanidipina agisce dilatando i vasi sanguigni e aumentando il flusso di sangue che scorre attraverso di essi, contribuendo a ridurre la pressione.

Lercanidipina Mylan Generics è utilizzata per trattare la pressione alta negli adulti di età superiore ai 18 anni (non è raccomandato per i bambini fino a 18 anni).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics

Non prenda Lercanidipina Mylan Generics

- Se è allergico alla lercanidipina ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha avuto reazioni allergiche a medicinali strettamente correlati alla lercanidipina (come amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacidipina)
- Se è in gravidanza o se sta allattando, se sta pianificando una gravidanza o se è una donna in età fertile e non sta utilizzando un efficace metodo contraccettivo
- Se soffre di alcune malattie cardiache
 - insufficienza cardiaca non trattata
 - ostruzione al flusso del sangue dal cuore
 - angina instabile (angina a riposo o in aumento progressivo)
 - se ha avuto un attacco cardiaco meno di un mese fa
- Se ha gravi problemi ai reni o al fegato
- Se sta prendendo uno dei seguenti medicinali/cibi:
 - farmaci antimicotici (quali ketoconazolo o itraconazolo)
 - antibiotici macrolidici (quali eritromicina o troleandomicina)
 - antivirali (come ritonavir, un medicinale per trattare l'AIDS)
 - ciclosporina (un medicinale usato per prevenire il rigetto dopo un trapianto)
 - pompelmo o succo di pompelmo.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lercanidipina Mylan Generics.

Consulti il medico prima di prendere questo medicinale:

- Se soffre di alcune condizioni cardiache come disturbi del ritmo cardiaco e non ha un pacemaker o se ha un'angina pre-esistente
- Se ha problemi ai reni o al fegato da lievi a moderati

Alcuni medicinali simili alla lercanidipina (diidropiridine come amlodipina o felodipina ad esempio) sono noti per causare dolore toracico o angina. Molto raramente, i pazienti affetti da angina pre-esistente possono manifestare un aumento della frequenza, della durata o della gravità di questi attacchi. Sono stati osservati casi molto rari di attacco cardiaco.

Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di lercanidipina in bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Altri medicinali e Lercanidipina Mylan Generics.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non assuma Lercanidipina Mylan Generics se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- medicinali antifungini (come ketoconazolo o itraconazolo)
- antibiotici macrolidi (come eritromicina o troleandomicina)
- antivirali (come ritonavir, un medicinale per il trattamento dell'AIDS)
- ciclosporina (un medicinale usato per prevenire il rigetto dopo un trapianto)

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti:

- Beta-bloccanti, (ad esempio metoprololo)
- Cimetidina (un medicinale per l'ulcera, l'indigestione o il bruciore gastrico)
- Digossina (un medicinale per trattare problemi del cuore)
- Midazolam (un medicinale che aiuta a dormire ma può essere usato per altri motivi)
- Rifampicina (un medicinale per la tubercolosi)
- Terfenadina o astemizolo (medicinali per trattare le allergie)
- Medicinali per trattare un battito cardiaco accelerato (ad esempio a miodarone o chinidina)
- Medicinali per trattare l'epilessia (fenitoina o carbamazepina)

Lercanidipina Mylan Generics con cibi, bevande e alcol

Non beva alcol durante il trattamento con Lercanidipina Mylan Generics poiché ciò può aumentare l'efficacia di questo medicinale nel ridurre la sua pressione sanguigna.

Non assuma Lercanidipina Mylan Generics compresse con pompelmo o succo di pompelmo.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Gravidanza

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se è una donna in età fertile e non sta usando un mezzo di contraccezione efficace non prenda lercanidipina dal momento che medicinali come la lercanidipina possono interferire con lo sviluppo del feto.

Allattamento

Non prenda lercanidipina se sta allattando, poiché la lercanidipina può passare nel latte materno.

Fertilità

È stato segnalato che medicinali come la lercanidipina possono influenzare lo sperma. Se sta cercando di avere un bambino, informi il medico o l'infermiere che sta assumendo questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Si deve prestare attenzione a causa della possibilità di capogiri, debolezza o stanchezza e raramente sonnolenza. Non si metta alla guida di veicoli o utilizzi macchinari finché non sa come il suo corpo risponde al trattamento con Lercanidipina Mylan Generics.

Lercanidipina Mylan Generics contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Lercanidipina Mylan Generics

Prenda sempre questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è una compressa rivestita con film di Lercanidipina Mylan Generics 10 mg al giorno sempre alla stessa ora, preferibilmente al mattino, almeno 15 minuti prima della colazione. Se necessario, il medico può decidere di aumentare la sua dose fino a 20 mg al giorno. L'assunzione di lercanidipina con il cibo, in particolare un pasto contenente molti grassi, aumenta la quantità di medicinale che entra nel corpo, che potrebbe aumentare il rischio di sviluppare effetti indesiderati.

Le compresse devono essere ingerite intere con un po' d'acqua. La linea di incisione è solamente per aiutarla a rompere la compressa, se ha difficoltà a deglutirla intera.

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti fino ai 18 anni di età.

Anziani e pazienti con problemi epatici o renali da lievi a moderati

Il medico le dirà se ha bisogno di una dose più bassa di questo medicinale. Se il medico aumenta la dose a 20 mg, le prescriverà dei controlli regolari.

Se prende più Lercanidipina Mylan Generics di quanto deve

Non prenda più medicinale di quanto il medico o il farmacista le dice.

Contatti immediatamente il medico o il più vicino ospedale nel caso di sovradosaggio. Porti con sé le compresse rimaste o questo foglio; ciò può essere di aiuto allo staff medico. Superare il dosaggio corretto può causare un eccessivo abbassamento della pressione sanguigna (ipotensione), un battito cardiaco molto veloce e perdita di coscienza.

Se dimentica di prendere Lercanidipina Mylan Generics

Se dimentica di prendere una compressa, lo faccia entro le 12 ore successive all'ora in cui la assume usualmente. Se sono passate più di 12 ore non prenda la compressa dimenticata ma assuma quella successiva al solito orario. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina Mylan Generics

Se interrompe improvvisamente l'assunzione questo medicinale, la sua pressione potrebbe salire di nuovo. Parli con il medico prima di interrompere il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica uno dei seguenti effetti indesiderati, smetta di prendere questo medicinale e cerchi immediatamente cure mediche:

- reazione allergica (ipersensibilità), che può causare prurito, eruzione cutanea e orticaria, sudorazione, gonfiore del viso, della lingua o della gola, gravi difficoltà respiratorie.
- dolore toracico, spesso diffuso a braccia e collo (angina pectoris)
- calo della pressione sanguigna (ipotensione), che può causare capogiri

Se soffre di angina pre-esistente, con il gruppo di medicinali a cui appartiene lercanidipina può verificarsi raramente un aumento nella frequenza, durata o gravità di questi episodi acuti, con possibilità di avere un attacco cardiaco.

Altri possibili effetti indesiderati

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- Mal di testa
- Capogiri
- Battito cardiaco accelerato
- Palpitazioni (tonfo al cuore o accelerazione del battito cardiaco)
- Improvviso arrossamento della cute (vampate)
- Gonfiore delle mani e dei piedi

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- Sonnolenza
- Sentirsi male (nausea) e stare male (vomito)
- Diarrea
- Eruzione cutanea
- Dolore muscolare
- Passaggio di grandi quantità di urina
- Debolezza e stanchezza
- Indigestione e dolore allo stomaco

Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- Svenimento (sincope)
- Gonfiore delle gengive
- Aumento del livello degli enzimi epatici (rilevati da esami del sangue) che indica un'alterazione della funzionalità del fegato
- Necessità di urinare con maggiore frequenza

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina Mylan Generics

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sull'etichetta, sul blister dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare precauzione per la conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina Mylan Generics

La sostanza attiva è lercanidipina cloridrato.

Una compressa rivestita con film contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 18,8 mg di lercanidipina.

Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa: lattosio monidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol, ossido di ferro giallo (E172),

ossido di ferro rosso (E172).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina Mylan Generics e contenuto della confezione

Lercanidipina Mylan Generics 20 mg: compresse rivestite con film rosa, rotonde, biconvesse, con impresso "LR sopra 2" da un lato e linea di frattura dall'altro.

Lercanidipina Mylan Generics 20 mg compresse rivestite con film sono disponibili in blister da 7, 14, 28, 35, 50, 56, 98 e 100 e in flaconi da 500 e 1.000*

* È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Mylan S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano.

Produttore

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: