

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Froben antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg Pastiglie aroma Menta

amilmetacresolo
2,4-diclorobenzil alcool

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Froben antisettico gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Froben antisettico gola
3. Come prendere Froben antisettico gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Froben antisettico gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Froben antisettico gola e a cosa serve

Froben antisettico gola contiene amilmetacresolo e 2,4-diclorobenzil alcool. Questi principi attivi sono entrambi antisettici di livello medio e sono usati per il sollievo sintomatico delle infezioni della bocca e della gola.

L'azione di succhiare la pastiglia permette ai principi attivi di agire nella zona del disturbo e aiuta anche a lubrificare e lenire la zona dolorante. Questo aiuta ad alleviare il dolore e il fastidio della bocca e della gola.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni

2. Cosa deve sapere prima di prendere Froben antisettico gola

Questo medicinale è raccomandato per adulti, bambini (di età superiore a 6 anni) e anziani. I bambini di età inferiore ai 6 anni non devono usare questo medicinale.

Non prenda Froben antisettico gola:

- se è allergico all'amilmetacresolo, all'2,4-diclorobenzil alcool o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Froben antisettico gola se soffre o ha in corso qualsiasi altro problema alla gola.

Non utilizzi questo medicinale per un lungo periodo di tempo.

Generalmente, il mal di gola è una malattia lieve che non dura più di una settimana. Contatti il medico se i sintomi persistono per più di 3 giorni, se peggiorano o se compaiono altri sintomi poiché potrebbe essere necessario un trattamento diverso.

Bambini e adolescenti

A causa delle dimensioni delle pastiglie di Froben antisettico gola, i bambini piccoli possono soffocare.

Froben antisettico gola non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Altri medicinali e Froben antisettico gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale potrebbe non essere adatto a lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non interferisce sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

Froben antisettico gola contiene isomalto (E953), maltitolo liquido (E965) e sodio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

L'isomalto (E953) e il maltitolo (E965) hanno un potere calorico di 2,3 kcal/g e possono avere un lieve effetto lassativo.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per pastiglia, cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Froben antisettico gola

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Adulti

Una pastiglia ogni 2 o 3 ore, al bisogno, fino a un massimo 8 pastiglie in 24 ore,

Anziani

Non è necessario ridurre la dose negli anziani.

Uso nei bambini

Bambini di età superiore ai 6 anni

Una pastiglia ogni 2 o 3 ore, al bisogno, fino ad un massimo di 4 pastiglie in 24 ore, con un intervallo di tempo minimo fra le pastiglie di 2 ore.

Bambini di età inferiore ai 6 anni

Non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Sciogliere le pastiglie lentamente in bocca. Froben antisettico gola non deve essere deglutito, masticato o morsicato.

Se prende più Froben antisettico gola di quanto deve

Se supera il dosaggio raccomandato, potrebbe avvertire disturbi gastrointestinali. Smetta di prendere questo medicinale e consulti il medico o il farmacista.

Se dimentica di prendere Froben antisettico gola

Continui a utilizzare normalmente questo medicinale.

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In caso di ipersensibilità a questo medicinale, interrompa l'assunzione di questo medicinale e consulti il medico o il farmacista. Se uno degli effetti indesiderati dovesse peggiorare, o se notasse la comparsa di qualche effetto indesiderato non elencato in questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

- Reazioni di ipersensibilità (i sintomi possono includere eruzione cutanea, bruciore, sensazione di prurito, gonfiore della bocca o della gola).
 - Dolore alla pancia (dolore addominale).
 - Nausea.
 - Fastidio orale.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Froben antisettico gola

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Froben antisettico gola

- I principi attivi sono amilmetacresolo e 2,4-diclorobenzil alcool.
Ogni pastiglia contiene 0,6 mg di amilmetacresolo e 1,2 mg di 2,4-diclorobenzil alcool.
- Gli altri componenti sono olio di menta piperita, giallo di chinolina (E104), saccarina sodica (E954), acido tartarico (E334), isomalto (E953), maltitolo liquido (E965), olio di anice stellato, levomentolo e indaco carminio 190 (E132).

Descrizione dell'aspetto di Froben antisettico gola e contenuto della confezione

Froben antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg Pastiglie aroma Menta sono pastiglie di colore verde, rotonde e aromatizzate alla menta.

Froben antisettico gola è confezionato in blister con 16 o 24 pastiglie.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Mylan S.p.A.,
Via Vittor Pisani,

20, 20124 Milano, Italia

Produttore

Lozy's Pharmaceuticals, S.L,
Campus Empresarial 31795 Lekaroz (Navarra),
Spagna

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Irlanda Amylmetacresol/2, 4-Dichlorobenzyl alcohol Mylan 0.60 mg/1.2 mg mint lozenges
Italia Froben antisettico gola
Slovacchia Oroakut

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il {MM/AAAA}.

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Froben antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg Pastiglie aroma Miele e Limone

amilmetacresolo
2,4-diclorobenzil alcool

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Froben antisettico gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Froben antisettico gola
3. Come prendere Froben antisettico gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Froben antisettico gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Froben antisettico gola e a cosa serve

Froben antisettico gola contiene amilmetacresolo e 2,4-diclorobenzil alcool. Questi principi attivi sono entrambi antisettici di livello medio e sono usati per il sollievo sintomatico delle infezioni della bocca e della gola.

L'azione di succhiare la pastiglia permette ai principi attivi di agire nella zona del disturbo e aiuta anche a lubrificare e lenire la zona dolorante. Questo aiuta ad alleviare il dolore e il fastidio della bocca e della gola.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni

2. Cosa deve sapere prima di prendere Froben antisettico gola

Questo medicinale è raccomandato per adulti, bambini (di età superiore a 6 anni) e anziani. I bambini di età inferiore ai 6 anni non devono usare questo medicinale.

Non prenda Froben antisettico gola:

- se è allergico all'amilmetacresolo, all'2,4-diclorobenzil alcool, al giallo tramonto (E110) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Froben antisettico gola se soffre o ha in corso qualsiasi altro problema alla gola.

Non utilizzi questo medicinale per un lungo periodo di tempo.

Generalmente, il mal di gola è una malattia lieve che non dura più di una settimana. Contatti il medico se i sintomi persistono per più di 3 giorni, se peggiorano o se compaiono altri sintomi poiché potrebbe essere necessario un trattamento diverso.

Bambini e adolescenti

A causa delle dimensioni delle pastiglie di Froben antisettico gola, i bambini piccoli possono soffocare. Froben antisettico gola non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Altri medicinali e Froben antisettico gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale potrebbe non essere adatto a lei.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non interferisce sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

Froben antisettico gola contiene isomalto (E953), maltitolo liquido (E965), giallo tramonto (E110) e sodio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

L'isomalto (E953) e il maltitolo (E965) hanno un potere calorico di 2,3 kcal/g e possono avere un lieve effetto lassativo.

Il giallo tramonto (E110) può causare reazioni allergiche.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per pastiglia, cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Froben antisettico gola

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Adulti

Una pastiglia ogni 2 o 3 ore, al bisogno, fino a un massimo di 8 pastiglie in 24 ore.

Anziani

Non è necessario ridurre la dose negli anziani.

Uso nei bambini

Bambini di età superiore ai 6 anni

Una pastiglia ogni 2 o 3 ore, al bisogno, fino ad un massimo di 4 pastiglie in 24 ore, con un intervallo di tempo minimo fra le pastiglie di 2 ore

Bambini di età inferiore ai 6 anni

Non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Sciogliere le pastiglie lentamente in bocca. Froben antisettico gola non deve essere deglutito, masticato o morsicato.

Se prende più Froben antisettico gola di quanto deve

Se supera il dosaggio raccomandato, potrebbe avvertire disturbi gastrointestinali. Smetta di prendere questo medicinale e consulti il medico o il farmacista.

Se dimentica di prendere Froben antisettico gola

Continui a utilizzare normalmente questo medicinale.
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In caso di ipersensibilità a questo medicinale, interrompa l'assunzione di questo medicinale e consulti il medico o il farmacista. Se uno degli effetti indesiderati dovesse peggiorare, o se notasse la comparsa di qualche effetto indesiderato non elencato in questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

- Reazioni di ipersensibilità (i sintomi possono includere eruzione cutanea, bruciore, sensazione di prurito, gonfiore della bocca o della gola).
 - Dolore alla pancia (dolore addominale).
 - Nausea.
 - Fastidio orale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Froben antisettico gola

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Froben antisettico gola

- I principi attivi sono amilmetacresolo e 2,4-diclorobenzil alcool.
Ogni pastiglia contiene 0,6 mg di amilmetacresolo e 1,2 mg di 2,4-diclorobenzil alcool.
- Gli altri componenti sono olio di menta piperita, giallo di chinolina (E104), saccarina di sodio (E954), acido tartarico (E334), isomalto (E953), maltitolo liquido (E965), giallo tramonto (E110), essenza di limone (l'essenza di limone contiene olio di limone, terpeni e citrale) e aroma di miele (l'aroma di miele contiene glicole propilenico).

Descrizione dell'aspetto di Froben antisettico gola e contenuto della confezione

Froben antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg Pastiglie aroma Miele e Limone sono pastiglie di colore giallo-arancio, rotonde e aromatizzate al miele-limone.

Froben antisettico gola è confezionato in blister con 16 o 24 pastiglie.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Mylan S.p.A.,
Via Vittor Pisani, 20, 20124
Milano, Italia

Produttore

Lozy's Pharmaceuticals, S.L.,
Campus Empresarial
31795 Lekaroz (Navarra),
Spagna

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Irlanda Amylmetacresol/2,4-Dichlorobenzyl alcohol Mylan 0.60 mg/1.2 mg honey & lemon lozenges
Italia Froben antisettico gola
Slovacchia Oroakut

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il {MM/AAAA}.