

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CITICOLINA GERMED 500 mg/4 ml soluzione iniettabile
CITICOLINA GERMED 1000mg/4 ml soluzione iniettabile

Citicolina

Medicinale Equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è CITICOLINA GERMED e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere CITICOLINA GERMED
3. Come prendere CITICOLINA GERMED
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CITICOLINA GERMED
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è CITICOLINA GERMED e a cosa serve

CITICOLINA GERMED contiene il principio attivo CITICOLINA che appartiene alla classe di farmaci neurologici, neurotrofici (che determinano la sopravvivenza, lo sviluppo e la funzione dei neuroni). CITICOLINA GERMED, grazie alla sua azione stimolante del sistema nervoso è indicata nel trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane.

2. Cosa deve sapere prima che le venga somministrato CITICOLINA GERMED

Non le deve essere somministrato CITICOLINA GERMED:

- Se è allergico alla citicolina ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o, al farmacista prima che le venga somministrato CITICOLINA GERMED:

- se ha un grave edema alla testa. In questo caso il medico le prescriverà di prendere farmaci come il mannitolo e i corticosteroidi che riducono la pressione all'interno del suo cranio;
- se mostra sanguinamenti all'interno del cranio.

La citicolina non sostituisce tutti gli altri provvedimenti terapeutici necessari nella terapia del Parkinson, ma li affianca e li integra.

In caso di somministrazione all'interno della vena (endovenosa), inietti il farmaco molto lentamente.

Altri medicinali e CITICOLINA GERMED

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche se non prescritto dal medico.

Alcuni medicinali possono alterare l'effetto di CITICOLINA GERMED oppure l'effetto di questi medicinali può essere modificato da CITICOLINA GERMED. Pertanto informi il suo medico se sta assumendo:

- L-dopa (farmaco usato per la cura del Morbo di Parkinson).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Assuma CITICOLINA GERMED solo nei casi di effettiva necessità e sotto il controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

CITICOLINA GERMED non altera la capacità di guidare o di utilizzare altri macchinari.

Importanti informazioni sugli eccipienti

CITICOLINA GERMED 500 mg/4 ml soluzione iniettabile contiene sodio

Questo medicinale contiene 23,5 mg di sodio per fiala. Ciò deve essere tenuto in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o per coloro che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

CITICOLINA GERMED 1000mg/4 ml soluzione iniettabile contiene sodio

Questo medicinale contiene 47,1 mg di sodio per fiala. Ciò deve essere tenuto in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o per coloro che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

3. Come viene somministrato CITICOLINA GERMED

CITICOLINA GERMED viene generalmente somministrato da un medico o da un infermiere tramite un'iniezione effettuata direttamente in un muscolo, in vena o tramite flebo, diluito con le più comuni soluzioni per infusione.

La dose raccomandata è 1 - 2 fiale da 500 mg o 1 fiala da 1000 mg al giorno per via intramuscolare o per via endovenosa lenta o tramite flebo in vena.

Se le viene somministrato più CITICOLINA GERMED di quanto deve

Se dovessero esserle somministrate accidentalmente quantità eccessive di CITICOLINA GERMED, contatti il suo medico o si rechi presso il più vicino pronto soccorso ospedaliero. Ricordi di portare con sé il medicinale o eventuali compresse rimanenti.

Se dimentica di prendere CITICOLINA GERMED

Se salta un'iniezione, deve riceverla il prima possibile. Se però è quasi l'ora di ricevere la successiva iniezione programmata, salti l'iniezione dimenticata. Non prenda una dose doppia (due iniezioni insieme) per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-azioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CITICOLINA GERMED

TENERE QUESTO MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CITICOLINA GERMED

Il principio attivo è la citicolina.

Una fiala di CITICOLINA GERMED 500 mg/4 ml soluzione iniettabile contiene 500 mg di citicolina.

Gli altri componenti sono: acqua per preparazioni iniettabili.

Una fiala di CITICOLINA GERMED 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile contiene 1000 mg di citicolina.

Gli altri componenti sono: acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di CITICOLINA GERMED e contenuto della confezione

Soluzione iniettabile.

CITICOLINA GERMED 500 mg/4 ml soluzione iniettabile è disponibile in astuccio di cartone contenente 5 fiale di vetro da 4 ml.

CITICOLINA GERMED 1000 mg/4 ml soluzione iniettabile è disponibile in astuccio di cartone contenente 3 fiale di vetro da 4 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

TITOLARE

GERMED Pharma S.r.l.
Via Venezia, 2
20834 Nova Milanese (MB)
Italia

PRODUTTORE

Esseti Farmaceutici S.r.l.
Via Campobello, 15
00071 Pomezia (Roma)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il