

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

VIAPRES 4 mg compresse rivestite con film

VIAPRES 6 mg compresse rivestite con film

Lacidipina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo
- Se ha qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cosa è Viapres e a che cosa serve
2. Prima di prendere/usare Viapres
3. Come prendere/usare Viapres
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Viapres
6. Altre informazioni

1. Cos'è Viapres e a che cosa serve

Viapres è usato per il trattamento della pressione alta del sangue (ipertensione). Appartiene ad una classe di medicinali chiamati "bloccanti dei canali del calcio". Viapres ha la proprietà di allargare (dilatare) i vasi sanguigni, facilitando il flusso sanguigno e abbassando la pressione.

2. Prima di prendere Viapres

Non prenda Viapres:

- se è **allergico** (ipersensibile) al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Viapres
- se lei è affetto da una malattia del cuore chiamata **stenosi aortica**. Questa malattia è un restringimento della valvola che permette al sangue di essere pompato fuori dal cuore
- se lei pensa che una di queste condizioni la riguardi, non prenda Viapres prima di averne parlato con il suo medico.

Faccia particolare attenzione con Viapres

Prima del trattamento con Viapres il suo medico deve sapere:

- se lei ha **problemi di cuore**
- se lei ha **malattie del fegato**
- Viapres contiene lattosio: se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Assunzione di Viapres con altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Alcuni medicinali possono alterare l'attività di Viapres, o aumentarla provocando effetti collaterali. Viapres può anche alterare l'attività di altri medicinali. Tra cui:

- altri medicinali utilizzati per il trattamento della **pressione alta del sangue** come la furosemide, propanololo o captopril
- cimetidina (per il trattamento di **ulcere allo stomaco**)
- ciclosporina (usata per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organi o per alcune malattie autoimmuni).
- l'uso concomitante di lacidipina e corticosteroidi o tetracosactide può diminuire l'effetto antiipertensivo

Parli con il medico o il farmacista se sta prendendo uno di questi medicinali.

Assunzione di Viapres con cibi e bevande

Non beva succo di pompelmo mentre sta prendendo Viapres.

Gravidanza e allattamento

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non ci sono informazioni sulla sicurezza di impiego di Viapres in gravidanza. Se lei è **gravida o pensa di esserlo**, o se **sta pianificando una gravidanza non prenda Viapres** senza prima avere verificato con il suo medico. **Il suo medico** prenderà in considerazione rischi e benefici legati all'assunzione di Viapres per lei e per il suo bambino.

Il principio attivo e gli eccipienti di Viapres possono passare nel latte materno. **Se lei sta allattando, verifichi col suo medico** prima di iniziare la terapia con Viapres.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Viapres può causare vertigini. I pazienti dovrebbero essere allertati a non guidare o non usare macchinari se soggetti a vertigini o sintomi associati.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Viapres

Viapres contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Viapres

Quanto prenderne

Prenda Viapres sempre seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il suo medico o farmacista. Verifichi con il suo medico o con il suo farmacista se non è sicuro.

La dose usuale di partenza di Viapres è di 2 mg una volta al giorno, la mattina.

Il suo medico può decidere se aumentare la dose a 4 o 6 mg, una volta al giorno la mattina dopo circa 3-4 settimane di terapia.

Come prenderlo

Deglutire la compressa con un po' di acqua.

È preferibile prendere la medicina ogni giorno alla stessa ora.

Può prendere Viapres con o senza cibo.

Se dimentica di prendere Viapres

Se dimentica di prendere una dose, prenda la successiva alla stessa ora. **Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.**

Se prende più Viapres di quanto deve

Se prende troppe compresse di Viapres è **molto probabile un abbassamento della pressione del sangue e un cambiamento del battito cardiaco che può aumentare o diminuire.**

Si rivolga al medico o al farmacista per un consiglio.

Se interrompe il trattamento con Viapres

Prenda Viapres per il tempo raccomandato dal suo medico. Non interrompa l'assunzione di Viapres senza il consiglio del medico. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Viapres, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Viapres può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni

Possono riguardare **da 1 a 10 persone**:

- battiti irregolari del cuore (palpitazioni)
- battiti più veloci del cuore (tachicardia)
- gonfiore causato dai fluidi
- vertigini
- urinare di frequente
- cefalea
- rash cutanei (incluso arrossamento della pelle e prurito)

- vampate
- disturbi gastrici
- nausea
- stanchezza

Effetti indesiderati comuni che possono essere riscontrati con l'analisi del sangue:

- aumento reversibile del livello di un enzima chiamato fosfatasi alcalina

Effetti indesiderati non comuni

Questi possono riguardare **da 1 a 100 persone**:

- peggioramento del dolore toracico (peggiore di preesistente angina pectoris)
- pallore
- abbassamento della pressione sanguigna
- emorragie, gengive dolenti
- sincope
- ipotensione

Effetti indesiderati rari

Questi possono riguardare **da 1 a 1.000 persone**:

- gravi reazioni allergiche con gonfiore del viso, lingua o gola che possono causare difficoltà nella deglutizione o respirazione
- eritema pruriginoso nella pelle

Effetti indesiderati molto rari

Questi possono riguardare **da 1 a 10.000 persone**:

- agitazione o tremore delle braccia e delle gambe
- depressione

Se avete uno di questi effetti indesiderati

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati **peggiora**, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, **informi il medico o il farmacista**.

5. Come conservare Viapres

Tenere Viapres fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi Viapres dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

Conservare Viapres a temperatura non superiore ai 30°C.

Conservare nel contenitore originale per proteggere dalla luce.

Non estrarre la compressa dal blister fino a quando non la deve prendere.

Nel caso di assunzione di metà compressa da 4 mg, la rimanente metà deve essere riposta nel blister e reinserita nell'astuccio per proteggerla dalla luce ed essere assunta entro 48 ore.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Altre informazioni

Cosa contiene Viapres

Il principio attivo è Lacidipina. Viapres compresse è presente in diversi dosaggi.

Ogni compressa contiene:

4 mg di lacidipina

6 mg di lacidipina

Gli eccipienti sono:

Lattosio, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E 171), polietilenglicole (PEG) 400, polisorbato 80

Descrizione dell'aspetto di Viapres e contenuto della confezione

Compresse rivestite con film.

VIAPRES 4 mg compresse rivestite con film:

Compresse rivestite con film, bianche, ovali, biconvesse con linea di frattura su entrambi i lati. In aggiunta su un lato è impressa la scritta "GS" e sull'altro la scritta "3MS".

14 e 28 compresse rivestite con film divisibili da 4 mg
14, 28 e 35 compresse rivestite con film da 6 mg

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

CRINOS S.p.A. – Via Pavia, 6 – 20136 MILANO

Produttore

GlaxoSmithKline S.p.A. – Strada statale Asolana 68 - S. Polo di Torrile - Parma

GlaxoSmithKline S.p.A. – Via A. Fleming 2 – Verona

Glaxo Wellcome S.A. – Avenida de Extremadura, 3 – Aranda de Duero – Burgos (Spagna)

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il 11 Dicembre 2012

Agenzia Italiana del Farmaco