

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore
Medicinale equivalente

Duobexon 25 microgrammi / 50 microgrammi / dose sospensione pressurizzata per inalazione
Duobexon 25 microgrammi / 125 microgrammi/ dose sospensione pressurizzata per inalazione
Duobexon 25 microgrammi / 250 microgrammi / dose sospensione pressurizzata per inalazione

Salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Duobexon e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Duobexon
3. Come usare Duobexon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Duobexon
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Duobexon e a cosa serve

Duobexon contiene due principi attivi: salmeterolo e fluticasone propionato.

- Salmeterolo è un broncodilatatore a lunga durata d'azione. I broncodilatatori aiutano le vie aeree nei polmoni a rimanere libere. Questo fa sì che l'aria entri ed esca più facilmente. Gli effetti durano per almeno 12 ore.
- Fluticasone propionato è un corticosteroide che riduce il gonfiore e l'irritazione nei polmoni.

Il medico le ha prescritto questo medicinale per aiutarla a prevenire problemi respiratori come l'asma. Deve usare Duobexon ogni giorno, come prescritto dal suo medico. Ciò assicura che il medicinale agisca correttamente per controllare l'asma.

Duobexon aiuta a bloccare l'insorgenza di respiro corto e di sibilo respiratorio. Tuttavia Duobexon non deve essere usato per trattare un attacco improvviso di [respiro corto o di respiro sibilante](#). Se questo accade lei deve usare il suo inalatore "di sollievo" ("di soccorso") a rapida insorgenza di azione, come salbutamolo. Lei deve sempre avere con sé il suo inalatore "di soccorso" a rapida insorgenza di azione.

2. Cosa deve sapere prima di usare Duobexon

Non usi Duobexon:

- Se è allergico al salmeterolo, al fluticasone propionato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al suo medico o al farmacista prima di usare Duobexon se soffre di:

- malattia cardiaca, compreso battito cardiaco irregolare o rapido;
- iperattività della ghiandola tiroidea ;
- pressione sanguigna alta;
- diabete mellito (Duobexon può aumentare il livello di zuccheri nel sangue);
- livelli bassi di potassio nel sangue;
- tubercolosi (TB), ora o in passato, o altre infezioni polmonari.

Contatti il suo medico se si verificano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Altri medicinali e Duobexon

Informi il suo medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale inclusi medicinali per l'asma o qualunque altro medicinale ottenuto senza prescrizione medica. Questo perché può non essere appropriato assumere Duobexon con altri medicinali.

Prima di iniziare a usare Duobexon, informi il medico se sta assumendo i seguenti medicinali:

- Beta-bloccanti (come atenololo, propranololo, e sotalolo). I beta-bloccanti sono usati principalmente per trattare la pressione sanguigna alta o per altre condizioni cardiache.
- Medicinali per trattare le infezioni (come ketoconazolo, itraconazolo ed eritromicina) inclusi alcuni medicinali per il trattamento dell'HIV (come ritonavir e medicinali contenenti cobicistat). Alcuni di questi medicinali, possono aumentare la quantità di fluticasone propionato o di salmeterolo nel corpo. Questo può aumentare il rischio che si verifichino effetti indesiderati con Duobexon, che includono battito cardiaco irregolare, o potrebbe peggiorare gli effetti indesiderati. Il medico può volerla monitorare attentamente se sta assumendo questi medicinali.
- Corticosteroidi (per bocca o per iniezione). Se lei ha assunto uno di questi medicinali recentemente, ciò può aumentare il rischio che questo medicinale interferisca con la ghiandola surrenale.
- Diuretici, anche noti come "medicinali per urinare" usati per trattare la pressione alta del sangue.
- Altri broncodilatatori (come il salbutamolo).
- Medicinali a base di xantine. Questi sono spesso usati per trattare l'asma.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

È improbabile che Duobexon alteri la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Per chi svolge attività sportiva

L'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.

3. Come usare Duobexon

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- Usi Duobexon ogni giorno finché il medico non le dirà di interrompere la terapia. Non superi la dose raccomandata. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

- Non smetta di usare Duobexon né riduca il dosaggio di Duobexon senza aver prima consultato il medico.
- Duobexon deve essere inalato nei polmoni attraverso la bocca.
- Usi Duobexon tenendo sempre il conto delle erogazioni. L'inalatore è stato progettato per fornire 120 erogazioni. Tuttavia non è possibile stabilire quando l'inalatore è vuoto e quando ha rilasciato 120 erogazioni. Potrebbe esserci ancora una piccola quantità di fluido nel contenitore. Si assicuri che l'inalatore venga sostituito dopo aver rilasciato 120 erogazioni, in modo da poter essere sicuri di ricevere la giusta quantità di medicinale in ogni erogazione.

Adulti e adolescenti di età uguale o maggiore a 12 anni

- Duobexon 25/50 - 2 inalazioni due volte al giorno
- **Duobexon 25/125 - 2 inalazioni due volte al giorno**
- **Duobexon 25/250 - 2 inalazioni due volte al giorno**

Bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni

- Duobexon 25/50 - 2 inalazioni due volte al giorno
- Duobexon non è raccomandato per l'uso nei bambini di età inferiore ai 4 anni.

I sintomi possono essere ben controllati usando Duobexon due volte al giorno. Se ciò accadesse, il medico potrebbe decidere di ridurre la dose a una sola volta al giorno. La dose può essere modificata in questo modo:

- una volta, la sera - se ha sintomi **notturni**.
- una volta, la mattina - se ha sintomi **diurni**.

È molto importante seguire le istruzioni del medico sul numero di inalazioni da effettuare e con quale frequenza assumere il medicinale. Se sta usando Duobexon per l'asma, il medico controllerà regolarmente i suoi sintomi.

Tuttavia, se la sua asma o la respirazione peggiorano informi subito il medico. Potrebbe accadere che lei senta il suo respiro più affannoso, che avverta più frequentemente una costrizione al torace o che abbia bisogno di usare di più il suo farmaco "di soccorso" ad azione rapida. Se si verifica una qualsiasi di queste condizioni, deve continuare ad impiegare Duobexon ma non aumentare il numero delle dosi che lei assume. La sua condizione respiratoria potrebbe peggiorare fino a diventare particolarmente grave. Consulti il medico perché potrebbe essere necessaria l'adozione di un trattamento aggiuntivo.

Istruzioni per l'uso

- Il medico, l'infermiere o il farmacista le mostreranno come utilizzare il suo inalatore. Devono inoltre controllare a intervalli regolari come usa l'inalatore. L'uso non corretto o non come prescritto di Duobexon, può comportare che esso non l'aiuterà a trattare l'asma come dovrebbe.
- Il medicinale è contenuto in un contenitore pressurizzato allocato in un rivestimento di plastica munito di un boccaglio.
- Un inalatore nuovo contiene medicinale a sufficienza per erogare un minimo di 120 erogazioni. Dopo 120 erogazioni, l'inalatore potrebbe non disporre più di una sufficiente quantità di medicinale per somministrare una dose completa di farmaco.

Verifica del funzionamento dell'inalatore

1. Quando si usa l'inalatore per la prima volta, bisogna verificare che funzioni. Per testare l'inalatore, rimuova il cappuccio protettivo del boccaglio premendolo delicatamente ai lati con il pollice e l'indice e lo estraiga.

2. Per assicurarsi che l'inalatore funzioni, lo agiti bene, punti il boccaglio lontano da sé e prema il contenitore fermamente per rilasciare uno spruzzo nell'aria. Ripeta questi passaggi, agitando l'inalatore prima di rilasciare un secondo spruzzo nell'aria. Il numero totale di erogazioni rilasciate nell'aria, prima di usare l'inalatore, deve essere pari a due.
3. Dopo le prime due erogazioni di prova, lei può iniziare ad usare il suo inalatore.
4. Se non ha usato il suo inalatore per una settimana o più, o se l'inalatore diventa molto freddo (sotto 0°C), rilasci due spruzzi del medicinale nell'aria.


Avvertenze

Non rimuovere mai il contenitore di metallo dall'inalatore in nessun momento.

Solo se l'inalatore diventa molto freddo (sotto 0°C), estraiga il contenitore di metallo dalla custodia di plastica e lo riscaldi tra le mani per pochi minuti prima dell'uso. Non usi mai null'altro per riscaldarlo. Dopo averlo riscaldato e prima dell'uso, prema il contenitore fermamente per rilasciare due spruzzi nell'aria.

Uso dell'inalatore

È importante iniziare a inspirare il più lentamente possibile subito prima di usare l'inalatore.



1. Stia in piedi o seduto in posizione eretta quando usa il suo inalatore.
2. Rimuova il cappuccio del boccaglio (Figura A).
3. Controlli all'interno ed all'esterno per verificare che il boccaglio sia pulito e libero da polvere o da altre particelle depositate.
4. Agiti l'inalatore per 4 o 5 volte per assicurarsi che il contenuto dell'inalatore sia miscelato in modo uniforme (Figura B).
5. Tenga l'inalatore in posizione verticale con il pollice sulla base, sotto il boccaglio. Espiri per quanto più possibile (Figura C).
6. Posizioni il boccaglio in bocca in mezzo ai denti. Vi chiuda le labbra attorno. Non morda il boccaglio.
7. Inspiri attraverso la bocca lentamente e profondamente. Subito dopo aver iniziato a inspirare, prema con fermezza la parte superiore del contenitore per rilasciare uno spruzzo del medicinale. Effettui tale operazione mentre sta ancora inspirando regolarmente e profondamente (Figura D).
8. Trattenga il respiro, tolga l'inalatore dalla bocca e il dito dalla parte superiore dell'inalatore. Continui a trattenere il respiro per alcuni secondi, o per quanto più è possibile.
9. Attenda circa mezzo minuto tra l'assunzione di uno spruzzo del medicinale e il successivo e poi ripeta i passaggi da 4 a 8.
10. In seguito, sciacqui la bocca con acqua e la sputi e/o si lavi i denti. Questo può aiutare a prevenire il verificarsi di candidiasi e raucedine.
11. Dopo l'uso, riponga sempre il cappuccio del boccaglio in modo da evitare l'ingresso di polvere. (Figura E). Quando il cappuccio del boccaglio è posizionato correttamente sentirà uno scatto. Non impieghi troppa forza.

Non esegua in maniera affrettata i passaggi 5, 6, 7 e 8. È importante che lei inspiri il più lentamente possibile subito prima di usare l'inalatore. Deve usare il suo inalatore mentre sta davanti a uno specchio per le prime volte. Se nota una perdita di prodotto, che appare come una "nebbiolina" che proviene dalla parte superiore del suo inalatore o ai lati della bocca, deve ricominciare dal passaggio 4.

Come con tutti gli inalatori, coloro che si prendono cura dei bambini devono assicurarsi che coloro ai quali è stato prescritto Duobexon utilizzino la tecnica corretta di inalazione, come sopra descritto.

Se lei o il suo bambino trovasse difficoltoso usare l'inalatore, il suo medico o un altro operatore sanitario potrebbe raccomandarle l'utilizzo di un dispositivo distanziatore AeroChamber Plus® con l'inalatore. Il medico, infermiere, farmacista o altro operatore sanitario deve mostrarle come utilizzare il distanziatore con l'inalatore, come aver cura del distanziatore e rispondere a tutte le domande che lei potrebbe avere. È importante che se utilizza un distanziatore con l'inalatore non smetta di usarlo senza prima parlarne con il suo medico o l'infermiere, o il farmacista. **Altri dispositivi distanziatori non sono raccomandati per l'uso con Duobexon e non si dovrebbe passare dal dispositivo AeroChamber Plus® ad un altro.** È anche importante che lei non cambi o smetta di usare il distanziatore senza parlarne con il suo medico, lui le dirà come modificare la terapia. Parli sempre con il medico prima di apportare qualsiasi modifica al suo trattamento dell'asma.

I bambini più grandi o le persone con mani deboli possono trovare più facile tenere l'inalatore con entrambe le mani. Posizionare i due indici sulla parte superiore dell'inalatore ed entrambi i pollici in basso sulla parte inferiore sotto il boccaglio.

Pulizia dell'inalatore

Per prevenire il blocco dell'inalatore, è importante pulirlo almeno una volta a settimana.

Per pulire l'inalatore:

- Rimuova il cappuccio del boccaglio.
- Non rimuova il contenitore di metallo dall'inalatore di plastica in nessun caso.
- Pulisca l'esterno e l'interno del boccaglio e l'involucro di plastica con un panno o un tessuto asciutto.
- Riposizioni il cappuccio protettivo sul boccaglio. Se correttamente posizionato, farà uno "scatto" quando raggiungerà la posizione corretta.
- Non impieghi una eccessiva forza.
- Non metta il contenitore di metallo in acqua.

Se usa più Duobexon di quanto deve

È importante usare l'inalatore secondo le istruzioni. Se accidentalmente ha assunto una dose superiore a quella raccomandata, consulti il suo medico o il farmacista. Potrebbe notare che il suo cuore batta più frequentemente del solito e avvertire dei tremori. Potrebbe anche avere capogiri, mal di testa, debolezza muscolare e dolore alle articolazioni.

Se ha assunto dosi più alte per un lungo periodo di tempo, parli con il suo medico o il farmacista per un consiglio. Ciò perché dosi superiori di Duobexon possono ridurre la quantità di ormoni steroidei prodotti dalla ghiandola surrenale.

Se dimentica di usare Duobexon

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. [Prenda solo la dose successiva all'ora consueta.](#)

Se interrompe il trattamento con Duobexon

È molto importante assumere Duobexon ogni giorno, secondo prescrizione medica. Continui ad assumerlo fino a quando il medico non le dirà di interrompere il trattamento. Non interrompa l'assunzione e non riduca improvvisamente la sua dose di Duobexon. Questo potrebbe peggiorare la sua respirazione.

In aggiunta se lei smette bruscamente di assumere Duobexon o riduce la dose di Duobexon questo potrebbe causare (molto raramente) problemi con la ghiandola surrenale (insufficienza surrenale) che talvolta può causare effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati possono includere uno qualsiasi dei seguenti:

- Dolore di stomaco
- Stanchezza e perdita di appetito, sensazione di malessere
- Nausea e diarrea
- Perdita di peso
- Mal di testa o sonnolenza
- Abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue
- Abbassamento della pressione sanguigna e convulsioni (crisi)

Quando il suo organismo è sotto stress, in seguito a febbre, trauma (come dopo un incidente d'auto), infezione, o intervento chirurgico, l'insufficienza surrenale può peggiorare e potrebbe verificarsi qualcuno degli effetti indesiderati elencati sopra.

Se si verifica uno qualsiasi degli effetti indesiderati, si rivolga al suo medico o farmacista. Per prevenire il manifestarsi di tali sintomi, il suo medico può prescrivere l'assunzione di dosi supplementari di corticosteroidi in compresse (come il prednisolone).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, all'infermiere o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Per ridurre la possibilità che si manifestino effetti indesiderati, il medico le prescriverà la dose più bassa di Duobexon necessaria a controllare l'asma.

Reazioni allergiche: lei può notare che il suo respiro peggiora improvvisamente dopo l'assunzione di Duobexon. Lei può avere un respiro sibilante e tosse o manifestare mancanza di respiro. Può anche notare prurito, eruzione cutanea (orticaria) e gonfiore (normalmente del viso, delle labbra, della lingua o della gola) oppure potrebbe improvvisamente sentire che il suo cuore batte molto velocemente o avvertire la sensazione di debolezza e di giramento di testa (che può farla collassare o farle perdere coscienza). **Se nota la presenza di uno qualsiasi di tali effetti o se si verificano improvvisamente dopo l'uso di Duobexon, smetta di usare Duobexon ed informi immediatamente il medico.** Le reazioni allergiche a Duobexon sono non comuni (interessano meno di 1 persona su 100).

Altri effetti indesiderati sono elencati di seguito:

Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- Mal di testa – che normalmente migliora con il proseguimento della terapia.
- In pazienti con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è stato segnalato un aumento del numero di raffreddori.

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- Mughetto (placche sollevate dolenti, di colore giallo-crema) nella bocca e nella gola. Inoltre lingua dolente, voce roca e irritazione della gola. Sciacquare la bocca con acqua e sputarla immediatamente

e/o spazzolare i denti dopo l'assunzione di ogni dose di medicinale può aiutare. Il medico può prescrivere un medicinale antifungino per trattare il mugugno.

- Dolore, rigonfiamento delle articolazioni e dolore muscolare.
- Crampi muscolari.

Sono stati anche segnalati i seguenti effetti indesiderati in pazienti con Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)

- Polmonite e bronchite (infezione del polmone). Informi il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti sintomi: aumento della produzione di espettorato, cambio nel colore dell'espettorato, febbre, brividi, aumento della tosse, aumento dei problemi respiratori.
- Contusioni e fratture.
- Infiammazione dei seni nasali (una sensazione di tensione o di pienezza del naso, delle guance e dietro gli occhi, talvolta accompagnata da un dolore pulsante).
- Riduzione del contenuto di potassio nel sangue (si possono osservare un battito cardiaco irregolare, debolezza muscolare, crampi).

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Aumento del contenuto di zucchero (glucosio) nel sangue (iperglicemia). Se lei è affetto da diabete, possono rendersi necessari un controllo più frequente della glicemia e, eventualmente, un aggiustamento della terapia antidiabetica.
- Cataratta (opacità del cristallino dell'occhio).
- Battito cardiaco molto accelerato (tachicardia).
- Sensazione di scuotimento (tremore) e battito veloce o irregolare del cuore (palpitazioni) – questi effetti indesiderati sono generalmente innocui e diminuiscono con il proseguimento della terapia.
- Dolore toracico.
- Sensazione di preoccupazione (questo effetto si verifica particolarmente nei bambini).
- Sonno disturbato.
- Eruzione cutanea allergica.

Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000)

- **Difficoltà nella respirazione o respiro sibilante che peggiora immediatamente dopo aver assunto Duobexon.** Se ciò si verifica, **interrompa immediatamente l'uso dell'inalatore Duobexon.** Usi il suo medicinale "di soccorso" a rapida insorgenza di azione per aiutare la respirazione **ed informi immediatamente il medico.**
- Duobexon può alterare la normale produzione di ormoni steroidei nell'organismo, particolarmente se ne ha assunto alte dosi per un periodo di tempo prolungato. Gli effetti includono:
 - rallentamento della crescita in bambini ed adolescenti
 - assottigliamento delle ossa
 - glaucoma
 - aumento di peso
 - aspetto arrotondato (a forma di luna) del viso (Sindrome di Cushing)

Il medico la controllerà regolarmente per verificare la presenza di uno qualsiasi di questi effetti indesiderati e si assicurerà che lei assuma la più bassa dose di Duobexon per controllare la sua asma.

- Cambiamenti comportamentali, come iperattività inusuale e irritabilità (questi effetti si verificano principalmente nei bambini).
- Battito cardiaco irregolare o presenza di battiti cardiaci in più (aritmie). Informi il medico ma non smetta di assumere Duobexon, a meno che il medico non le dica di interromperne l'assunzione del medicinale.

- Infezione fungina nell'esofago (gola), che potrebbe causare difficoltà nella deglutizione.

Frequenza non nota, (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- Depressione o aggressività. È più probabile che questi effetti si verifichino nei bambini.
- Visione offuscata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Duobexon

- **Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**
- Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla confezione dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
- Non conservi ad una temperatura superiore a 25°C.
- Il contenitore contiene un liquido pressurizzato. Non esporre a temperature superiori ai 50°C, proteggere il medicinale dalla luce solare diretta. Non forare, rompere o bruciare il contenitore anche se apparentemente vuoto.
- Non usi questo medicinale se nota segni visibili di deterioramento.
- Come per la maggior parte dei medicinali per inalazione in contenitori pressurizzati, l'effetto terapeutico di questo medicinale può diminuire quando il contenitore è freddo.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Duobexon

I principi attivi sono salmeterolo e fluticasone propionato.

Ogni dose pre-dosata contiene 25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 50, **125 o 250** microgrammi di fluticasone propionato.

L'altro componente è il propellente: norflurano (HFA 134a).

Descrizione dell'aspetto di Duobexon e contenuto della confezione

- Duobexon è disponibile come inalatore pre-dosato che rilascia il medicinale in sospensione pressurizzata pronta per l'inalazione attraverso la bocca nei polmoni.
- Il contenitore pressurizzato contiene una sospensione per inalazione omogenea.
- Il contenitore è posto in un erogatore in materiale plastico fornito di un boccaglio e [di un cappuccio protettivo antipolvere di colore lilla.](#)
- Oppure
Il contenitore è posto in un erogatore in materiale plastico fornito di un boccaglio e [di un cappuccio protettivo antipolvere di colore porpora.](#)
- Oppure
Il contenitore è posto in un erogatore in materiale plastico fornito di un boccaglio e [di un cappuccio protettivo antipolvere di colore viola.](#)
- Ogni confezione contiene 1 inalatore. Ogni inalatore contiene 120 erogazioni.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Genetic S.p.A.

Via G. Della Monica 84083, Castel San Giorgio (SA) Italia

Produttore

Genetic S.p.A. Contrada Canfora, Fisciano 84084, Salerno Italia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Portogallo: Duobix

Italia: Duobexon

Olanda: Salmeterol/Fluticasonpropionaat Genetic 25 microgram/50 microgram/dosis, aërosol, suspensie

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Genetic 25 microgram/125 microgram/dosis, aërosol, suspensie

Salmeterol/Fluticasonpropionaat Genetic 25 microgram/250 microgram/dosis, aërosol, suspensie

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta il: MM/YYYY