

**ACIDO PIPEMIDICO Dr. Reddy's**  
"400 mg capsule rigide" 20 capsule

*Acido pipemidico*

Medicinale equivalente

**COMPOSIZIONE**

Ogni capsula contiene:

*Principio attivo:* acido pipemidico mg 400

*Eccipienti:* sodio carbossimetilamido, talco, magnesio stearato, amido, gelatina, titanio biossido (E 171).

**FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONE**

"400 mg capsule rigide" 20 capsule

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA (O TIPO DI ATTIVITÀ')**

Antibatterico per le infezioni del tratto urinario.

**TITOLARE A.I.C.:** Dr. Reddy's Srl, Via Fernanda Wittgens, 3 - Milano

**PRODOTTO DA:** I.B.N. Savio Srl  
Via E.Bazzano n° 14  
Ronco Scrivia (GE)

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Infezioni delle vie urinarie (cistiti, pieliti, cistopieliti, uretriti, ecc.) sostenute da germi sensibili.

**CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità individuale accertata al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.  
Pazienti con una storia pregressa di alterazioni tendinee dovute alla somministrazione di chinoloni.

Da non usarsi nell'infanzia.

**OPPORTUNE PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

Nel corso della terapia con ACIDO PIPEMIDICO Dr. Reddy's è preferibile evitare l'esposizione al sole od a lampade abbronzanti a causa di possibili reazioni di sensibilizzazione.

Nei casi gravi di insufficienza renale (clearance glomerulare inferiore a 10 ml/minuto) le concentrazioni renali, alle posologie indicate, possono non essere sufficienti.

L'uso prolungato o per cicli ripetuti dell'acido pipemidico non sembra favorire l'insorgenza di resistenze batteriche: è possibile che tale fenomeno sia dovuto alla proprietà di inibire i processi di

trasferimento delle resistenze batteriche, dimostrata dall'acido pipemidico nel corso di prove in vitro.

Molto raramente si possono verificare tendiniti che possono portare alla rottura del tendine.

I pazienti anziani possono essere maggiormente colpiti da tendiniti.

L'esercizio fisico intenso e il concomitante trattamento con corticosteroidi possono aumentare il verificarsi di tendiniti o rotture del tendine.

Se si sospettano tendiniti, il trattamento con acido pipemidico deve essere immediatamente interrotto e deve essere iniziato un appropriato trattamento per il tendine colpito (come ad esempio l'immobilizzazione).

## **AVVERTENZE SPECIALI**

Nelle donne in stato di gravidanza il farmaco deve essere somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di allattamento al seno il prodotto deve essere impiegato con prudenza in quanto passa in tracce nel latte materno.

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

## **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

La posologia consigliata è di 2 capsule al giorno in due somministrazioni a distanza di 12 ore, preferibilmente a stomaco pieno. È consigliabile assumere il farmaco per almeno 10 giorni per evitare il rischio di ricadute sempre possibili per tutte le terapie delle infezioni urinarie. In caso di infezioni croniche o di recidive, ACIDO PIPEMIDICO Dr. Reddy's può essere assunto anche per un lungo periodo di tempo.

## **EFFETTI INDESIDERATI**

Manifestazioni indesiderate di carattere digestivo (nausee, gastralgie) sono assai poco frequenti e si attenuano somministrando il farmaco a stomaco pieno. Molto rare le manifestazioni allergiche quali arrossamenti e orticaria.

Sono stati descritti alcuni casi rari di fotosensibilizzazione e casi molto rari di dermatite bollosa.

Sono stati anche segnalati casi molto rari di tendiniti.

Eccezionalmente si possono osservare manifestazioni neuro-sensoriali e psichiche con vertigini e disturbi dell'equilibrio.

**Comunicare al proprio medico curante o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.**

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione dell' Agenzia Italiana del Farmaco Sito web:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**"Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione"**

**Conservare a temperatura non superiore a 30°C e al riparo dalla luce.**

**REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Agenzia Italiana del Farmaco