FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film

Finasteride

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film e a che cosa serve
2. Prima di prendere Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film
3. Come prendere Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film
6. Altre informazioni

1. CHE COS'È FINASTERIDE REDDY 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM E A CHE COSA SERVE

Il suo medico le ha prescritto queste compresse perché lei si trova ad uno stadio iniziale della perdita di capelli maschile, anche nota come alopecia androgenetica (AGA). Finasteride Reddy 1 mg compresse è usato per prevenire la perdita di capelli e per stimolare la loro crescita nell'uomo.

La sostanza attiva (che fa agire questo farmaco) è finasteride. Finasteride è un tipo di medicina chiamata inibitore della 5-alfa-riduttasi.

2. PRIMA DI PRENDERE FINASTERIDE REDDY 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM

Non prenda Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film
- se è **allergico** a finasteride o ad uno qualsiasi degli ingredienti di queste compresse, elencati in sezione 6.
- se è una **donna.**

Prima di prendere Finasteride Reddy 1 mg compresse verifichi col suo medico
- se ha grosse difficoltà **al passaggio dell'urina**
- se soffre di **disturbi al fegato**
- Finasteride può influenzare un test del sangue chiamato PSA. Se necessita di un test PSA dovrebbe dire al suo medico che sta prendendo finasteride.

Riferisca immediatamente al suo medico qualsiasi variazione al petto, tipo grumi, dolore, ingrossamento del petto, o perdite dal capezzolo, poiché tali segni potrebbero indicare una condizione grave, quale un cancro al seno.

Documento reso disponibile da AIFA il 11/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Assunzione di Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film con altri medicinali
Finasteride 1 mg compresse rivestite generalmente non interferisce con altri farmaci. Comunque informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Gravidanza
Le donne **non devono usare** Finasteride compresse.

Finasteride può attraversare la pelle, per cui le compresse sono rivestite con film al fine di prevenire il contatto con finasteride. Le donne incinte o che potrebbero diventarlo **non devono manipolare compresse di Finasteride spezzate o frantumate**. Se finasteride è assorbito attraverso la pelle da una donna incinta di un feto di sesso maschile, può influenzare negativamente il normale sviluppo degli organi genitali del bimbo.

Se la sua partner sessuale è o potrebbe essere incinta, deve **evitare di esporla al suo liquido seminale**, che potrebbe contenere piccole quantità di finasteride – ad esempio utilizzando un preservativo durante l'attività sessuale.

Se pensa che una donna incinta sia venuta in contatto con finasteride, lo comunichi al medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non è noto se la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari siano influenzati da questo farmaco.

Contenuto di zucchero
Questo farmaco contiene un tipo di zucchero chiamato lattosio, se il suo dottore le ha detto che ha una intolleranza agli zuccheri, non assuma le compresse.

3. COME PRENDERE FINASTERIDE REDDY 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM

Finasteride Reddy 1 mg compresse è per uso orale e **solo per uomini**.

Prenda sempre il suo farmaco esattamente nel modo in cui glielo ha detto il medico ed in accordo alle istruzioni stampate sull'etichetta della confezione. Se non è sicuro, chieda al suo medico o farmacista.

Adulti: La dose usuale è di **una compressa ogni giorno** con o senza cibo.
Le compresse devono essere **inghiottite intere** e **non devono essere rotte o spezzate.**

Bambini: Finasteride Reddy 1 mg compresse **non deve essere dato** a bambini.

Pazienti anziani o con disturbi renali: Generalmente non è necessario alcun aggiustamento di dose, deve essere usata la stessa dose degli altri adulti.

Se prende più Finasteride Reddy 1 mg compresse di quanto dovrebbe
Se ha preso un numero di compresse superiore a quello raccomandato, contatti il suo dottore o farmacista per un parere immediatamente. Non sono stati riportati effetti collaterali in queste circostanze.

Se dimentica di prendere Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film
Non appena lo ricorda, prenda la compressa, dopo prenda la compressa successiva come al solito il giorno seguente.

Non prenda una dose doppia per compensare quella dimenticata.

Durata del trattamento

Documento reso disponibile da AIFA il 11/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Generalmente sono necessari da tre a sei mesi di trattamento prima di arrestare la perdita dei capelli. Per prevenire una nuova ripresa della caduta dei capelli è necessario un trattamento prolungato. Se interrompe il trattamento, la perdita di capelli ricomincerà dopo 6 mesi e sarà come era stata nei 9-12 mesi precedenti.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non comuni (si manifestano in più di 1 su 1.000 ma meno che in 1 su 100 pazienti): Ridotto desiderio sessuale, difficoltà ad avere un'erezione, problemi di eiaculazione quali una ridotta quantità di liquido seminale.

Frequenza sconosciuta: battito cardiaco accelerato, morbidezza ed aumento di volume dei seni maschili, difficoltà ad avere un'erezione dopo l'interruzione del trattamento, gonfiore o dolore ai testicoli e reazioni allergiche quali rash della pelle, prurito, orticaria o gonfiore del viso o delle labbra. Prendere Finasteride Reddy 1 mg compresse per un lungo periodo può aumentare il rischio di infertilità..

Se ha avuto uno qualsiasi di questi effetti indesiderati, se peggiorano, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE FINASTERIDE REDDY 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM

Tenere Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film in un posto sicuro, fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non usi Finasteride Reddy 1 mg compresse rivestite con film dopo la data di scadenza che è riportata sul foglio di alluminio.
I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Ogni compressa contiene 1mg della sostanza attiva finasteride. Gli altri ingredienti sono: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), amido pregelatinizzato, glicolato amido di sodio (Tipo A), magnesio stearato (E470b), docusato sodico, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol e ossidi di ferro rosso e giallo (E172). Il contenuto di sodio di ogni compressa è pari a 3,85mg.

Finasteride Reddy 1 mg compresse sono marrone chiaro, rivestite con film con le seguenti scritte: 'FIN' su un lato e '1' sull'altro. Le compresse sono confezionate in blister contenenti 14, 28 o 98 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore (incluso il sito europeo di rilascio dei lotti)
Dr. Reddy's srl, via Wittgens Fernanda, 3 – 20123 Milano (IT)
Tel: 02 70106808; Fax: 02 73896792

Questo farmaco è stato autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:
Gran Bretagna: Finasteride 1mg film-coated Tablets (PL 08553/0251)
Spagna: Finasterida 1mg Aphar Comprimidos Recubiertos EFG

Documento reso disponibile da AIFA il 11/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Italia: Finasteride Reddy 1mg compresse rivestite con film
Bulgaria: ENYDE 1mg, филмирана таблетка
Romania: ENYDE 1mg, comprimate filmat
Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il: 09/2010

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 11/04/2021
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).