

ZINC IMIZOL
Collirio 10 ml
Zinco solfato, Nafazolina

Composizione

100 ml contengono: Zinco solfato F.U. g 1; Nafazolina nitrato g 0,07.

Eccipienti: Acido bórico; Sodio cloruro; Benzalconio cloruro; Acqua per preparazioni iniettabili.

Categoria farmacoterapeutica: Antisettico, decongestionante.

Titolare A.I.C

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 6/8, 56121 - Pisa

Prodotto e controllato da

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa

Indicazioni

Congiuntiviti (angolari, lacrimali, croniche); Blefarocongiuntiviti.

Controindicazioni

Il prodotto è controindicato:

- in soggetti affetti da glaucoma;
- nei pazienti che presentino ipersensibilizzazione verso qualsiasi componente del preparato, con particolare riguardo allo zinco solfato.
- non deve essere comunque impiegato nei bambini sotto i tre anni di età.

Precauzioni d'uso

Il prodotto se accidentalmente ingerito o se impiegato per lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici (sopore anche profondo ed ipotonia nei bambini) che richiedono una immediata assistenza medica.

Il prodotto va usato con cautela:

- nei pazienti in trattamento con farmaci anti-MAO;
- in presenza di stati ipertensivi, di diabete, di cardiopatie severe, di ipertiroidismo;

Non superare le dosi prescritte, non somministrare per oltre sette giorni consecutivi senza consultare il medico.

In gravidanza l'uso del preparato non presenta controindicazioni note.

Interazioni con altri medicinali

Non note.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini

Posologia

2 gocce nel sacco congiuntivale, 2 o più volte al dì, secondo prescrizione medica.


Effetti collaterali

In rari casi può verificarsi midriasi con transitorio incremento della tensione endoculare e talvolta iperemia congiuntivale compensatoria alla cessazione dell'azione del farmaco. Sono riportati occasionalmente effetti sistemici dovuti ad assorbimento (ipertensione, disturbi cardiaci, iperglicemia) ed inoltre cefalea e nausea.

Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilità. Anche in tal caso occorre interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea.

Per la presenza dello Zinco solfato si può avvertire, con l'instillazione, una transitoria e talvolta marcata sensazione di bruciore, priva di significato patologico.

Modalità d'impiego



Per aprire, premere la capsula di chiusura e contemporaneamente svitare. Dopo l'uso richiudere avvitando a fondo.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Si invita il paziente a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto in questo foglietto illustrativo.

Ultima revisione del testo da parte del Ministero della Salute Novembre 2003.

Confezione

Flacone contagocce da 10 ml.