

PROPIONAT  
Collirio 10 ml  
Propionato sodico

**Composizione:**

100 ml contengono: Propionato di sodio g 5.

*Eccipienti:* p-Idrossibenzoato di metile; p-Idrossibenzoato di propile, Acqua per preparazioni iniettabili.

**Categoria farmacoterapeutica**

Antimicrobico, antimicotico.

**Titolare A.I.C.**

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 6/8, 56121 - Pisa

**Prodotto e controllato da**

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa

**Indicazioni**

Blefarocongiuntiviti croniche (seborroiche, ulcerative, miste di varia etiologia).

Cheratiti (cheratite rosacea, cheratocongiuntivite secca, cheratocongiuntivite primaverile, etc.). Congiuntiviti allergiche causate dai patogeni sopra elencati.

**Controindicazioni**

Ipersensibilità a qualsiasi dei componenti del preparato.

**Precauzioni d'uso**

Forme severe da funghi patogeni possono richiedere un contemporaneo trattamento con opportuno preparato antimicotico per via generale.

**Interazioni con altri medicinali**

Non note.

**Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**

**Posologia**

2-3 gocce per occhio 2 o più volte al giorno, secondo consiglio del medico.

**Effetti collaterali**

Può verificarsi con l'instillazione del collirio sensazioni di lieve bruciore o di puntura.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Si invita il paziente a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto in questo foglietto illustrativo.

Ultima revisione del testo da parte del Ministero della Salute Novembre 2003.

### **Confezione**

Flacone contagocce da ml. 10.

Agenzia Italiana del Farmaco