

POLIJDURATO  
Collirio

**Composizione**

100 ml contengono: Sodio ioduro g 1; Potassio ioduro g 1; Rubidio ioduro g 1; Calcio cloruro g 0,253.

*Eccipienti:* Acido bórico; Borace; p.Idrossibenzoato di metile; p.Idrossibenzoato di propile; Acqua per preparazioni iniettabili.

**Categoria farmacoterapeutica**

Anticataratta.

**Titolare A.I.C.**

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 6/8, 56121 - Pisa

**Prodotto e controllato da**

FARMIGEA SpA, Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa

**Indicazioni**

Intorbidamenti corneali, del cristallino e del vitreo, nelle affezioni scrofolose e nella cataratta iniziale.

**Controindicazioni**

E' controindicato in pazienti che presentino ipersensibilizzazione a qualsiasi componente del prodotto. Ipertiroidismo. Tireotossicosi. Non deve essere usato in concomitanza a trattamenti con composti mercuriali sistemici o locali.

**Precauzioni d'uso**

Con gli ioduri si possono avere leggere reazioni, come salivazione, lacrimazione, corizza ed eruzioni cutanee che scompaiono col cessare della terapia.

Il prodotto, se accidentalmente ingerito o se impiegato per lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici.

In caso di gravidanza o allattamento il preparato non presenta controindicazioni note.

**Interazioni con altri medicinali**

Non sono note.

**Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**

**Posologia**

3-4 gocce nel sacco congiuntivale due volte al giorno, salvo diversa prescrizione medica, instillate nel sacco congiuntivale.

**Effetti collaterali**

Nessuno.

**Attenzione:** non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Si invita il paziente a comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto in questo foglietto illustrativo.

Ultima revisione da parte del Ministero della Salute Novembre 2003

**Confezione**

Flacone contagocce da ml 10.