

LACRINORM® “0,01%+0,2% gel oftalmico”
Tubo 10 g

Composizione

100 g di gel contengono: Benzalconio cloruro 0,01 g; Acido poliacrilico 0,2 g
Eccipienti: Sorbitolo; acqua per preparazioni iniettabili

Forma farmaceutica

Gel oftalmico, tubo da 10 g

Categoria farmacoterapeutica

Disinfettante per uso oftalmico. Lubrificante

Titolare A.I.C.

FARMIGEA S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 – Pisa

Concessionario esclusivo per la vendita: OFTAGEN Srl – Via G.B. Oliva 6, 56121 - Pisa

Prodotto e controllato da

FARMIGEA SpA Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa

Indicazioni terapeutiche

Disinfezione della mucosa oculare. Lubrificante, umettante dell'occhio con insufficienza lacrimale (Sindrome dell'occhio secco)

Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti.

Precauzioni di impiego

Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tale caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

Non utilizzare LACRINORM durante l'indossaggio delle lenti a contatto, ma tra un indossaggio e l'altro. In caso di applicazione attendere 15 minuti prima di indossare le lenti a contatto.

Interazioni

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti oculari

Avvertenze

Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. L'ingestione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Dose, modo e tempi di somministrazione

1 goccia nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì (l'ultima prima di coricarsi).

Durante l'applicazione tenere il tubetto perpendicolare e non obliquo, perché, solo così si ottiene una goccia regolare.
Non superare le dosi consigliate.

Effetti indesiderati

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Subito dopo l'applicazione si può verificare un lieve appannamento della vista che è dovuto alla densità del gel; tale appannamento tuttavia scompare molto rapidamente.

Comunicare al proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

Attenzione

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini

Ultima revisione del testo da parte dell'AIFA: Aprile 2009