

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

**VIAPRES 4 mg compresse rivestite con film**  
**VIAPRES 6 mg compresse rivestite con film**  
Lacidipina

### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo
- Se ha qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cosa è Viapres e a che cosa serve
2. Prima di prendere/usare Viapres
3. Come prendere/usare Viapres
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Viapres
6. Altre informazioni

### **1. Cos'è Viapres e a che cosa serve**

Viapres è usato per il trattamento della pressione alta del sangue (ipertensione). Appartiene ad una classe di medicinali chiamati "bloccanti dei canali del calcio". Viapres ha la proprietà di allargare (dilatare) i vasi sanguigni, facilitando il flusso sanguigno e abbassando la pressione.

### **2. Prima di prendere Viapres**

#### **Non prenda Viapres:**

- se è **allergico** (ipersensibile) al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Viapres;
- se lei è affetto da una malattia del cuore chiamata **stenosi aortica**. Questa malattia è un restringimento della valvola che permette al sangue di essere pompato fuori dal cuore;
- se lei pensa che una di queste condizioni la riguardi, non prenda Viapres prima di averne parlato con il suo medico.

#### **Faccia particolare attenzione con Viapres**

Prima del trattamento con Viapres il suo medico deve sapere:

- se lei ha **problemi di cuore**;
- se lei ha **malattie del fegato**;
- Viapres contiene lattosio: se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

#### **Assunzione di Viapres con altri medicinali**

#### **Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.**

Alcuni medicinali possono alterare l'attività di Viapres, o aumentarla provocando effetti collaterali. Viapres può anche alterare l'attività di altri medicinali. Tra cui:

- altri medicinali utilizzati per il trattamento della **pressione alta del sangue** come la furosemide, propranololo o captopril;
- cimetidina (per il trattamento di **ulcere allo stomaco**);

- ciclosporina (usata per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organi o per alcune malattie autoimmuni);
- l'uso concomitante di lacidipina e corticosteroidi o tetracosactide può diminuire l'effetto antiipertensivo.

**Parli con il medico o il farmacista** se sta prendendo uno di questi medicinali.

#### **Assunzione di Viapres con cibi e bevande**

Non beva succo di pompelmo mentre sta prendendo Viapres.

#### **Gravidanza e allattamento**

**Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.**

**Non ci sono informazioni** sulla sicurezza di impiego di Viapres in gravidanza. Se lei è **gravida** o **pensa di esserlo**, o se **sta pianificando una gravidanza non prenda Viapres** senza prima avere verificato con il suo medico. **Il suo medico** prenderà in considerazione rischi e benefici legati all'assunzione di Viapres per lei e per il suo bambino.

Il principio attivo e gli eccipienti di Viapres possono passare nel latte materno. **Se lei sta allattando, verifichi col suo medico** prima di iniziare la terapia con Viapres.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Viapres può causare vertigini. I pazienti dovrebbero essere allertati a non guidare o non usare macchinari se soggetti a vertigini o sintomi associati.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Viapres

Viapres contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere Viapres**

#### **Quanto prenderne**

**Prenda Viapres sempre seguendo esattamente le istruzioni del medico.** Se ha dubbi consulti il suo medico o farmacista. Verifichi con il suo medico o con il suo farmacista se non è sicuro.

**La dose usuale di partenza** di Viapres è di 2 mg una volta al giorno, la mattina.

Il suo medico può decidere se aumentare la dose a 4 o 6 mg, una volta al giorno la mattina dopo circa 3-4 settimane di terapia.

#### **Come prenderlo**

Deglutire la compressa con un po' di acqua.

È preferibile prendere la medicina ogni giorno alla stessa ora.

Può prendere Viapres con o senza cibo.

#### **Se dimentica di prendere Viapres**

**Se dimentica di prendere una dose**, prenda la successiva alla stessa ora. **Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.**

#### **Se prende più Viapres di quanto deve**

Se prende troppe compresse di Viapres è **molto probabile un abbassamento della pressione del sangue e un cambiamento del battito cardiaco che può aumentare o diminuire.**

**Si rivolga al medico o al farmacista per un consiglio.**

#### **Se interrompe il trattamento con Viapres**

Prenda Viapres per il tempo raccomandato dal suo medico. Non interrompa l'assunzione di Viapres senza il consiglio del medico. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Viapres, si rivolga al medico o al farmacista.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Viapres può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

##### Effetti indesiderati comuni

Possono riguardare **fino a 1 persona su 10**:

- battiti irregolari del cuore (palpitazioni);
- battiti più veloci del cuore (tachicardia);
- gonfiore causato dai fluidi;
- vertigini;
- urinare di frequente;
- cefalea;
- rash cutanei (incluso arrossamento della pelle e prurito);
- vampate;
- disturbi gastrici;
- nausea;
- stanchezza.

Effetti indesiderati comuni che possono essere riscontrati con l'analisi del sangue:

- aumento reversibile del livello di un enzima chiamato fosfatasi alcalina.

##### Effetti indesiderati non comuni

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 100**:

- peggioramento del dolore toracico (peggioramento di preesistente angina pectoris);
- pallore;
- abbassamento della pressione sanguigna;
- emorragie, gengive dolenti;
- sincope;
- ipotensione.

##### Effetti indesiderati rari

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 1.000**:

- gravi reazioni allergiche con gonfiore del viso, lingua o gola che possono causare difficoltà nella deglutizione o respirazione;
- eritema pruriginoso nella pelle.

##### Effetti indesiderati molto rari

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 10.000**:

- agitazione o tremore delle braccia e delle gambe;
- depressione.

##### Se avete uno di questi effetti indesiderati

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati **peggiora**, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, **informi il medico o il farmacista**.

#### 5. Come conservare Viapres

Tenere Viapres fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi Viapres dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

Conservare Viapres a temperatura non superiore ai 30°C.

Conservare nel contenitore originale per proteggere dalla luce.

Non estrarre la compressa dal blister fino a quando non la deve prendere.

Nel caso di assunzione di metà compressa da 4 mg, la rimanente metà deve essere riposta nel blister e reinserita nell'astuccio per proteggerla dalla luce ed essere assunta entro 48 ore.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Altre informazioni**

### **Cosa contiene Viapres**

Il principio attivo è Lacidipina. Viapres compresse è presente in diversi dosaggi.

Ogni compressa contiene:

4 mg di lacidipina

6 mg di lacidipina

Gli eccipienti sono:

Lattosio, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E 171), polietilenglicole (PEG) 400, polisorbato 80

### **Descrizione dell'aspetto di Viapres e contenuto della confezione**

Compresse rivestite con film.

Compresse rivestite con film, bianche, rotonde, con una linea di frattura su un lato.

14 e 28 compresse rivestite con film da 4 mg

14, 28 e 35 compresse rivestite con film da 6 mg

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

S.F. Group S.r.l. Via Tiburtina 1143 – 00156 Roma

### **Produttore**

Special Product's Line S.p.A. – Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 – 03012 Anagni (FR)

**Questo foglio illustrativo è stato approvato**