

VENUMREST "450 mg compresse"

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

VENUMREST 450 mg compresse Diosmina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è VENUMREST e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere VENUMREST
3. Come prendere VENUMREST
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare VENUMREST
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è VENUMREST e a cosa serve

VENUMREST contiene il principio attivo diosmina appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati bioflavonoidi, che agiscono rinforzando le pareti dei vasi sanguigni e migliorando la circolazione del sangue venoso.

VENUMREST è indicato:

- nel trattamento di una patologia caratterizzata da un difficoltoso ritorno del sangue al cuore (insufficienza venosa);
- per rafforzare i capillari fragili.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere VENUMREST

Non prenda VENUMREST

- se è allergico alla diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è in stato di gravidanza e se sta allattando al seno.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere VENUMREST.

Altri medicinali e VENUMREST

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di VENUMREST con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

VENUMREST "450 mg compresse"

Non usi questo medicinale se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

VENUMREST non influenza la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come prendere VENUMREST

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Assuma la compressa con una piccola quantità di acqua.

La dose raccomandata è di 1 compressa 2 volte al giorno, ad intervalli regolari.

Se prende più VENUMREST di quanto deve

In caso di sovradosaggio possono manifestarsi i seguenti sintomi: diarrea, nausea, dolore addominale, prurito e eruzione cutanea.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VENUMREST avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se dimentica di prendere VENUMREST

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di VENUMREST, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati:

Comune (possono interessare fino a 1 persona su 10):

Digestione difficile (dispepsia), vomito

Non comune (possono interessare fino a 1 persona su 100):

Colite

Raro (possono interessare fino a 1 persona su 1000):

Mal di stomaco, nausea, diarrea, vertigini, cefalea, malessere, eruzione cutanea, prurito, orticaria

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

Dolore addominale, gonfiore del viso, delle labbra, delle palpebre (edema), rapido gonfiore del viso, delle labbra, della bocca, della lingua o della gola che può portare a difficoltà nel respirare (edema di Quincke), diminuzione anomala delle piastrine (trombocitopenia).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare VENUMREST

VENUMREST "450 mg compresse"

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare ad una temperatura superiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VENUMREST

- Il principio attivo è diosmina. Ogni compressa contiene 450 mg di diosmina.
- Gli altri componenti sono: macrogol 4000, magnesio stearato, talco, silice colloidale anidra.

Descrizione dell'aspetto di VENUMREST e contenuto della confezione

Astuccio da 20, 30 o 60 compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

S.F. Group S.r.l. Via Tiburtina, 1143 – 00156 Roma, Italia

Produttore

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M S.P.A. - Via Grignano, 43 – 24041 Brembate (BG)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il