

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

**MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale**  
**MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale**  
**MUCOTREIS 20 mg/ml sciroppo bambini**  
**MUCOTREIS 50 mg/ml sciroppo adulti**

Carbocisteina

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è MUCOTREIS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOTREIS
3. Come prendere MUCOTREIS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUCOTREIS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è MUCOTREIS e a cosa serve**

MUCOTREIS contiene carbocisteina, un mucolitico, usato per facilitare l'eliminazione del muco in caso di malattie acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOTREIS**

##### **Non prenda MUCOTREIS**

- se è allergico alla carbocisteina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
  - se soffre o ha sofferto di una lesione dello stomaco o dell'intestino (ulcera gastroduodenale).
- Se il bambino da trattare ha un'età inferiore ai 2 anni (vedere il paragrafo "Bambini").

##### **Avvertenze e Precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MUCOTREIS.

Nei primi giorni di trattamento può verificarsi un aumento della secrezione di muco, che si riduce poi rapidamente.

##### **Bambini**

MUCOTREIS non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 2 anni perché può indurre ostruzione dei bronchi a causa della loro limitata capacità di eliminare il muco in eccesso (vedere il paragrafo "Non prenda MUCOTREIS").

### **Altri medicinali e MUCOTREIS**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando al seno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Usare MUCOTREIS solo in caso di effettiva necessità.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

MUCOTREIS contiene il saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

- MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale contiene 42.3 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per bustina. Questo equivale al 2,11 % dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto;

- MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale contiene 165.6 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per bustina. Questo equivale all'8,28 % dell'assunzione massima giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto;

- MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini contiene 3.3 mg di sodio per ml (componente principale del sale da cucina);

- MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti contiene 7.4 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per ml.

### **MUCOTREIS sciroppo contiene metil para-idrossibenzoato**

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

### **3. Come prendere MUCOTREIS**

**Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.**

MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale:

Adulti: la dose raccomandata è 1 bustina 3 o 4 volte al giorno.

Bambini di età superiore ai 2 anni: la dose raccomandata è 1 o mezza bustina 1 o 2 volte al giorno.

MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale:

Adulti: la dose raccomandata è una bustina due volte al giorno, alla mattina e alla sera.

**Durata del trattamento**

Per problemi acuti di respirazione 8-10 giorni. Per problemi cronici e ricadute da 10 giorni a 3 settimane, più volte all'anno.

**Modalità d'uso**

Sciolga il contenuto della bustina in mezzo bicchiere di acqua e mescoli con un cucchiaino.

MUCOTREIS 20 mg/ml sciroppo bambini:

Bambini di età compresa tra i due e i cinque anni: la dose raccomandata è 1 cucchiaino da caffè 1-2 volte al giorno.

Bambini di età superiore ai 5 anni: la dose raccomandata è 1 cucchiaino da caffè 2-3 volte al giorno a seconda dell'età.

MUCOTREIS 50 mg/ml sciroppo adulti:

Adulti: la dose raccomandata è 2-3 cucchiaini al giorno. Il medico può prescrivere una dose maggiore, a seconda delle sue condizioni di salute.

Durata del trattamento

- Per problemi acuti di respirazione 8 a 10 giorni;
- Per problemi cronici e ricadute da 10 giorni a 3 settimane, più volte all'anno.

Non superi le dosi raccomandate.

### **Se prende più MUCOTREIS di quanto deve**

Non sono noti casi di sovradosaggio. Se assume una dose eccessiva di questo medicinale può manifestare problemi allo stomaco e all'intestino.

In caso di sovradosaggio sospendere il medicinale.

### **Se dimentica di prendere MUCOTREIS**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4 Possibili EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono manifestarsi con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) i seguenti effetti indesiderati:

ostruzione dei bronchi, dolori allo stomaco (gastralgie), nausea, diarrea, vertigini.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare MUCOTREIS**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare questo medicinale a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale**

- Il principio attivo è carbocisteina. Ogni bustina contiene 0,3 g di carbocisteina.

Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, acido citrico, silice colloidale, aroma albicocca, saccarosio, saccarina sodica.

#### **Cosa contiene MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale**

- Il principio attivo è carbocisteina. Ogni bustina contiene 1,5 g di carbocisteina.

- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, acido citrico, silice colloidale, aroma albicocca, saccarosio, saccarina sodica.

#### **Cosa contiene MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini**

- Il principio attivo è carbocisteina. 1 ml di sciroppo contiene 20 mg di carbocisteina.

- Gli altri componenti sono: sodio idrossido, metil para-idrossibenzoato, sodio cloruro, aroma caramello, saccarosio, arancia dolce essenza, acqua depurata.

#### **Cosa contiene MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti**

- Il principio attivo è carbocisteina. 1 ml di sciroppo contiene 50 mg di carbocisteina.

- Gli altri componenti sono: sodio idrossido, metil para-idrossibenzoato, sodio cloruro, aroma caramello, saccarosio, arancia dolce essenza, acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di MUCOTREIS e contenuto della confezione**

MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale è disponibile in confezioni da 30 bustine.

MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale è disponibile in confezioni da 20 bustine.

MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini e MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti sono disponibili in confezione da 1 flacone da 150 ml.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

ITC FARMA s.r.l., via Pier Luigi Nervi 164, 04100 Latina (LT), Italia

**Produttore**

ITC FARMA s.r.l., via Pontina 5 Km 29, 00071 Pomezia (RM), Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco