

DERMIRIT

ATC D07AA02

idrocortisone acetato 0,5%

crema tubo g 20 - uso esterno

Prima dell'uso leggere con attenzione tutte le informazioni contenute nel foglio illustrativo.

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

DERMIRIT (idrocortisone acetato)

COMPOSIZIONE

100 g di crema contengono:

- principio attivo: idrocortisone acetato mg 500
 - altri componenti: palmito stearato di etilenglicole e polietilenglicole; gliceridi poliossietilenati glicosilati;
- olio di vaselina, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua depurata.

COME SI PRESENTA

DERMIRIT si presenta in forma di crema. Il contenuto del tubo è di g 20.

CHE COSA E'

DERMIRIT crema è un corticosteroide non associato.

NOMI E INDIRIZZI

Titolare A.I.C.: MORGAN srl - Via Divisione Folgore, 46 - 36100 Vicenza

Prodotto e controllato da: Doppel Farmaceutici S.r.l. – Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore PC

PERCHE' SI USA

DERMIRIT si usa per il trattamento sintomatico di prurito, eczemi, punture di insetti, eritemi e ustioni circoscritte.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

DERMIRIT non deve essere usato:

- nel caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico o altri corticosteroidi
- nel caso di affezioni virali, batteriche e fungine
- nel prurito vulvare se associate a perdite vaginali
- per trattamenti protratti

Cosa fare durante la gravidanza, l'allattamento e nei bambini

Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va usato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni DERMIRIT deve essere usato solo dopo aver consultato il medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

Nei lattanti e nei bambini il pannolino può fungere da bendaggio oclusivo, aumentando l'assorbimento del prodotto. L'impiego, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione o di irritazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire una idonea terapia.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL FARMACO

Non sono note incompatibilità ed interazioni con altri farmaci utilizzati per via topica.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

DERMIRIT è solo per uso esterno. Non applicare DERMIRIT su superfici estese. Nel caso che vengano trattate estese superfici cutanee, specie con bendaggio occlusivo, si tenga presente la possibilità dell'insorgenza di effetti sistemici da assorbimento dei corticosteroidi.

La crema non trova impiego oftalmologico, né va applicata nelle zone periorbitali. Non usare per trattamenti protratti. Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili o se le condizioni peggiorano, interrompere le applicazioni e consultare il medico. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di irritazione o sensibilizzazione.

In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire una idonea terapia.

COME USARE IL FARMACO

Quanto e come

Spalmare in minima quantità la crema sulla parte malata e frizionare leggermente, due volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico e usare solo per brevi periodi di trattamento. Nel caso in cui si intenda ricorrere al bendaggio occlusivo, si deterga accuratamente la parte da trattare prima di ogni applicazione per non favorire l'instaurarsi di infezioni.

Istruzioni per l'uso: perforare la membrana del tubetto con la spina della capsula.

COSA FARE SE AVETE UTILIZZATO UNA DOSE ECCESSIVA DI FARMACO

Con l'uso di DERMIRIT crema è raro che possano verificarsi situazioni di sovra dosaggio. Comunque, in caso di tale evenienza, chiedete consigli al vostro medico o farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Qualora il prodotto, contrariamente a quanto prescritto, venga utilizzato su superfici estese e per lunghi periodi di tempo ed a dosi elevate, possono manifestarsi segni di intolleranza locale o segni o sintomi di assorbimento sistemico (senso di bruciore, irritazione, secchezza della cute, follicoli, eruzioni acneiche, ipertricosi, ipopigmentazione, atrofia cutanea); in tali casi occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

- Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati
- Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista
- E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo
- Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati, disponibile in farmacia (modello B)

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Precauzioni per la conservazione: proteggere dal calore.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni del medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Data dell'ultima revisione da parte del Ministero della Salute: luglio 2007.

MORGAN srl - Via Divisione Folgore, 46 - 36100 Vicenza