

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### QUIMOX 5 mg/ml collirio, soluzione

Moxifloxacina (come cloridrato)

Legga attentamente questo foglio prima di utilizzare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è QUIMOX e a cosa serve.
2. Cosa deve sapere prima di usare QUIMOX.
3. Come usare QUIMOX.
4. Possibili effetti indesiderati.
5. Come conservare QUIMOX.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni.

#### **1. Che cos'è QUIMOX e a cosa serve**

QUIMOX collirio è utilizzato per il trattamento di infezioni dell'occhio (congiuntivite) quando causate da batteri. Il principio attivo è la moxifloxacina, un antinfettivo oftalmologico.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare QUIMOX**

Non usi QUIMOX

- Se è allergico (ipersensibile) alla Moxifloxacina, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6.1).

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista:

- **Se ha una reazione allergica a QUIMOX.** Reazioni allergiche si manifestano non comunemente e reazioni gravi si manifestano raramente. In caso di reazioni allergiche (ipersensibilità) o effetti indesiderati di qualsiasi tipo consultare la sezione 4.
- **Se indossa lenti a contatto** – smetta di indossarle in caso di segni o sintomi di infezione oculare. Al loro posto indossi gli occhiali. Non ricominci ad indossare le lenti fino a quando i segni e i sintomi dell'infezione non saranno scomparsi e fino a quando non smetterà di usare il medicinale.

Si sono verificati gonfiore e rottura dei tendini in persone trattate con fluorochinoloni per via orale o intravenosa, in particolare in pazienti anziani ed in pazienti trattati allo stesso tempo con corticosteroidi.

Interrompa l'uso di QUIMOX se i tendini le fanno male o si gonfiano (tendinite).

Come con qualsiasi antibiotico, l'uso di QUIMOX per un periodo prolungato può portare ad altre infezioni.

### **Altri medicinali e QUIMOX**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Chieda consiglio al medico prima di usare QUIMOX collirio.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Potrebbe avere un offuscamento della vista per un breve periodo subito dopo l'uso di QUIMOX. Non guidi e non usi macchinari fino a quando questa sensazione non è cessata.

### **3. Come usare QUIMOX**

Usi sempre QUIMOX seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi deve consulti il medico o il farmacista.

#### **La dose raccomandata è:**

Adulti, compresi gli anziani, e i bambini: 1 goccia nell'occhio/i interessato/i, 3 volte al giorno (al mattino, al pomeriggio e alla sera).

QUIMOX può essere utilizzato nei bambini, in pazienti oltre i 65 anni di età e in pazienti con problemi renali ed epatici. Ci sono solo informazioni molto limitate sull'uso del medicinale nei neonati e il suo utilizzo nei neonati non è raccomandato.

Usi il medicinale in entrambi gli occhi solo su prescrizione del suo medico. QUIMOX può essere usato **solamente** come collirio.

L'infezione normalmente migliora entro 5 giorni. Se non osserva alcun miglioramento, si rivolga al suo medico.

Deve continuare a prendere le gocce per altri 2-3 giorni o fino a quando prescritto dal medico.

*Flacone multidose*



1. Prenda il flacone di QUIMOX e si posizioni di fronte ad uno specchio.

2. **Si lavi le mani.**
3. Sviti il tappo.
4. Dopo aver tolto il tappo, se l'anello di sicurezza si è allentato lo rimuova prima di usare il prodotto.
5. Prenda il flacone, lo capovolga, e lo tenga tra il pollice e le altre dita.
6. Pieghi indietro la testa. Abbassi la palpebra inferiore con un dito pulito, così da formare una "tasca" tra la palpebra e l'occhio. La goccia andrà inserita in quel punto (figura 1).
7. Tenga la punta del flacone vicino all'occhio. Può essere utile guardarsi allo specchio.
8. Non tocchi l'occhio o la palpebra, le aree circostanti o altre superfici con la punta del contagocce. Potrebbe infettare il collirio.
9. Prema delicatamente sul fondo del flacone per far uscire una goccia di QUIMOX per volta (figura 2).
10. Dopo l'uso di QUIMOX, prema con un dito l'angolo dell'occhio, vicino al naso per 2-3 minuti (figura 3). Questo impedisce che il medicinale si distribuisca nel resto del corpo, cosa importante nei bambini piccoli.
11. Se deve mettere il collirio in entrambi gli occhi, **si lavi le mani prima di ripetere i passaggi per l'altro occhio.** Questo aiuterà a impedire che l'infezione si diffonda da un occhio all'altro.
12. Chiuda saldamente il tappo del flacone immediatamente dopo l'uso.

#### Contenitori monodose

Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.

**Lavarsi accuratamente le mani** prima di aprire il contenitore.

1. Staccare il contenitore monodose dalla strip (fig. 1).
2. Afferrare il contenitore monodose dalla base e scuotere verso il basso (fig. 2).
3. Aprire ruotando la parte superiore e tirare (fig. 3).
4. Prosegua come per il multidose dal punto 5 al punto 11.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Se una goccia non entra nell'occhio, riprovi.

Se usa più QUIMOX di quanto deve, lavi subito l'occhio con acqua tiepida. Non usi più il collirio fino all'ora della dose successiva.

Se ingerisce accidentalmente QUIMOX chiedi consiglio al medico o al farmacista.

Se dimentica di usare il medicinale, prosegua il trattamento con la dose successiva come programmato. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se usa contemporaneamente anche un altro collirio, lasci passare almeno 5 minuti tra l'instillazione di QUIMOX e dell'altro collirio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, QUIMOX può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Può generalmente continuare ad assumere le gocce, tranne nel caso in cui gli effetti indesiderati siano gravi o se ha una reazione allergica grave.

Se ha una reazione allergica grave o se si dovesse verificare uno dei seguenti effetti, interrompa immediatamente l'assunzione di QUIMOX e si rivolga immediatamente al medico: gonfiore alle mani, ai piedi, alle caviglie, al viso, alle labbra, alla bocca o alla gola tali da causare difficoltà di deglutizione o di respirazione, eruzione cutanea o orticaria, grandi bolle piene di liquido, ferite e ulcerazione.

##### **Effetti indesiderati comuni**

*(possono interessare fino a 1 persona su 10)*

**Effetti sull'occhio:** dolore oculare, irritazione oculare.

##### **Effetti indesiderati non comuni**

*(possono interessare fino a 1 persona su 100)*

**Effetti sull'occhio:** secchezza oculare, prurito oculare, arrossamento dell'occhio, infiammazione o cicatrizzazione della superficie oculare, rottura dei vasi sanguigni oculari, sensazione oculare anomala, anomalia palpebrale, prurito, arrossamento o gonfiore.

**Effetti indesiderati generali:** mal di testa, gusto cattivo.

##### **Effetti indesiderati rari**

*(possono interessare fino a 1 persona su 1000)*

**Effetti sull'occhio:** patologia della cornea, visione offuscata o ridotta, infiammazione o infezione della congiuntiva, affaticamento dell'occhio, gonfiore dell'occhio.

**Effetti indesiderati generali:** vomito, fastidio al naso, sensazione di un nodo alla gola, riduzione del ferro nel sangue, esami ematici del fegato anormali, sensazione cutanea anomala, dolore, irritazione alla gola.

##### **Non noti**

*(la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)*

**Effetti sull'occhio:** infezione oculare, opacizzazione della superficie oculare, gonfiore corneale, depositi sulla superficie oculare, aumento della pressione oculare, graffio sulla superficie oculare, allergia oculare, secrezione oculare, aumento della lacrimazione, sensibilità alla luce.

**Effetti indesiderati generali:** respiro corto, ritmo cardiaco irregolare, capogiro, aumento dei sintomi dell'allergia, prurito, eruzione cutanea, arrossamento cutaneo, nausea e orticaria.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare QUIMOX**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi il collirio dopo la data di scadenza indicata sul flacone e sulla scatola dopo 'Scad'. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

### *Flacone multidose*

Sospenda l'uso del flacone 4 settimane dopo la prima apertura. Questo per evitare infezioni.

### *Contenitori monodose*

Il medicinale monodose deve essere utilizzato immediatamente dopo l'apertura; il medicinale residuo deve essere eliminato.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

Cosa contiene QUIMOX

Il principio attivo è la moxifloxacina.

Un ml di collirio contiene 5 mg di moxifloxacina (come moxifloxacina cloridrato, 5,45 mg).

Una goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina.

Gli eccipienti sono: sodio cloruro, acido bórico, acqua depurata.

Piccole quantità di sodio idrossido possono essere aggiunte per mantenere i normali livelli di acidità (pH).

### **Descrizione dell'aspetto di QUIMOX e contenuto della confezione**

Il medicinale è un liquido (una soluzione trasparente, di colore giallo-verdastro).

Flacone multidose con contagocce in polietilene a bassa densità e tappo di sicurezza sterile a prova di manomissione in polipropilene. Confezione da 1 flacone da 5 ml.

Contenitori monodose in polietilene a bassa densità. Confezione da 30 contenitori monodose da 0,25 ml, ripartiti in 3 strips da 10 contenitori monodose l'una, ciascuna strip è confezionata in una busta di materiale poliaccoppiato (PET/ALU/PE).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore**

ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Via F.lli Bandiera 26 - 80026 Casoria (NA)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

|  
|

Agenzia Italiana del Farmaco