

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

YASMIN® 0,03 mg / 3 mg compresse rivestite con film
Etinilestradiolo / Drospirenone

Legga attentamente questo foglio illustrativo prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Yasmin® e a che cosa serve
2. Prima di prendere Yasmin®
 - Quando non deve usare Yasmin®
 - Quando deve fare particolare attenzione con Yasmin®
 - Yasmin® e la trombosi venosa e arteriosa
 - Yasmin® e il cancro
 - Sanguinamento intermestruale
 - Cosa fare se non compare la mestruazione nella settimana di sospensione
 - Assunzione di Yasmin® con altri medicinali
 - Assunzione di Yasmin® con cibi e bevande
 - Analisi di laboratorio
 - Gravidanza
 - Allattamento
 - Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
 - Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Yasmin®
3. Come prendere Yasmin®
 - Quando può iniziare il primo blister?
 - Se prende più Yasmin® di quanto deve
 - Se dimentica di prendere Yasmin®

1. CHE COS'È YASMIN® E A CHE COSA SERVE

- Yasmin® è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.
- Ogni compressa contiene una piccola quantità di due diversi ormoni femminili, il drospirenone e l'etinilestradiolo.
- Le pillole contraccettive che contengono due ormoni sono chiamate pillole "combinata".

2. PRIMA DI PRENDERE YASMIN®

Note generali

Prima di prendere Yasmin®, il medico le farà alcune domande sulla sua storia personale di salute e quella dei suoi familiari. Il medico inoltre le misurerà la pressione e, in base alla sua situazione personale, potrà anche effettuare altri esami. In questo foglio vengono descritte varie situazioni nelle quali deve sospendere Yasmin® o nelle quali la sicurezza di Yasmin® può risultare diminuita.

In tali situazioni è necessario astenersi da rapporti sessuali oppure adottare misure contraccettive aggiuntive non ormonali, come il profilattico o un altro metodo di barriera. Non usi il metodo del ritmo o della temperatura basale. Infatti tali metodi possono essere inaffidabili, in quanto Yasmin® altera le variazioni mensili della temperatura corporea e del muco cervicale.

Yasmin®, come tutti i contraccettivi ormonali, non offre alcuna protezione nei confronti dell'infezione da HIV (AIDS) o di altre malattie a trasmissione sessuale.

Quando non deve usare Yasmin®

Non prenda Yasmin®

- Se ha (o ha avuto) un coagulo di sangue in un vaso sanguigno della gamba (trombosi), del polmone (embolia polmonare) o di altri organi;
- se ha (o ha avuto) un attacco cardiaco o un ictus;
- se ha (o ha avuto) una malattia che può rappresentare un segno di un futuro attacco cardiaco (per esempio angina pectoris, che causa un forte dolore al petto) o di un ictus (per esempio un ictus minore senza conseguenze residue);
- se ha una malattia che può aumentare il rischio di un coagulo nelle arterie. Questo si verifica nelle seguenti condizioni:

diabete con danno vascolare

valori molto elevati di pressione arteriosa

- valori molto elevati di grassi nel sangue (colesterolo o trigliceridi)

- se ha un disturbo della coagulazione (per esempio, deficit di proteina C);
- se ha (o ha avuto) una certa forma di emicrania (con i cosiddetti sintomi neurologici focali);
- se ha (o ha avuto) un'infiammazione del pancreas (pancreatite);
- se ha (o ha avuto) una malattia del fegato e la funzione del fegato è ancora anormale;
- se i suoi reni non funzionano bene (insufficienza renale);
- se ha (o ha avuto) un tumore del fegato;
- se ha (o ha avuto) o si sospetta che abbia un cancro della mammella o degli organi genitali;
- se ha sanguinamenti vaginali non spiegabili;
- se è allergica all'etinilestradiolo o al drospirenone o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Yasmin®. Questa condizione può causare prurito, eruzioni cutanee o gonfiore.

Quando deve fare particolare attenzione con Yasmin®

In alcune situazioni deve fare particolare attenzione mentre usa Yasmin® o qualsiasi altra pillola combinata, ed è possibile che il medico debba visitarla regolarmente. Se una qualsiasi delle seguenti condizioni la riguarda, informi il medico prima di iniziare ad usare Yasmin®. Consulti il medico anche nel caso in cui una qualsiasi di tali condizioni la riguardi o si sviluppi o peggiori durante l'uso di Yasmin®:

- se una parente stretto ha o ha avuto un cancro della mammella;
- se ha una malattia del fegato o della colecisti
- se ha il diabete
- se soffre di depressione
- se ha il morbo di Crohn o una malattia infiammatoria dell'intestino (colite ulcerosa)
- se ha una malattia del sangue chiamata sindrome emolitico-uremica (SEU), che provoca danni a carico dei reni
- se ha una malattia del sangue chiamata anemia falciforme;
- se soffre di epilessia (vedere "Assunzione di Yasmin® con altri medicinali")
- se ha una malattia del sistema immunitario chiamata lupus eritematoso sistemico (LES)
- se ha una malattia che è comparsa per la prima volta durante la gravidanza o un precedente uso di steroidi sessuali (per esempio, perdita dell'udito, una malattia del sangue chiamata porfiria, eruzione cutanea con vescicole durante la gravidanza (herpes gravidico), una malattia dei nervi che causa movimenti improvvisi del corpo (Corea di Sydenham);
- se ha o ha avuto cloasma (scolorimento della pelle, specialmente del viso o del collo, noto come "maschera gravidica"). In tal caso eviti l'esposizione diretta alla luce solare o ai raggi ultravioletti;
- se soffre di angioedema ereditario, i medicinali contenenti estrogeni possono provocare o peggiorare i sintomi. Se accusa sintomi di angioedema, come gonfiore del viso, della lingua e/o della gola e/o difficoltà a deglutire o orticaria con difficoltà di respirazione, si rivolga immediatamente al medico.

Yasmin® e la trombosi venosa e arteriosa

L'uso di qualsiasi pillola combinata, inclusa Yasmin®, comporta per la donna un aumento del rischio di sviluppare un **coagulo venoso (trombosi venosa)** rispetto alle donne che non prendono la pillola contraccettiva.

Il rischio di **coaguli venosi** nelle utilizzatrici di pillole combinate aumenta:

- con l'aumento dell'età;
- se è sovrappeso;
- se un parente stretto ha avuto in giovane età un coagulo di sangue nella gamba, nel polmone (embolia polmonare), o in un altro organo;
- se deve sottoporsi ad intervento chirurgico, ha avuto un grave incidente o se deve restare immobilizzata per un lungo periodo. È importante che informi il medico che sta prendendo Yasmin® poiché può essere necessario che lo sospenda. Il medico le dirà quando poter riprendere. Generalmente questo sarà possibile circa 2 settimane dopo che avrà ripreso la normale deambulazione.

La probabilità che si manifesti una trombosi è aumentata dall'uso della pillola.

- Su 100.000 donne che non prendono la pillola e non sono in gravidanza, circa 5-10 possono manifestare trombosi nell'arco di un anno.
- Su 100.000 donne che prendono una pillola come Yasmin®, tra 30 e 40 possono manifestare trombosi venosa nell'arco di un anno: il numero esatto non è conosciuto.
- Su 100.000 donne in gravidanza, circa 60 possono manifestare trombosi nell'arco di un anno.

Un coagulo di sangue nelle vene può raggiungere i polmoni e bloccare i vasi sanguigni (embolia polmonare). La formazione di coaguli di sangue nelle vene può essere fatale nell'1-2% dei casi.

Il livello di rischio può variare in funzione del tipo di pillola. Prenda in esame con il medico le opzioni disponibili.

L'uso delle pillole combinate è stato messo in relazione con un aumento del rischio di un **coagulo arterioso (trombosi arteriosa)**, per esempio nei vasi del cuore (attacco cardiaco) o del cervello (ictus).

Il rischio di un **coagulo arterioso** nelle utilizzatrici di pillole combinate aumenta:

- **se fuma. E' fortemente consigliato di non fumare durante l'uso di Yasmin®, soprattutto se si sono superati i 35 anni d'età;**
- se ha un contenuto di grassi nel sangue aumentato (colesterolo o trigliceridi);
- se è in sovrappeso;
- se uno dei suoi parenti stretti ha avuto un attacco cardiaco o un ictus in giovane età
- se ha la pressione alta;
- se soffre di emicrania;
- se ha problemi cardiaci (disturbi valvolari, un disturbo del ritmo cardiaco).

Sospenda l'assunzione di Yasmin® e consulti immediatamente il medico se nota un qualsiasi possibile segno di un coagulo, come:

- forte dolore e/o gonfiore a una gamba;
- improvviso e forte dolore al petto, che può irradiarsi braccio sinistro;
- "mancanza d'aria" improvvisa;
- tosse improvvisa, senza una causa apparente;
- cefalea insolita, grave o prolungata o peggioramento dell'emigrania;
- perdita parziale o totale della vista o visione doppia;
- difficoltà a parlare o incapacità a parlare;
- capogiro o svenimento;
- debolezza, sensazione insolita, o intorpidimento in qualsiasi parte del corpo.

Yasmin® e il cancro

Il cancro della mammella si osserva con una frequenza leggermente superiore nelle donne che usano pillole combinate, ma non è noto se questo sia dovuto al trattamento. Per esempio, è possibile che nelle donne che usano la pillola venga diagnosticato un maggior numero di tumori, perché esse si sottopongono a più frequenti controlli medici. Il verificarsi del cancro della mammella diminuisce gradualmente dopo l'interruzione della pillola combinata. È importante che lei si controlli regolarmente il seno e contatti il medico se sente qualsiasi nodulo.

Nelle donne che usano la pillola sono stati osservati in rari casi tumori epatici benigni, e ancora più raramente, tumori epatici maligni. Contatti il medico se avverte un dolore addominale insolitamente intenso.

Sanguinamento intermestruale

Durante i primi mesi di assunzione di Yasmin®, si possono verificare sanguinamenti inattesi (sanguinamenti al di fuori della settimana di sospensione). Se questi sanguinamenti si manifestano per più di alcuni mesi, o iniziano dopo qualche mese, il medico deve verificare che cosa non funziona.

Cosa fare se non compare la mestruazione durante la settimana di sospensione

Se ha preso tutte le compresse correttamente, non ha avuto vomito o grave diarrea e non ha preso altri medicinali, è altamente improbabile che sia incinta. Se le mestruazioni non compaiono per due volte consecutive, può essere incinta. Contatti immediatamente il medico. Non cominci il blister successivo finché non è sicura di non essere incinta.

Assunzione di Yasmin® con altri medicinali



Alcuni medicinali possono ridurre l'efficacia di Yasmin® nel prevenire la gravidanza o possono causare sanguinamenti inattesi.

Questi includono:

- medicinali per il trattamento di:
 - epilessia (ad es. primidone, fenitoina, barbiturici, carbamazepina, oxcarbazepina);
 - tubercolosi (ad es. rifampicina);
 - infezione da HIV (ritonavir, nevirapina) o altre infezioni (antibiotici come la griseofulvina, la penicillina, le tetracicline);
 - pressione alta nelle arterie dei polmoni (bosentan);
- L'Erba di S. Giovanni, rimedio erboristico.

Yasmin® può influenzare l'effetto di altri medicinali, per esempio:

- i medicinali contenenti ciclosporina
- l'antiepilettico lamotrigina (questo può portare ad un aumento della frequenza delle crisi epilettiche).

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Assunzione di Yasmin® con cibi e bevande

Yasmin® può essere assunto con o senza cibo, se necessario con un po' d'acqua.

Analisi di laboratorio

Se deve fare un esame del sangue, informi il medico o il personale del laboratorio che sta prendendo la pillola, poiché i contraccettivi ormonali possono influenzare i risultati di alcune analisi.

Gravidanza

Se è incinta non prenda Yasmin®. Se rimane incinta durante l'assunzione di Yasmin®, lo sospenda immediatamente e contatti il medico. Se desidera una gravidanza, può smettere di prendere Yasmin® in qualsiasi momento (vedere anche "Se desidera smettere di prendere Yasmin®").

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Allattamento

L'uso di Yasmin® è generalmente sconsigliato durante l'allattamento. Se desidera prendere la pillola durante l'allattamento, deve rivolgersi al medico.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non ci sono elementi per ritenere che Yasmin® influenzi la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

Documento reso disponibile da AIFA il 29/04/2021

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Yasmin®

Yasmin® contiene lattosio.

Se non tollera alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere Yasmin®.

3. COME PRENDERE YASMIN®

Prenda una compressa di Yasmin® ogni giorno, se necessario con un po' d'acqua. Può prendere le compresse con o senza cibo, ma deve prenderle circa alla stessa ora ogni giorno.

Il blister contiene 21 compresse. Vicino ad ogni compressa è stampato il giorno della settimana in cui deve essere presa. Se, per esempio, comincia di mercoledì, prenda la compressa vicino alla scritta MER. Segua la direzione delle frecce sul blister fino all'assunzione di tutte le 21 compresse.

Quindi non prenda compresse per 7 giorni. Durante questi 7 giorni (cosiddetta settimana di sospensione) deve comparire la mestruazione. Ciò viene chiamato "sanguinamento da sospensione" e generalmente inizia il secondo o il terzo giorno della settimana di sospensione.

Inizi un nuovo blister l'ottavo giorno dopo l'ultima compressa di Yasmin® (cioè dopo i 7 giorni di pausa), indipendentemente dalla cessazione o meno della mestruazione. Questo vuol dire che deve iniziare ogni nuovo blister di Yasmin® nello stesso giorno della settimana e anche le mestruazioni avranno inizio ogni mese nello stesso giorno.

Prendendo Yasmin® come indicato sopra, è protetta dalla gravidanza anche nei 7 giorni in cui non prende le compresse.

Quando può iniziare il primo blister?

- **Se non ha usato un contraccettivo ormonale nel mese precedente.**

Inizi a prendere Yasmin® il primo giorno del ciclo (cioè il primo giorno della mestruazione). Se inizia il primo giorno della mestruazione l'effetto contraccettivo è immediato. Può anche iniziare l'assunzione di Yasmin® tra il 2° e il 5° giorno del ciclo, ma in questo caso deve adottare misure contraccettive aggiuntive (ad esempio il preservativo) per i primi 7 giorni.

- **Passaggio da un contraccettivo ormonale combinato, da un anello vaginale contraccettivo combinato o da un cerotto.**

Inizi a prendere Yasmin® preferibilmente il giorno dopo l'ultima compressa attiva (l'ultima compressa contenente i principi attivi) della precedente pillola, o al più tardi il giorno dopo il termine dell'intervallo libero da pillola (o dopo l'ultima compressa inattiva della precedente pillola). Quando passa da un anello vaginale contraccettivo combinato o da un cerotto, segua i consigli del medico.

- **Passaggio da un metodo a base di solo progestinico (pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto o sistema intrauterino (IUS) a rilascio di progestinico)**

Può passare in qualsiasi giorno dalla pillola a base di solo progestinico (da un impianto o dallo IUS il giorno della sua rimozione, da un iniettabile quando deve fare l'iniezione successiva), ma in tutti questi casi adotti misure contraccettive aggiuntive (ad esempio il preservativo) per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse.

- **Dopo un aborto**
Segua i consigli del medico

- **Dopo un parto**

Può iniziare l'assunzione di Yasmin® tra il 21° e il 28° giorno dopo il parto. Se inizia più tardi del 28° giorno, usi un cosiddetto metodo di barriera (ad esempio il preservativo) durante i primi 7 giorni di assunzione di Yasmin®. Se, dopo il parto, ha avuto rapporti prima di iniziare (o ricominciare) l'assunzione di Yasmin®, si accerti di non essere incinta oppure aspetti la mestruazione.

- **Se allatta e vuole iniziare (o ricominciare) l'assunzione di Yasmin®**

Legga la sezione "Allattamento".

Chieda consiglio al medico se non è sicura su quando iniziare.

Se prende più Yasmin® di quanto deve

Non ci sono segnalazioni di effetti nocivi gravi in seguito all'assunzione di troppe compresse di Yasmin®. Se prende parecchie compresse in una volta può avere nausea o

vomito. Le ragazze giovani possono avere sanguinamento vaginale.

Se ha preso troppe compresse di Yasmin®, o scopre che qualche compressa è stata presa da un bambino, si rivolga immediatamente al medico o al farmacista.

Se dimentica di prendere Yasmin®

- Se il ritardo nell'assunzione di una compressa è inferiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva non è ridotta. Prenda la compressa appena se ne ricorda e quindi prenda le compresse successive come previsto.
- Se il ritardo nell'assunzione di una compressa è superiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva può essere ridotta. Quanto maggiore è il numero di compresse dimenticate, tanto maggiore è il rischio di rimanere incinta.

Il rischio di una protezione contraccettiva incompleta è massimo se dimentica una compressa all'inizio o alla fine del blister. Quindi deve seguire le indicazioni che seguono (vedere anche il diagramma riportato di seguito):

- **Più di 1 compressa dimenticata in questa confezione**


Si rivolga al medico.

- **Una compressa dimenticata nella prima settimana**

Prenda la compressa dimenticata appena se ne ricorda, anche se questo significa prendere due compresse contemporaneamente. Quindi continui a prendere le compresse alla solita ora e adotti misure contraccettive aggiuntive per i 7 giorni successivi, ad esempio il preservativo. Se nella settimana precedente la dimenticanza ha avuto rapporti sessuali, può essere incinta. In questo caso si rivolga al medico.

- **Una compressa dimenticata nella seconda settimana**

Prenda la compressa dimenticata appena se ne ricorda, anche se questo significa prendere due compresse contemporaneamente. Quindi continui a prendere le compresse alla solita ora. La sicurezza contraccettiva della pillola è mantenuta e non è quindi necessario adottare



precauzioni aggiuntive.

- **Una compressa dimenticata nella terza settimana**

Può scegliere fra due possibilità:

1. può prendere la compressa dimenticata appena se ne ricorda, anche se questo significa prendere due compresse contemporaneamente. Continui a prendere le compresse alla solita ora. Salti l'intervallo libero da pillola e inizi immediatamente il blister successivo. Molto probabilmente non si manifesterà la mestruazione fino al termine del secondo blister o potrà anche avere perdite di sangue scarse o di tipo mestruale nel corso della seconda settimana.
2. può anche interrompere l'assunzione delle compresse del ciclo corrente e passare direttamente alla pausa di 7 giorni (contando anche il giorno della compressa dimenticata). Se desidera iniziare il blister successivo nel suo giorno abituale, osservi un intervallo di durata inferiore ai 7 giorni.

Se segue una di queste due raccomandazioni, rimarrà protetta da una gravidanza.

- Se ha dimenticato una qualsiasi delle compresse del blister e non compare la mestruazione nel corso del primo intervallo libero da pillola, può essere incinta. Si rivolga al medico prima di iniziare un nuovo blister.

Cosa fare in caso di vomito o grave diarrea

Se vomita entro 3-4 ore dopo aver preso una compressa o ha grave diarrea, è possibile che i principi attivi della pillola non vengano assorbiti completamente dal suo organismo. La

situazione è paragonabile a quella che si verifica quando dimentica di prendere una compressa. Dopo vomito o diarrea prenda un'altra compressa da una confezione di riserva il più presto possibile.

Se possibile la prenda *entro 12 ore* dall'ora consueta di assunzione delle compresse. Se non è possibile, o se sono già trascorse 12 ore, deve seguire le indicazioni riportate nella sezione "Se dimentica di prendere Yasmin®".

Come ritardare la mestruazione: cosa deve sapere

Anche se non è raccomandato, può ritardare la mestruazione proseguendo con una nuovo blister di Yasmin® invece di osservare l'intervallo di 7 giorni. Durante l'uso di questo secondo blister, potrà avere perdite di sangue scarse o di tipo mestruale. Continui con il blister successivo dopo il consueto intervallo di 7 giorni.

Può chiedere consiglio al medico, prima di decidere di ritardare la mestruazione.

Come modificare il giorno d'inizio delle mestruazioni: cosa deve sapere

Se prende le compresse secondo le istruzioni, le mestruazioni inizieranno nella settimana di sospensione. Se deve modificarne il giorno di inizio, abbrevi la normale pausa fra due confezioni (*ma non la prolunghi mai – 7 giorni è il massimo!*). Per esempio, se la pausa normalmente inizia di venerdì e desidera spostarla al martedì (3 giorni prima), inizi il blister successivo con 3 giorni di anticipo. Se rende molto breve la pausa fra due cicli (ad es. 3 giorni o meno), è possibile che non abbia sanguinamenti durante questo intervallo. Successivamente, potrà avere perdite di sangue scarse o di tipo mestruale.

Chieda consiglio al medico, se non è sicura su cosa fare. Se desidera smettere di prendere Yasmin®

Può interrompere l'assunzione di Yasmin® in qualsiasi momento. Se vuole ancora evitare una gravidanza, si rivolga al medico per un consiglio su altri metodi di controllo delle nascite sicuri. Se desidera una gravidanza, smetta di prendere Yasmin® e attenda la mestruazione prima di provare a rimanere incinta. Sarà così in grado di calcolare più facilmente la data presunta del parto.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Yasmin® può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati sono stati associati all'uso di Yasmin®.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fra 1 e 10 donne su 100)

- disturbi mestruali, sanguinamenti intermestruali, dolore al seno
- mal di testa, umore depresso
- emicrania
- nausea
- perdite vaginali dense e biancastre, candidosi.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fra 1 e 10 donne su 1000)

- alterazione nel desiderio sessuale
- pressione alta, pressione bassa
- vomito
- acne, eruzione cutanea, prurito intenso
- infezione vaginale
- ritenzione idrica, variazioni del peso corporeo.

Effetti indesiderati rari (possono interessare fra 1 e 10 donne su 10.000)

- reazioni allergiche (ipersensibilità), asma
- secrezione mammaria
- danno dell'udito
- blocco di un vaso sanguigno da parte di un coagulo formatosi in altra sede
- le malattie della pelle eritema nodoso (caratterizzato da noduli cutanei rossastri e dolorosi) o eritema multiforme (caratterizzato da eruzione cutanea con lesioni a bersaglio o ulcere).

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE YASMIN®

Tenere Yasmin® fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale.

Data di scadenza

Non prenda Yasmin dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo

"Non usi dopo" o "SCAD."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Yasmin®

- **I principi attivi sono** il drospirenone e l'etinilestradiolo. Ogni compressa contiene 3 milligrammi di drospirenone e 0,030 milligrammi di etinilestradiolo.
- **Gli eccipienti sono:** lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, povidone K25, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6.000, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172).

Descrizione dell'aspetto di Yasmin® e contenuto della confezione

- Ogni blister di Yasmin® contiene 21 compresse rivestite con film giallo chiaro.
- Le compresse di Yasmin® sono rivestite con film; il nucleo della compressa è rivestito. Le compresse sono di colore giallo chiaro, rotonde, con facce convesse, su una delle quali sono impresse le lettere "DO" in un esagono regolare.
- Yasmin® è disponibile in confezioni da 1, 3, 6 e 13 blister, ognuno con 21 compresse rivestite con film.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare AIC in Regno Unito:

Bayer plc, Bayer House, Strawberry Hill, Nembury, Berkshire, RG14 1JA, Regno Unito

Titolare AIC in Italia:

Bayer S.p.A. - Viale Certosa, 130 – 20156 - Milano

Prodotto importato da:

Medifarm S.r.l. Via Tiburtina 1166, 00156 Roma

Rietichettato da:

Mediwin Limited, 13 Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito

Produttore:

Bayer Pharma AG, Berlino-Germania.

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

- Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito: **YASMIN**
- Francia: **JASMINE**

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il 12/ 2011.

Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Il marchio Yasmin® appartiene alla società Bayer Schering Pharma AG.

PIL-YAN-3-21-B-IT (UK)