

MOVICOL®

Bustina da 13,8 g, polvere per soluzione orale

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è MOVICOL e a che cosa serve
2. Prima di prendere MOVICOL
3. Come prendere MOVICOL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MOVICOL
6. Altre informazioni

1. CHE COS'È MOVICOL E A CHE COSA SERVE

Il nome di questo medicinale è MOVICOL, bustina da 13,8 g, polvere per soluzione orale. È un lassativo per il trattamento della stitichezza negli adulti, adolescenti e anziani. Non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 12 anni.

MOVICOL la aiuta ad avere un'adeguata evacuazione intestinale anche se la stitichezza si protrae da molto tempo. MOVICOL agisce anche nel trattamento della stitichezza severa, chiamata fecaloma.

2. PRIMA DI PRENDERE MOVICOL

Non prenda MOVICOL se il medico le ha detto che ha:

- un blocco dell'intestino (ostruzione intestinale, ileo)
 - una perforazione della parete intestinale
- una grave patologia infiammatoria dell'intestino, come colite ulcerosa, morbo di Crohn o megacolon tossico
- un'allergia ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti di MOVICOL

Condizioni cardiache

Se sta prendendo MOVICOL per il fecaloma, segua le istruzioni speciali riportate al paragrafo 3.

Assunzione di MOVICOL con altri medicinali

Alcuni medicinali, ad es. antiepilettici, possono non avere la stessa efficacia durante l'assunzione di MOVICOL. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Gravidanza e allattamento

Se è incinta o sta allattando al seno, chiedi consiglio al medico prima di prendere MOVICOL.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

MOVICOL non altera la sua capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

3. COME PRENDERE MOVICOL

Questo medicinale può essere assunto in ogni momento con o senza cibo o bevande.

Stitichezza

Una dose di MOVICOL è 1 bustina.

Prenda una bustina 1-3 volte al giorno, in base alla gravità della sua stitichezza.

Fecaloma

Per il trattamento del fecaloma è necessaria una dose di 8 bustine al giorno di MOVICOL. Le 8 bustine devono essere assunte nell'arco di 6 ore, se necessario per un periodo fino a 3 giorni. Se ha un'alterazione cardiaca non assuma più di 2 bustine ogni ora.

Come miscelare:

Apra la bustina e versi il contenuto in un bicchiere. Aggiunga circa 125 ml di acqua nel bicchiere (1/2 bicchiere). Mescoli bene finché tutta la polvere si è sciolta e la soluzione MOVICOL è limpida o leggermente opaca, poi beva la soluzione. Se sta assumendo MOVICOL per il fecaloma può essere più semplice sciogliere 8 bustine in 1 litro di acqua.

Durata del trattamento:

Stitichezza

In genere il trattamento con MOVICOL dura circa 2 settimane. Se ha necessità di prendere MOVICOL più a lungo, si rivolga al medico. Se la

sua stitichezza è causata da una malattia come il Morbo di Parkinson o la sclerosi multipla, o se sta assumendo medicinali che causano stitichezza, il medico potrebbe consigliarle di prendere MOVICOL per un periodo più lungo di 2 settimane. Generalmente nel trattamento a lungo termine, la dose può essere ridotta a 1 o 2 bustine al giorno.

Fecaloma

Il trattamento con MOVICOL dura fino a 3 giorni.

Se prende più MOVICOL di quanto deve

Può avere diarrea eccessiva, che può portare a disidratazione. In questo caso, interrompa il trattamento con MOVICOL e beva molti liquidi.

Se è preoccupato si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di prendere MOVICOL

Assuma la dose non appena se ne ricorda.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, MOVICOL può causare effetti indesiderati.

Contatti immediatamente il medico e interrompa l'assunzione di MOVICOL se:

- ha una reazione allergica grave che le provoca difficoltà a respirare, o gonfiore del viso, labbra, lingua o gola.

Altri effetti indesiderati comprendono:

reazioni allergiche che possono causare eruzioni cutanee, prurito, arrossamento della cute o orticaria, gonfiore a mani, piedi o caviglie, mal di testa e livelli alti o bassi di potassio nel sangue.

A volte può avere cattiva digestione, mal di stomaco o brontolii. Può anche sentirsi gonfio, soffrire di flatulenza, avere nausea o vomito, inoltre quando inizia ad assumere MOVICOL, può provare irritazione anale e avere una lieve diarrea. Questi effetti indesiderati normalmente migliorano riducendo la dose di MOVICOL che assume.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o dura più di qualche giorno, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

5. COME CONSERVARE MOVICOL

Tenere i medicinali fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi MOVICOL dopo la data di scadenza riportata sulla bustina.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Una volta preparata la soluzione di MOVICOL in acqua, se non riesce a berla tutta in una volta, la

conservi in frigorifero (2°C-8°C) e la tenga coperta.

Getti via la soluzione non utilizzata entro 6 ore. I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Ogni bustina da 13,8g di MOVICOL contiene:

Macrogol 3350	13,125 g
Sodio cloruro	0,3507 g
Sodio idrogenocarbonato (bicarbonato)	0,1785 g
Potassio cloruro	0,0466 g

MOVICOL contiene anche aroma di lime e limone, e acesulfame potassico come

dolcificante. L'aroma di lime e limone è costituito dai seguenti ingredienti: gomma di acacia, maltodestrina, olio di lime, olio di limone, citrale, acido citrico e acqua.

Quando viene sciolta in 125 millilitri di acqua, ogni bustina fornisce l'equivalente di:

Sodio	65 millimoli/litro
Cloruro	53 millimoli/litro
Potassio	5,4 millimoli/litro
Bicarbonato	17 millimoli/litro

Descrizione dell'aspetto di MOVICOL e contenuto della confezione

MOVICOL è disponibile in confezioni da 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 o 100 bustine.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare A.I.C.:

Norgine Pharma, 2, rue Jacques Daguerre, 92500 Rueil Malmaison, Francia.

Produttore:

LABORATOIRES MACORS, Rue des Caillottes, Z.I Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Francia.

Importato da: Medifarm S.r.l, Via Tiburtina, 1166, 00156 Roma, Italia.

Riconfezionato da: Mediwin Limited, 13 Martello Enterprise Centre, Littlehampton, Sussex, BN17 7PA, Regno Unito.

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni: MOVICOL: Belgio, Bulgaria,

Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera
MOVICOL V o ISOMOL o MOVICOL: Germania

MOVICOL-Pulver: Austria MOVICOLon: Paesi Bassi

Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il 09/2011.