

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

Lercanidipina Ranbaxy 10 mg compresse rivestite con film **Lercanidipina Ranbaxy 20 mg compresse rivestite con film**

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lercanidipina Ranbaxy e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Ranbaxy
3. Come prendere Lercanidipina Ranbaxy
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lercanidipina Ranbaxy
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lercanidipina Ranbaxy e a che cosa serve

Lercanidipina Ranbaxy appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati Calcioantagonisti (derivati diidropiridinici) che riducono la pressione sanguigna.

Lercanidipina Ranbaxy è usato per il trattamento della pressione arteriosa alta, nota anche come ipertensione, negli adulti di età superiore a 18 anni (non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 18 anni).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lercanidipina Ranbaxy

Non prenda Lercanidipina Ranbaxy

- Se è allergico (ipersensibile) alla lercanidipina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha avuto reazioni allergiche a farmaci analoghi a Lercanidipina Ranbaxy compresse (ad esempio amlodipina, nicardipina, felodipina, isradipina, nifedipina o lacidipina).
- Se soffre di alcune malattie cardiache quali:
 - insufficienza cardiaca non controllata
 - ostruzione del flusso del sangue dal cuore
 - angina instabile (angina a riposo o che peggiora progressivamente)
 - se ha avuto un attacco cardiaco meno di un mese fa
- Se ha gravi problemi ai reni o al fegato.
- Se sta prendendo medicinali inibitori dell'isoenzima CYP3A4:
 - farmaci antifungini (quali ketoconazolo o itraconazolo)
 - antibiotici macrolidi (quali eritromicina o troleandomicina)
 - antivirali (come ritonavir)

- Se sta assumendo un altro medicinale chiamato ciclosporina (usato per prevenire il rigetto d'organo dopo un trapianto)
 - con pompelmo o succo di pompelmoNon usi questo medicinale se è in gravidanza o se sta allattando (per maggiori informazioni vedere paragrafo Gravidanza, allattamento e fertilità).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di prendere Lercanidipina Ranbaxy compresse:

- Se soffre di altre malattie cardiache che non sono state trattate con l'inserimento di un pacemaker o ha una angina pre-esistente.
- Se ha problemi al fegato o ai reni, o se è in dialisi.

Deve informare il medico se pensa di essere (o di poterlo essere) incinta o se sta allattando con latte materno (vedere paragrafo Gravidanza, allattamento e fertilità).

Bambini e adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di Lercanidipina Ranbaxy non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 18 anni. Non vi sono dati disponibili.

Altri medicinali e Lercanidipina Ranbaxy

Informi il medico o il farmacista se:

- sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza prescrizione medica.
- sta assumendo un beta-bloccante per esempio metoprololo (un medicinale per trattare la pressione del sangue alta), diuretici o ACE-inibitori (medicinali per trattare la pressione del sangue alta)
- sta assumendo cimetidina, (a dosi maggiori di 800 mg, un medicinale per l'ulcera, l'indigestione o il bruciore di stomaco)
- sta assumendo digossina (un medicinale per le malattie cardiache)
- sta assumendo midazolam (un medicinale che aiuta a dormire)
- sta assumendo rifampicina (un medicinale per il trattamento della tubercolosi)
- sta assumendo astemizolo o terfenadina (medicinali per le allergie)
- sta assumendo amiodarone o chinidina (medicinali per il trattamento della tachicardia)
- sta assumendo fenitoina o carbamazepina (medicinali per l'epilessia). Il medico vorrà monitorare la sua pressione più frequentemente del solito.
- sta assumendo simvastatina (un medicinale per contrastare i livelli elevati di colesterolo).

Uso di Lercanidipina Ranbaxy con cibi e bevande e alcool

- Non beva alcool durante il trattamento con Lercanidipina Ranbaxy perché può aumentare l'effetto del medicinale.
- Non assuma Lercanidipina Ranbaxy con pompelmo o succo di pompelmo.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Lercanidipina Ranbaxy non deve essere usato se è in stato di gravidanza o sta allattando con latte materno o se sospetta o sta pianificando una gravidanza oppure non usa alcun metodo contraccettivo.

Chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Deve usare cautela per la possibilità di comparsa di capogiri, debolezza, stanchezza e raramente sonnolenza. Non guidi e non usi macchinari fino a quando non sa quale effetto ha Lercanidipina Ranbaxy su di lei.

Lercanidipina Ranbaxy contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri per esempio intolleranza al lattosio, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio, lo contatti prima di assumere questo medicinale.

3. Come prendere Lercanidipina Ranbaxy

Prenda Lercanidipina Ranbaxy seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, si rivolga al medico o al farmacista.

Adulti: la dose raccomandata è una compressa rivestita con film di Lercanidipina Ranbaxy 10 mg al giorno sempre alla stessa ora, preferibilmente al mattino, almeno 15 minuti prima della colazione, perché un pasto ad alto contenuto di grassi aumenta significativamente i livelli plasmatici del medicinale.

Se necessario, il medico può decidere di aumentare la dose passando a una compressa rivestita con film di Lercanidipina Ranbaxy da 20 mg una volta al giorno.

Le compresse devono essere ingerite preferibilmente intere con un po' d'acqua. La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolare la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Bambini e adolescenti

Questo medicinale non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

Pazienti anziani

Non è necessario alcun aggiustamento della dose. Tuttavia, bisogna usare particolare attenzione all'inizio del trattamento.

Pazienti con problemi al fegato o ai reni

In questi pazienti è necessaria una speciale attenzione all'inizio del trattamento ed un aumento della dose giornaliera a 20 mg deve essere valutato attentamente.

Se prende più Lercanidipina Ranbaxy di quanto deve

Non superi la dose che le è stata prescritta.

Se assume una dose superiore a quella prescritta o in caso di sovradosaggio, consulti immediatamente il medico e, se possibile, porti con sé le compresse e/o la confezione.

Il superamento della dose corretta può causare un eccessivo abbassamento della pressione sanguigna ed un battito cardiaco irregolare o più rapido. Può anche causare perdita di coscienza.

Se dimentica di prendere Lercanidipina Ranbaxy

Se dimentica di prendere la compressa, salti semplicemente la dose dimenticata e poi continui l'assunzione come prescritto il giorno successivo. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina Ranbaxy

Se interrompe il trattamento con Lercanidipina Ranbaxy, la sua pressione sanguigna può aumentare nuovamente. Consulti il medico prima di interrompere il trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alcuni effetti indesiderati possono essere seri:

Se si manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati consulti immediatamente il medico.

Raro (interessa meno di 1 paziente su 1.000): debolezza, nausea, dolore addominale, indigestione, angina pectoris (dolore al petto causato da un insufficiente apporto di sangue al cuore).

Molto raro (interessa meno di 1 paziente su 10.000): dolore toracico, riduzione della pressione sanguigna (che può causare capogiri e svenimento) e reazioni allergiche (sintomi ipersensibilità che include prurito, rash e orticaria).

Se soffre di angina pectoris pre-esistente, con il gruppo di medicinali ai quali appartiene Lercanidipina Ranbaxy, può verificarsi un aumento della frequenza, della durata e della gravità degli attacchi anginosi. Possono essere osservati casi isolati di infarto del miocardio.

Altri possibili effetti indesiderati:

Non comune (interessa meno di 1 paziente su 100): mal di testa, capogiri, tachicardia, palpitazioni (battiti disordinati o accelerati del cuore), vampate improvvise di rossore al viso, al collo e alla parte superiore del torace, caviglie gonfie.

Raro (interessa meno di 1 paziente su 1.000): sonnolenza, sensazione di malessere, vomito, bruciore di stomaco, dolori di stomaco, diarrea, arrossamento cutaneo, dolori muscolari, aumento della quantità di urina, stanchezza.

Molto raro (interessa meno di 1 paziente su 10.000): gengive gonfie, alterazione dei valori di funzionalità epatica (rilevata dagli esami del sangue), aumento dello stimolo ad urinare.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili
Segnalando gli effetti indesiderati, lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lercanidipina Ranbaxy

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Condizioni di conservazione

Blister: Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lercanidipina Ranbaxy

- Il principio attivo è lercanidipina.
Una compressa rivestita con film da 10 mg contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, pari a 9,4 mg di lercanidipina.
Una compressa rivestita con film da 20 mg contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, pari a 18,8 mg di lercanidipina.
- Gli altri componenti sono: *Nucleo della compressa*: magnesio stearato, povidone, sodio amido glicolato (Tipo A), lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina.
Film di rivestimento compresse da 10 mg: macrogol, alcool polivinilico (parzialmente idrolizzato), talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).
Film di rivestimento compresse da 20 mg: macrogol, alcool polivinilico (parzialmente idrolizzato), talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Descrizione dell'aspetto di Lercanidipina Ranbaxy e contenuto della confezione

Lercanidipina Ranbaxy 10 mg compresse sono compresse di colore giallo, rotonde, rivestite con film, biconvesse del diametro di 6,5 mm, con linea d'incisione su un lato, con impresso "L" sull'altro lato.

Lercanidipina Ranbaxy 20 mg compresse sono compresse di colore rosa, rotonde, rivestite con film, biconvesse del diametro di 8,5 mm, con linea d'incisione su un lato, con impresso "L" sull'altro lato.

La linea d'incisione sulla compressa serve per agevolare la rottura al fine d'ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

Confezioni: Blisters:

Lercanidipina Ranbaxy 10 mg compresse rivestite con film: 28 compresse

Lercanidipina Ranbaxy 20 mg compresse rivestite con film: 28 compresse

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Ranbaxy Italia S.p.A. Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano

Rilascio dei lotti

Actavis hf. - Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður - Islanda

Actavis Ltd. Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000 - Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse str.- Dupnitsa 2600 - Bulgaria

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: