

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### Candesartan Ranbaxy 8 mg compresse Candesartan Ranbaxy 16 mg compresse

#### Medicinale equivalente

#### Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio illustrativo. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone perché potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Candesartan Ranbaxy e a che cosa serve
2. Prima di prendere Candesartan Ranbaxy
3. Come prendere Candesartan Ranbaxy
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Candesartan Ranbaxy
6. Altre informazioni

### 1. CHE COS'È CANDESARTAN RANBAXY E A CHE COSA SERVE

Il nome del medicinale è Candesartan Ranbaxy . Il principio attivo è candesartan cilexetil. Questo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antagonisti dell'angiotensina-II. Esso agisce rilassando e dilatando i vasi sanguigni. Questo aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e rende anche più facile al cuore pompare il sangue in tutte le parti del corpo.

Il medicinale viene usato per:

- trattare la pressione alta del sangue (ipertensione) nei pazienti adulti.
- trattare l'insufficienza cardiaca negli adulti con ridotta funzionalità dei muscoli cardiaci, in aggiunta agli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) o quando gli ACE-inibitori non vengono utilizzati (gli ACE-inibitori sono un gruppo di medicinali usati per trattare l'insufficienza cardiaca).

### 2. PRIMA DI PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY

#### Non prenda Candesartan Ranbaxy:

- se è allergico (ipersensibile) al candesartan o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Candesartan Ranbaxy (vedere paragrafo 6);
- se è incinta da più di 3 mesi. (È anche meglio evitare Candesartan Ranbaxy all'inizio della gravidanza. Vedere paragrafo "Gravidanza");
- se è affetto da gravi malattie del fegato o da ostruzione biliare (un problema che riguarda il drenaggio della bile dalla cistifellea);

### **Faccia particolare attenzione con Candesartan Ranbaxy**

Informi il medico prima di prendere o mentre sta prendendo Candesartan Ranbaxy:

- se soffre di problemi al cuore, fegato o reni o se è in dialisi;
- se ha avuto di recente un trapianto di rene
- se presenta vomito, ha recentemente vomitato molto o soffre di diarrea
- se soffre di una malattia alla ghiandola surrenale chiamata Sindrome di Conn (anche nota come Iperaldosteronismo primario)
- se ha la pressione del sangue bassa
- se ha mai avuto un ictus
- informi il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza)
- Candesartan Ranbaxy non è raccomandato nella fase iniziale della gravidanza e non deve essere assunto se è incinta da più di 3 mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato in questo periodo (vedere paragrafo "Gravidanza".)

Se una di queste condizioni la riguarda, il medico potrà volerla visitare più spesso e farle fare degli esami medici.

Se ha in programma un intervento chirurgico, informi il medico o il dentista che sta assumendo Candesartan Ranbaxy. Questo perché Candesartan Ranbaxy, quando preso assieme ai farmaci anestetici, può causare un abbassamento della pressione sanguigna.

### Uso nei bambini

Non vi è esperienza dell'uso di Candesartan Ranbaxy nei bambini di età inferiore a 18 anni. Pertanto Candesartan Ranbaxy non deve essere somministrato ai bambini.

### **Assunzione di Candesartan Ranbaxy con altri medicinali**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Candesartan Ranbaxy può avere influenzare il modo di agire di alcuni medicinali e questi possono avere effetto su Candesartan Ranbaxy. Se sta usando determinati medicinali, il medico può aver bisogno di farle fare di volta in volta gli esami del sangue.

In particolare, informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- Altri medicinali che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna inclusi beta-bloccanti, diazossido e ACE-inibitori come enalapril, captopril, lisinopril o ramipril.
- Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene, naprossene, diclofenac, celecoxib o etoricoxib (medicinali per alleviare il dolore e l'infiammazione).
- Acido acetilsalicilico (se ne sta prendendo più di 3 g al giorno); (medicinale per alleviare il dolore e l'infiammazione).
- Integratori di potassio o sostituti del sale che contengono potassio (medicinali che aumentano la quantità di sale nel sangue).
- Eparina (medicinale per diluire il sangue).
- Diuretici.

- Litio (medicinale per i disturbi mentali).

### **Assunzione di Candesartan Ranbaxy con cibo e bevande (in particolare con alcool)**

Candesartan Ranbaxy può essere assunto con o senza cibo.

- Quando le viene prescritto Candesartan Ranbaxy, parli con il medico prima di bere alcool. L'alcool può provocare svenimento o capogiri.

### **Gravidanza e allattamento**

#### Gravidanza

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza). Normalmente il medico le consiglierà di smettere di prendere Candesartan Ranbaxy prima di restare incinta o non appena si accorge di esserlo e le consiglierà di prendere un altro medicinale invece di Candesartan Ranbaxy.

Candesartan Ranbaxy non è raccomandato all'inizio della gravidanza e non deve essere preso se è incinta da più di tre mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato dopo il terzo mese di gravidanza.

#### Allattamento

Informi il medico se sta allattando o se sta per iniziare l'allattamento. Candesartan Ranbaxy non è raccomandato nelle madri che allattano al seno e il medico può scegliere un altro trattamento se lei desidera allattare, specialmente se il bambino è appena nato o se è prematuro.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Alcune persone possono sentirsi stanche ed avere capogiri quando assumono Candesartan Ranbaxy. Se ciò accade, non deve guidare o usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Candesartan Ranbaxy**

Candesartan Ranbaxy contiene lattosio che è un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. COME PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY**

Prenda sempre Candesartan Ranbaxy seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, chieda al medico o al farmacista. È importante prendere Candesartan Ranbaxy ogni giorno.

Può prendere Candesartan Ranbaxy con o senza cibo.

Deglutire la compressa con un bicchiere d'acqua.

Cerchi di prendere la compressa alla stessa ora ogni giorno. Questo l'aiuterà a ricordarsi di prenderla.

#### Per la pressione del sangue alta

- La dose abituale di Candesartan Ranbaxy è 8 mg una volta al giorno. Il medico può aumentare la dose a 16 mg una volta al giorno e fino a 32 mg una volta al giorno secondo la risposta della sua pressione sanguigna.
- Per alcuni pazienti, come quelli che soffrono di malattie del fegato, dei reni o hanno di recente perso liquidi a seguito di vomito, diarrea o per l'assunzione di diuretici, il medico può prescrivere una dose iniziale più bassa.
- Alcuni pazienti di razza nera possono avere una risposta ridotta con questo tipo di medicinale,

quando somministrato come unico trattamento, e possono aver bisogno di una dose più alta.

Scompenso cardiaco:

- La dose iniziale abituale di Candesartan Ranbaxy è 4 mg una volta al giorno. Il medico può raddoppiare la dose ad intervalli di almeno 2 settimane fino a 32 mg al giorno. Candesartan Ranbaxy può essere assunto con altri medicinali per l'insufficienza cardiaca e il medico deciderà quale trattamento è più adatto per lei.

### **Se prende più Candesartan Ranbaxy di quanto deve**

Se prende più Candesartan Ranbaxy di quanto prescritto dal medico, contatti immediatamente un medico o un farmacista per chiedere consiglio.

### **Se dimentica di prendere Candesartan Ranbaxy**

Non prenda mai una doppia dose per compensare quella dimenticata. Prenda la compressa successiva come al solito.

### **Se interrompe il trattamento con Candesartan Ranbaxy**

Se smette di prendere Candesartan Ranbaxy, la sua pressione può aumentare nuovamente. Pertanto non smetta di prendere Candesartan Ranbaxy senza parlarne prima con il medico.

Se ha dubbi sull'uso di questo medicinale, chieda al medico o al farmacista.

## **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, Candesartan Ranbaxy può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

È importante che lei sia informato che possono verificarsi questi effetti indesiderati.

### **Smetta di prendere Candesartan Ranbaxy e chiedi immediatamente aiuto se ha una qualsiasi delle seguenti reazioni allergiche:**

- Difficoltà di respiro, con o senza gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola.
- Gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola, che possono causare difficoltà ad ingoiare.
- Grave prurito della pelle (con gonfiore).

Candesartan Ranbaxy può causare una riduzione del numero dei globuli bianchi nel sangue. La resistenza all'infezione può esserne diminuita e può notare stanchezza, un'infezione o febbre. Se questo accade, contatti il medico.

Il medico può volere farle fare degli esami del sangue per controllare se Candesartan Ranbaxy ha avuto effetto sulla sua pressione sanguigna (per la comparsa di agranulocitosi).

Altri effetti indesiderati comprendono:

### **Comuni (riguardano da 1 a 10 pazienti su 100)**

- Capogiro stordimento/giramento di testa- Mal di testa
- Infezione respiratoria
- Bassa pressione sanguigna. Questo può farla sentire debole o stordito

- Modifiche dei risultati degli esami del sangue:

0

Una quantità aumentata di potassio nel sangue, specialmente se lei ha già problemi ai reni o scompenso cardiaco. Se questa è grave, allora lei può anche notare stanchezza, debolezza, un battito cardiaco irregolare o formicolio.

Effetti sul funzionamento dei suoi reni, specialmente se ha già problemi ai reni o scompenso cardiaco. In casi molto rari, si può verificare insufficienza renale.

### **Molto raro (si manifesta in meno di 1 utilizzatore su 10.000)**

- Gonfiore del viso, labbra, lingua e/o gola.
- Una riduzione dei globuli rossi o bianchi. Lei può notare stanchezza, infezione o febbre.
- Eruzione cutanea, eruzione con gonfiore (orticaria).
- Prurito.
- Dolore alla schiena, dolore alle articolazioni e ai muscoli.
- Modifiche nel funzionamento del fegato, inclusa infiammazione del fegato (epatite). Può notare stanchezza, ingiallimento della pelle e del bianco degli occhi e sintomi simili all'influenza.
- Nausea.
- Modifiche dei risultati degli esami del sangue:
- Una quantità ridotta di sodio nel sangue. Se questa è grave, allora lei può anche notare debolezza, mancanza di energia o crampi muscolari.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

## **5. COME CONSERVARE CANDESARTAN RANBAXY**

Tenere Candesartan Ranbaxy fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usare Candesartan Ranbaxy dopo la data di scadenza riportata sull'astuccio e sul blister dopo la dicitura "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

I medicinali non devono essere gettati nelle acque di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Candesartan Ranbaxy**

Il principio attivo è il candesartan cilexetil.

Ogni compressa contiene 8 mg o 16 mg di candesartan cilexetil.

Gli eccipienti sono:

Candesartan Ranbaxy 8 mg e 16 mg compresse:  
carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, ossido di ferro rosso (E172), lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol 6000.

**Descrizione dell'aspetto di Candesartan Ranbaxy e contenuto della confezione**

Candesartan Ranbaxy 8 mg compresse:  
compresse di colore rosa, a forma di capsula, con inciso “C” & “10” ai lati della linea di frattura su di un lato e con una linea di frattura sull’altro lato.

Candesartan Ranbaxy 16 mg compresse:  
compresse di colore rosa, a forma di capsula, con inciso “C” & “11” ai lati della linea di frattura su di un lato e con una linea di frattura sull’altro lato.

Le compresse di Candesartan Ranbaxy sono disponibili in:

blister in plastica in confezioni da: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio:**

Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano

**Produttori responsabili del rilascio dei lotti:**

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co.Tipperary - Irlanda

Basics GmbH - Hemmelrather Weg 201 - D-51377 Leverkusen - Germania

Terapia S.A. - 124 Fabricii Street - 400 632 Cluj-Napoca - Romania

Cemelog BRS Kft - 2040 Budaörs, Vasút u. 2 - Ungheria

Ranbaxy Pharmacie Generiques -11-15 quai de Dion Bouton - 928020 Puteaux - Francia

**Questo foglio illustrativo è stato approvato l’ultima volta il: Aprile 2012**

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse

#### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse e a che cosa serve
2. Prima di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse
3. Come prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse
6. Altre informazioni

### 1. CHE COS'È CANDESARTAN RANBAXY 32 MG COMPRESSE E A CHE COSA SERVE

Il nome del medicinale è Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse. Il principio attivo è il candesartan cilexetil. Questo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "antagonisti del recettore dell'angiotensina II". Questi funzionano rendendo i suoi vasi sanguigni rilassati e più ampi. Questo aiuta a ridurre la pressione sanguigna. Inoltre rende più facile per il cuore, pompare il sangue in tutte le parti dell'organismo.

Questo medicinale viene usato per trattare:

- Elevata pressione del sangue (ipertensione) nei pazienti adulti.
- Insufficienza cardiaca in pazienti adulti con ridotta funzionalità del muscolo cardiaco, in aggiunta agli "Inibitori dell'enzima di Conversione dell'Angiotensina" (ACE) o quando gli ACE-inibitori non possono essere usati (gli ACE-inibitori sono un gruppo di medicinale usati per trattare l'insufficienza cardiaca).

### 2. PRIMA DI PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY 32 MG COMPRESSE

**Non prenda CANDESARTAN RANBAXY 32 mg compresse:**

- se è allergico (ipersensibile) al candesartan cilexetil o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse (vedere paragrafo 6).

- se è incinta da più di 3 mesi (inoltre è meglio evitare Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse anche nella fase iniziale della gravidanza – vedere paragrafo “Gravidanza”).
- se soffre di gravi malattie del fegato o di ostruzione biliare (un problema di drenaggio della bile dalla cistifellea).

Se non è sicuro che una di queste condizioni la riguardi, ne parli con il medico o il farmacista prima di assumere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse.

### **Facciamo particolare attenzione con Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse**

Prima di assumere o mentre sta assumendo Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse informi il medico:

- se di problemi al cuore, al fegato o ai reni o se è in dialisi
- se ha subito recentemente un trapianto di rene
- se ha vomitato o recentemente ha vomitato molto o se soffre di diarrea
- se soffre di una malattia delle ghiandole surrenali detta Sindrome di Conn (chiamata anche iperaldosteronismo primario)
- se ha la pressione del sangue bassa
- se ha mai avuto un ictus
- se pensa di essere incinta (o potrebbe esserlo) deve informare il medico. Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse non è raccomandato durante la fase iniziale della gravidanza e non deve essere preso se è incinta da più di 3 mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato in questi periodi (vedere paragrafo “Gravidanza”).

Se lei è in queste condizioni, il medico può volerla vedere più spesso e prescrivere alcuni esami di laboratorio.

Se deve subire un intervento chirurgico, informi il medico o il dentista che sta prendendo Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse, perché quando viene associato ad alcuni anestetici, può causare una caduta della pressione sanguigna.

Usonei bambini

Non vi è esperienza nell'uso di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse nei bambini (minori di 18 anni di età). Pertanto, Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse non deve essere somministrato ai bambini.

### **Assunzioni di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse con altri medicinali**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse può influire sul modo in cui agiscono altri medicinali ed altri medicinali possono avere un effetto su Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse. Se sta assumendo determinati medicinali, il medico può aver bisogno di prescrivere periodicamente alcuni esami del sangue.

In particolare, informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Altri medicinali che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, inclusi i beta-bloccanti, la diazoxide e



gli ACE-inibitori, come enalapril, captopril, lisinopril o ramipril.

- Antinfiammatori non steroidei (FANS), come ibuprofene, naprossene, diclofenac, celecoxib o etoricoxib (medicinali usati per attenuare il dolore e l'infiammazione).
- Acido acetilsalicylico (se assume più di 3 grammi al giorno) (medicinale usato per attenuare il dolore e l'infiammazione).
- Supplementi di potassio o sostituti del sale contenenti potassio (medicinali che aumentano la quantità di potassio nel sangue).
- Eparina (un medicinale per rendere più fluido il sangue).
- Diuretici.
- Litio (un medicinale usato per trattare problemi di salute mentale).

### **Assunzione di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse con cibi e bevande (in particolare con l'alcool)**

- Può prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse con o senza cibo.
- Quando viene prescritto Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse, parli con il medico prima di bere alcool. L'alcool può causare capogiri o debolezza.

### **Gravidanza e allattamento**

#### Gravidanza

Deve informare il medico se pensa di essere incinta (o se potrebbe esserlo). Normalmente il medico le consiglierà di smettere di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse prima di restare incinta o non appena si accorge di esserlo e le consiglierà di prendere un altro medicinale invece di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse. Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse non è raccomandato all'inizio della gravidanza e non deve essere preso dopo il terzo mese, perché può causare gravi danni al feto, se usato dopo il terzo mese di gravidanza.

#### Allattamento

Informi il medico se sta allattando o se sta per iniziare l'allattamento. Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse non è raccomandato nelle madri che allattano al seno ed il medico può scegliere per lei un altro trattamento se lei desidera allattare, specialmente se il suo bambino è appena nato o se è nato prematuro.

### **Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari**

Alcuni pazienti si sentono stanchi o hanno capogiri durante il trattamento con Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse. Se le succede questo, non deve guidare o usare utensili o macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse**

Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse contiene lattosio che è un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. COME PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY 32 MG COMPRESSE**

Prenda sempre Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista. È importante prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse ogni

giorno. Può prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse con o senza cibo.

Deglutire la compressa con un bicchiere d'acqua.

Cerchi di prendere la compressa ogni giorno alla stessa ora. Questo aiuta a ricordarsi di prenderla.

Per dosaggi che non sono possibili con Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse, sono disponibili altre formulazioni contenenti il candesartan cilexetil.

#### Per la pressione del sangue alta

- La dose abituale di Candesartan Ranbaxy è di 8 mg una volta al giorno. Il medico può aumentare la dose a 16 mg una volta al giorno e poi fino a 32 mg una volta al giorno, a seconda della risposta della pressione sanguigna.
- In alcuni pazienti, come quelli con problemi di fegato o di reni o in quelli che recentemente hanno perso liquidi organici, ad es. mediante il vomito o la diarrea o mediate l'uso di diuretici, il medico può prescrivere una dose iniziale ridotta.
- Alcuni pazienti di razza nera possono presentare una risposta ridotta a questo tipo di medicinali, quando somministrati come unico trattamento, pertanto questi pazienti possono aver bisogno di dosi più elevate.

#### Per l'insufficienza cardiaca

- La dose iniziale abituale di Candesartan Ranbaxy è di 4 mg una volta al giorno. Il medico può aumentare la dose raddoppiandola ad intervalli di almeno 2 settimane fino a 32 mg una volta al giorno. Candesartan Ranbaxy può essere assunto assieme ad altri medicinali per l'insufficienza cardiaca ed il medico deciderà quale trattamento è adatto a lei.

#### **Se prendi più Candesartan Ranbaxy 32 mg compressi di quanto deve**

Se ha preso più Candesartan Ranbaxy 32 mg compressi di quello prescritto dal medico, contatti immediatamente il medico o il farmacista per consiglio.

#### **Se dimentichi di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse**

Non prenda mai una doppia dose per compensare quella dimenticata. Prenda la compressa successiva al solito orario.

#### **Se interrompe il trattamento con Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse**

Se smette di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse, la sua pressione può aumentare ancora. Non smetta di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse senza parlarne prima con il medico.

Se ha dubbi relativi all'uso di questo medicinale, chieda al medico o al farmacista.

## **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Cometutte i medicinali, Candesartan Ranbaxy può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

È importante che lei sia informato di quali possono essere questi effetti indesiderati.

#### **Smetta di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse e richiedi immediatamente assistenza**

### **medicase compare una delle seguenti reazioni allergiche:**

- difficoltà di respiro con o senza gonfiore di viso, labbra, lingua e/o gola
- gonfiore del viso, labbra, lingua e/o gola che possono causare difficoltà a deglutire
- forte prurito alla pelle (con noduli).

Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse può causare una diminuzione dei globuli bianchi. La sua resistenza alle infezioni può diminuire e può accusare stanchezza, infezioni o febbre. Se questo succede, contatti il medico. Il medico può occasionalmente prescrivere degli esami del sangue per controllare se Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse ha avuto degli effetti sul sangue (agranulocitosi).

Altri possibili effetti indesiderati comprendono:

### **Effetti indesiderati comuni (riguardano da 1 a 10 pazienti su 100):**

- Sensazione di capogiro o vertigini.
- Mal di testa.
- Infezioni respiratorie.
- Pressione del sangue bassa. Questo può causare debolezza o capogiri.
- Alterazioni dei risultati degli esami del sangue:
  - aumento della quantità di potassio nel sangue, particolarmente se già soffre di problemi ai reni o di insufficienza cardiaca. Se l'effetto è grave può accusare stanchezza, debolezza, battito cardiaco irregolare o formicolii.
- Effetti sul funzionamento dei reni, particolarmente se già soffre di problemi renali o di insufficienza cardiaca. In casi molto rari può comparire insufficienza renale.

### **Effetti indesiderati rari (riguardano meno di 1 paziente su 10.000):**

- Gonfiore di viso, labbra, lingua e/o gola.
- Riduzione dei globuli rossi o bianchi. Può accusare stanchezza, un'infezione o febbre.
- Eruzione cutanea, orticaria.
- Prurito.
- Dolore alla schiena, alle articolazioni ed ai muscoli.
- Alterazioni del funzionamento del fegato, inclusa infiammazione (epatite). Può accusare stanchezza, ingiallimento della cute o del bianco degli occhi e sintomi di tipo influenzale.
- Nausea.
- Alterazioni dei risultati degli esami del sangue:
  - ridotta quantità di sodio nel sangue. Se l'effetto è grave può accusare stanchezza, mancanza di energia e crampi muscolari.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

## **5. COME CONSERVARE CANDESARTANRANBAXY 32 MG COMPRESSE**

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse dopo la data di scadenza riportata sulla confezione e sul blister dopo la dicitura "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

### Cosa contiene Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse

- Il principio attivo è candesartancilexetil.  
Ogni compressa contiene 32 mg di candesartancilexetil.
- Gli eccipienti sono:  
carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa (bassa viscosità), ossido di ferro rosso (E172), lattosio monoidrato, magnesio stearato, amidolo di mais, macrogol 6000.

### Descrizione dell'aspetto di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse e contenuto della confezione

#### Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse

compressa rosata di forma ovale, con inciso "C" & "12" sui lati della linea di frattura su un lato e con una linea di frattura sull'altro lato.

Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse è disponibile in:

blister in plastica in confezioni da: 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 95, 98, 100, 105 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Ranbaxy Italia S.p.A.  
Piazza Filippo Meda, 3  
20121 Milano

### Produttori responsabili del rilascio dei lotti

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary - Irlanda

Basics GmbH- Hemmelrather Weg 201 - D-51377 Leverkusen- Germania  
Terapia S.A. - 124 Fabricii Street - 400632 Cluj-Napoca- Romania  
Cemelog BRSKft - 2040 Budaörs, Vasút u. 2 - Ungheria  
Ranbaxy Pharmacie Génériques- 11-15 quai de Dion Bouton- 928020 Puteaux- Francia

**Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta nel: Aprile 2012**

Agenzia Italiana del Farmaco