

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### Venlafaxina Ranbaxy Generici 75 mg capsule a rilascio prolungato Venlafaxina Ranbaxy Generici 150 mg capsule a rilascio prolungato

#### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone anche se i sintomi della loro malattia sono uguali ai suoi perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Venlafaxina Ranbaxy Generici e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici
3. Come prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Venlafaxina Ranbaxy Generici
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Venlafaxina Ranbaxy Generici e a che cosa serve**

Venlafaxina Ranbaxy Generici è un antidepressivo che appartiene a un gruppo di medicinali chiamati inibitori della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina (SNRI). Questo gruppo di medicinali è utilizzato per il trattamento della depressione e di altre condizioni, come i disturbi d'ansia. Si ritiene che le persone che sono depresse e/o ansiose abbiano nel cervello livelli più bassi di serotonina e noradrenalina. Non si conosce pienamente il modo in cui gli antidepressivi agiscono, tuttavia essi possono essere di aiuto aumentando i livelli di serotonina e noradrenalina nel cervello.

Venlafaxina Ranbaxy Generici è un trattamento per gli adulti affetti da depressione. Venlafaxina Ranbaxy Generici è anche un trattamento per gli adulti con i seguenti disturbi ansiosi: disturbo d'ansia generalizzata, disturbo d'ansia sociale (paura di o tendenza ad evitare situazioni sociali) e disturbo da panico (attacchi di panico). Un trattamento adeguato della depressione o dei disturbi ansiosi è importante per aiutarla a sentirsi meglio. Se non curata, la sua condizione può non risolversi e può diventare più grave e più difficile da trattare.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici**

##### **Non prenda Venlafaxina Ranbaxy Generici**

- Se è allergico alla venlafaxina o ad uno qualsiasi degli altri componenti **di questo medicinale (elencati nel paragrafo 6)**.

- Se sta prendendo o se ha preso in qualunque momento negli ultimi 14 giorni, un qualsiasi medicinale noto come “inibitore irreversibile delle monoamino-ossidasi (I-MAO), usato per il trattamento della depressione o della malattia di Parkinson. L’assunzione di un I-MAO irreversibile insieme a Venlafaxina Ranbaxy Generici, può causare effetti indesiderati gravi o anche pericolosi per la vita. Inoltre, deve aspettare almeno 7 giorni dopo la sospensione di Venlafaxina Ranbaxy Generici prima di prendere un qualsiasi I-MAO (vedere anche paragrafo “Altri medicinali e Venlafaxina Ranbaxy Generici” e le informazioni nel paragrafo “Sindrome serotoninergica”).

**Avvertenze e precauzioni** Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici:

- Se utilizza altri medicinali che, assunti contemporaneamente a Venlafaxina Ranbaxy Generici, possono far aumentare il rischio di sviluppare sindrome serotoninergica (vedere paragrafo “Altri medicinali e Venlafaxina Ranbaxy Generici”).
- Se ha problemi agli occhi, come alcuni tipi di glaucoma (aumento della pressione all’interno dell’occhio).
- Se ha dei precedenti di pressione del sangue alta.
- Se ha dei precedenti di problemi cardiaci.
- Se le è stato diagnosticato un ritmo cardiaco anormale.
- Se ha dei precedenti di crisi convulsive (attacchi epilettici).
- Se ha dei precedenti di bassi livelli di sodio nel sangue (iponatriemia).
- Se ha una tendenza alla comparsa di lividi o a sanguinare facilmente (precedenti di patologie emorragiche), o se sta prendendo altri medicinali che possono far aumentare il rischio di sanguinamento, ad esempio il warfarin (usato per prevenire coaguli nel sangue).
- Se ha dei precedenti o se li ha avuti qualcuno nella sua famiglia di mania o disturbi bipolari (sensazione di sovraeccitazione o di euforia).
- Se ha dei precedenti di comportamento aggressivo.

Nelle prime settimane di trattamento, Venlafaxina Ranbaxy Generici può causare una sensazione di irrequietezza o di incapacità a rimanere seduti o fermi. Deve informare il suo medico se le succede questo.

### Idee di suicidio e peggioramento della depressione o del disturbo d’ansia

Se è depresso e/o soffre di disturbi d’ansia, può avere a volte pensieri di autolesionismo o di suicidio. Questi possono aumentare quando inizia a prendere antidepressivi per la prima volta in quanto tutti questi medicinali hanno bisogno di tempo per funzionare, all’incirca due settimane, ma a volte anche di più.

È molto probabile che Lei pensi questo:

- Se ha avuto in precedenza pensieri di suicidio o autolesionismo.
- Se è un giovane adulto. Informazioni da studi clinici hanno mostrato un aumentato rischio di comportamento suicidario in giovani adulti (meno di 25 anni di età) con condizioni psichiatriche trattate con un antidepressivo.

Se in qualsiasi momento ha pensieri autolesionisti o suicidari, contatti immediatamente il medico o vada immediatamente all’ospedale.

Può essere di aiuto dire a un parente o ad un amico intimo che è depresso o che soffre di disturbi d'ansia e chiedergli di leggere questo foglio illustrativo. Può chiedere loro di dirle se pensano che la sua depressione o ansia stanno peggiorando o se sono preoccupati riguardo a cambiamenti nel suo comportamento.

### Bocca secca

Nel 10% dei pazienti trattati con venlafaxina è stata riportata bocca secca. Questo può far aumentare il rischio di carie. Deve pertanto avere particolare cura della sua igiene dentale.

### Diabete

I livelli di glucosio nel sangue possono essere alterati da Venlafaxina Ranbaxy Generici. Pertanto, potrà esserci la necessità di modificare la dose dei suoi medicinali per il diabete.

### Bambini e Adolescenti

Venlafaxina Ranbaxy Generici non deve essere utilizzata normalmente nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Deve anche sapere che pazienti al di sotto dei 18 anni presentano un rischio maggiore di effetti indesiderati, come tentativo di suicidio, pensieri suicidari e ostilità (principalmente aggressività, comportamento di opposizione e collera) quando assumono questo tipo di medicinali. Ciò nonostante, il medico può prescrivere Venlafaxina Ranbaxy Generici a pazienti con meno di 18 anni, se ha deciso che questo è nel loro migliore interesse. Se il medico ha prescritto Venlafaxina Ranbaxy Generici per un paziente minore di 18 anni, e lei desidera maggiori informazioni, ricontatti il medico. Deve informare il medico se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati si manifesta o peggiora nel corso dell'assunzione di Venlafaxina Ranbaxy Generici da parte di un paziente di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, non sono stati ancora dimostrati gli effetti di questo medicinale sulla sicurezza a lungo termine relativi alla crescita, alla maturazione e allo sviluppo cognitivo e comportamentale in questa fascia d'età di pazienti.

### **Altri medicinali e Venlafaxina Ranbaxy Generici**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Il medico deciderà se può usare Venlafaxina Ranbaxy Generici con altri medicinali.

Non inizi o interrompa il trattamento con altri medicinali, inclusi i medicinali senza prescrizione medica, i preparati naturali ed erboristici, prima di aver chiesto al medico o farmacista.

- Gli inibitori delle monoamino-ossidasi utilizzati per il trattamento della depressione o della malattia di Parkinson **non devono essere presi con Venlafaxina Ranbaxy Generici**. Informi il medico se ha preso questi medicinali negli ultimi 14 giorni (I-MAO: vedere paragrafo “Cosa deve sapere prima di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici”).
- **Sindrome serotoninergica**  
Può svilupparsi una condizione potenzialmente rischiosa per la vita o Sindrome Neurolettica Maligna (SNM) (consulti il paragrafo “Possibili effetti indesiderati”), con l'uso di venlafaxina, soprattutto quando assunta con altri medicinali.

Esempi di questi medicinali sono:

- Triptani (usati per l'emicrania)
- Altri medicinali per trattare la depressione, per esempio SNRI, SSRI, derivati triciclici o medicinali contenenti litio
- Medicinali contenenti linezolid, un antibiotico (usato per trattare le infezioni)
- Medicinali contenenti moclobemide, un I-MAO (usato per trattare la depressione)
- Medicinali contenenti sibutramina (usato per dimagrire)
- Medicinali contenenti tramadolo, fentanil, tapentadolo, petidina o pentazocina (usati per trattare il dolore forte)
- Medicinali che contengono dextrometorfano (usato per il trattamento della tosse)
- Medicinali che contengono metadone (usato per trattare la tossicodipendenza da oppiacei o il dolore forte)
- Medicinali che contengono Blu di Metilene (usato per il trattamento degli alti livelli di metaemoglobina nel sangue)
- Preparati a base di Erba di San Giovanni (detta anche *Hypericum Perforatum*, un rimedio a base di una pianta medicinale usato per trattare la depressione lieve)
- Prodotti contenenti triptofano (usato per disturbi del sonno e di depressione)
- Medicinali antipsicotici (usati per problemi come sentire, vedere o provare cose che non esistono, credenze errate, sospettosità insolita, ragionamento non chiaro e ritiro sociale)

I segni e sintomi della sindrome serotoninergica possono comprendere una combinazione dei seguenti: irrequietezza, allucinazioni, perdita della coordinazione, aumento del battito cardiaco, aumento della temperatura corporea, rapidi cambiamenti della pressione sanguigna, riflessi iperattivi, diarrea, coma, nausea, vomito.

Nella sua forma più grave, la sindrome serotoninergica può somigliare alla Sindrome Neurolettica Maligna (SNM). I segni e sintomi dell'SNM possono includere una combinazione di febbre, battito cardiaco accelerato, sudorazione, grave rigidità muscolare, confusione, aumento degli enzimi muscolari (determinati dalle analisi del sangue).

Informi il medico se sta assumendo contraccettivi orali.

**Se pensa di avere la sindrome serotoninergica, informi immediatamente il medico o si rechi immediatamente al pronto soccorso del più vicino ospedale.**

Deve informare il medico se sta prendendo medicinali che possono influenzare il ritmo cardiaco.

Esempi di questi medicinali includono:

- Antiaritmici come chinidina, amiodarone, sotalolo o dofetilide (usati per il trattamento del ritmo cardiaco anormale)
- Antipsicotici come tioridazina (vedere anche sopra Sindrome serotoninergica)
- Antibiotici come eritromicina o moxifloxacina (usati per trattare le infezioni batteriche)
- Antistaminici (usati per il trattamento delle allergie)

Anche i seguenti medicinali possono interferire con Venlafaxina Ranbaxy Generici e devono essere utilizzati con cautela. È particolarmente importante segnalare al proprio medico o al farmacista se sta prendendo medicinali che contengono:

- Ketoconazolo (un medicinale antifungino)

- Aloperidolo o risperidone (per il trattamento dei disturbi psichiatrici)
- Metoprololo (un beta-bloccante per il trattamento della pressione del sangue alta e i problemi cardiaci)

### **Venlafaxina Ranbaxy Generici con cibo, bevande e alcool**

Deve assumere Venlafaxina Ranbaxy Generici con il cibo (vedere paragrafo 3 “Come prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici”).

Deve evitare l’alcool mentre sta assumendo Venlafaxina Ranbaxy Generici.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Deve usare Venlafaxina Ranbaxy Generici solo dopo aver discusso con il medico dei potenziali benefici e dei potenziali rischi per il nascituro.

Si assicuri che la sua ostetrica e/o il suo medico sappiano che è in trattamento con Venlafaxina Ranbaxy Generici. Quando assunti durante la gravidanza, i medicinali simili (SSRI) possono aumentare nei neonati il rischio di una condizione grave chiamata Ipertensione Polmonare Persistente del Neonato (IPPN), rendendo la respirazione del bambino più veloce e facendolo apparire bluastro. Questi sintomi di solito iniziano nelle prime 24 ore dopo la nascita del bambino. Se questo accade al suo bambino, deve contattare immediatamente la sua ostetrica e/o il suo medico.

Se sta prendendo questo medicinale durante la gravidanza, oltre a disturbi del respiro il suo bambino potrebbe presentare alla nascita altri sintomi quali problemi nell’alimentazione,. Se subito dopo la nascita il suo bambino ha questi sintomi e lei è preoccupata, contatti il medico e/o l’ostetrica che la consiglieranno.

Venlafaxina Ranbaxy Generici è escreto nel latte materno. Esiste un rischio di un effetto sul bambino. Pertanto, deve discuterne con il medico, che deciderà se interrompere l’allattamento al seno o la terapia con questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non guidi e non usi strumenti o macchinari finché non capisce quali effetti ha su di lei questo medicinale.

Venlafaxina Ranbaxy Generici 150 mg capsule a rilascio prolungato contiene il colorante rosso allura (E129) e giallo tramonto (E110) che possono causare reazioni allergiche.

## **3. Come prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

La dose iniziale abituale raccomandata per il trattamento della depressione, del disturbo d’ansia generalizzata e del disturbo d’ansia sociale è 75 mg al giorno. Il medico può

aumentare la dose gradualmente e, se necessario, fino anche a una dose massima di 375 mg al giorno per la depressione. Se è in trattamento per il disturbo da panico, il medico inizierà con una dose inferiore (37,5 mg) e successivamente aumenterà la dose gradualmente. La dose massima per il disturbo d'ansia generalizzata, il disturbo d'ansia sociale e il disturbo da panico è 225 mg al giorno.

Prenda Venlafaxina Ranbaxy Generici circa alla stessa ora ogni giorno, al mattino o alla sera. Le capsule devono essere ingerite intere con un liquido e non devono essere aperte, rotte, masticate né sciolte.

Deve prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici con il cibo.

Se ha problemi al fegato o ai reni, ne parli con il medico, poiché la dose del suo medicinale deve essere diversa.

Non interrompa il trattamento con questo medicinale senza aver consultato il medico (vedere paragrafo "Se interrompe il trattamento con Venlafaxina Ranbaxy Generici").

### **Se prende più Venlafaxina Ranbaxy Generici di quanto deve**

Contatti immediatamente il medico o il farmacista se assume più della quantità di Venlafaxina Ranbaxy Generici che le è stata prescritta dal medico.

I sintomi di un possibile sovradosaggio possono comprendere un aumento del battito cardiaco, alterazioni dei livelli di vigilanza (che vanno dalla sonnolenza al coma), visione annebbiata, crisi convulsive o attacchi epilettici e vomito.

### **Se dimentica di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici**

Se dimentica una dose, la prenda non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi il momento della dose successiva, salti la dose dimenticata e prenda una dose singola come al solito. Non prenda in un giorno più della dose giornaliera di Venlafaxina Ranbaxy Generici che le è stata prescritta.

### **Se interrompe il trattamento con Venlafaxina Ranbaxy Generici**

Non smetta di prendere il trattamento o non riduca la dose senza il consiglio del suo medico anche se si sente meglio. Se il suo medico pensa che non le serve più Venlafaxina Ranbaxy Generici, le può chiedere di ridurre lentamente la dose prima di sospendere il trattamento. È noto che possono comparire degli effetti indesiderati quando il paziente smette di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici, specialmente se viene sospesa improvvisamente o se la dose viene ridotta troppo rapidamente. Alcuni pazienti possono presentare sintomi come stanchezza, capogiri, confusione della mente, mal di testa, insonnia, incubi, bocca secca, perdita dell'appetito, nausea, diarrea, nervosismo, agitazione, confusione, ronzii nelle orecchie, formicolii o raramente sensazione di shock elettrico, debolezza, sudorazione, convulsioni o sintomi di tipo influenzale.

Il suo medico le consiglierà come deve sospendere gradualmente il trattamento con Venlafaxina Ranbaxy Generici. Se compare uno qualunque di questi o altri sintomi che sono fastidiosi, chieda ulteriori consigli al suo medico.

Se ha qualsiasi ulteriore dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al suo medico o al farmacista.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica uno qualsiasi degli effetti di seguito riportati, non prenda altro Venlafaxina Ranbaxy Generici. **Si rivolga immediatamente al medico, o si rechi al pronto soccorso dell'ospedale più vicino:**

##### **Non comune (può colpire fino a 1 persona su 100)**

- Gonfiore del viso, della bocca, della lingua, della gola, delle mani o dei piedi e/o esantema pruriginoso (orticaria), problemi a deglutire o respirare.

##### **Frequenza non nota (non può essere definite sulla base dei dati disponibili)**

- Senso di costrizione al torace, respiro affannoso, difficoltà a deglutire o a respirare.
- Grave eruzione cutanea, prurito o orticaria (macchie rigonfie di cute rossa o pallida che spesso prudono).
- Segni e sintomi di sindrome serotoninergica che possono includere agitazione, allucinazioni, perdita di coordinazione, battito cardiaco accelerato, aumento della temperatura corporea, rapidi cambiamenti della pressione sanguigna, riflessi iperattivi, diarrea, coma, nausea, vomito. Nella sua forma più grave la sindrome serotoninergica può assomigliare alla sindrome neurolettica maligna (SNM). Segni e sintomi della SNM possono includere una combinazione di febbre, battito cardiaco accelerato, sudorazione, grave rigidità muscolare, confusione, aumento degli enzimi muscolari (determinato da un esame del sangue).
- Segni di infezione, come temperatura elevata, brividi, tremori, mal di testa, sudorazione, sintomi simil-influenzali. Questo può essere il risultato di un disturbo del sangue che porta ad un aumento del rischio di infezione.
- Eruzione cutanea grave, che può portare a gravi vesciche e desquamazione della pelle.
- Dolore muscolare inspiegabile, dolorabilità o debolezza. Questo può essere un segno di rabdomiolisi.

Altri effetti indesiderati che deve **riferire al medico** comprendono (la frequenza di questi effetti sono inclusi sotto nell'elenco "Altri effetti indesiderati che possono manifestarsi"):

- Tosse, respiro sibilante, fiato corto e temperatura elevata
- Feci scure o sangue nelle feci
- Prurito, ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, o urine scure, che possono essere sintomi di un'infezione del fegato (epatite)
- Problemi al cuore, come battito cardiaco rapido o irregolare, pressione del sangue aumentata
- Problemi agli occhi, come visione annebbiata, pupille dilatate
- Problemi nervosi, come capogiro, formicolio, disordini del movimento (spasmi muscolari o rigidità), crisi convulsive o attacchi epilettici
- Problemi psichiatrici, come iperattività, sentirsi insolitamente sovraeccitati

- Sindrome da astinenza (vedere paragrafo “Come prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici, se interrompe il trattamento con Venlafaxina Ranbaxy Generici”).
- Sanguinamento prolungato - se si taglia o si ferisce, può volerci un po' più di tempo prima che il sangue si fermi.

### **Altri effetti indesiderati che possono manifestarsi**

#### **Molto comune (può colpire più di 1 persona su 10)**

- Capogiro, cefalea
- Nausea, bocca secca
- Sudorazione (inclusa sudorazione notturna)

#### **Comune (può colpire fino a 1 persona su 10)**

- Diminuzione dell'appetito
- Confusione, sensazione di separazione (o distacco) da se stessi, mancanza di orgasmo, diminuzione della libido, nervosismo, insonnia, sogni anormali
- Sonnolenza, tremore, formicolio, aumento del tono muscolare
- Disturbi visivi inclusi visione annebbiata, pupille dilatate, incapacità dell'occhio a mettere automaticamente a fuoco gli oggetti lontani da quelli vicini
- Ronzio nelle orecchie (tinnito)
- Palpitazioni
- Aumento della pressione sanguigna, vampate
- Sbadigli
- Vomito, stitichezza, diarrea
- Aumento della frequenza di urinare, difficoltà nel passaggio dell'urina
- Irregolarità mestruali come aumento del sanguinamento o sanguinamenti irregolari, eiaculazione/orgasmo anormali (nell'uomo), disfunzione erettile (impotenza)
- Debolezza (astenia), affaticamento, brividi
- Aumento del colesterolo

#### **Non comune (può colpire fino a 1 persona su 100)**

- Allucinazione, sensazione di separazione (o distacco) dalla realtà, agitazione, orgasmo anormale (nelle donne), mancanza di sentimenti o emozioni, sensazione di sovraeccitamento, digrignamento dei denti
- Una sensazione di irrequietezza o incapacità a stare seduti o fermi, svenimento, movimenti involontari dei muscoli, compromissione della coordinazione e dell'equilibrio; alterazione del gusto
- Battito cardiaco accelerato; sensazione di capogiro (specialmente quando ci si alza in piedi troppo velocemente)
- Fiato corto
- Sangue nel vomito, feci scure o sangue nelle feci, che possono essere un segno di sanguinamento interno
- Sensibilità alla luce, lividi, eruzione cutanea, perdita anormale dei capelli
- Incapacità ad urinare



- Aumento del peso, perdita del peso

### **Raro (può colpire fino a 1 persona su 1.000)**

- Attacchi epilettici o crisi convulsive
- Incapacità a controllare l'urina
- Iperattività, pensieri frenetici e ridotto bisogno di dormire (mania)

### **Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)**

- Sanguinamento prolungato, che può essere un segno di ridotto numero di piastrine nel sangue, che porta ad un aumentato rischio di lividi e sanguinamenti
- Eccessiva ingestione d'acqua (nota come sindrome SIADH)
- Diminuzione dei livelli di sodio nel sangue
- Ideazione e comportamento suicidari
- Sono stati riferiti casi di ideazione e comportamento suicidari durante la terapia con venlafaxina o subito dopo l'interruzione del trattamento (vedere paragrafo 2 Cosa deve sapere prima di prendere Venlafaxina Ranbaxy Generici)
- Disorientamento e confusione spesso accompagnata da allucinazioni (delirio), aggressività
- Rigidità, spasmi e movimenti involontari dei muscoli
- Grave dolore all'occhio e visione ridotta o annebbiata
- Vertigini
- Abbassamento della pressione sanguigna, battito cardiaco anormale, rapido o irregolare, che può portare allo svenimento, sanguinamento inatteso, ad esempio gengive sanguinate, sangue nelle urine e nel vomito o comparsa di lividi inattesi o rottura dei vasi sanguigni (rottura delle vene)
- Tosse, affanno, fiato corto e temperatura elevata che sono sintomi di infiammazione dei polmoni associata ad un aumento dei globuli bianchi (eosinofilia polmonare)
- Dolore addominale grave o dolore alla schiena (che possono indicare un grave problema all'intestino, al fegato o al pancreas)
- Prurito, ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, urine scure o sintomi simil-influenzali che sono sintomi di infiammazione del fegato (epatite), lievi alterazioni dei livelli degli enzimi epatici nel sangue
- Prurito, lieve eruzione cutanea
- Produzione anormale di latte dal seno

Venlafaxina Ranbaxy Generici a volte causa effetti indesiderati dei quali il paziente può non rendersi conto, come aumento della pressione sanguigna o battito cardiaco anormale, lievi alterazioni dei livelli ematici degli enzimi epatici, del sodio o del colesterolo. Più raramente Venlafaxina Ranbaxy Generici può ridurre la funzionalità delle piastrine del sangue, causando un aumento del rischio di lividi o sanguinamenti. Pertanto, il medico può voler farle eseguire occasionalmente degli esami del sangue, in particolare se sta prendendo Venlafaxina Ranbaxy Generici da lungo tempo.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili)  
Segnalando gli effetti indesiderati, lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Venlafaxina Ranbaxy Generici**

**Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Venlafaxina Ranbaxy Generici**

Il principio attivo è venlafaxina cloridrato.

Ogni capsula a rilascio prolungato contiene 84,90 mg di venlafaxina cloridrato equivalenti a 75 mg di venlafaxina.

Ogni capsula a rilascio prolungato contiene 169,80 mg di venlafaxina cloridrato equivalenti a 150 mg di venlafaxina.

Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, povidone, talco, silice colloidale anidra, magnesio stearato, etilcellulosa, copovidone.

### **Venlafaxina Ranbaxy Generici 75 mg capsule a rilascio prolungato**

*Involucro della capsula:* gelatina, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171), inchiostro di stampa (gommalacca, ossido di ferro rosso).

### **Venlafaxina Ranbaxy Generici 150 mg capsule a rilascio prolungato**

*Involucro della capsula:* gelatina, blu brillante FCF (E133), rosso allura AC (E129), giallo tramonto FCF (E110), titanio diossido (E171), inchiostro di stampa (gommalacca, povidone, titanio diossido).

### **Descrizione dell'aspetto di Venlafaxina Ranbaxy Generici e contenuto della confezione**

*Venlafaxina Ranbaxy Generici 75 mg:* capsule di gelatina rigide di colore pesca opaco/pesca opaco, di misura "1" con striscia circolare radiale spessa e sottile in inchiostro rosso sul corpo della capsula e sulla testa. La capsula è riempita con 6 mini compresse di colore bianco-biancastro, rotonde, biconvesse, rivestite con film da 12,5 mg ciascuna.

*Venlafaxina Ranbaxy Generici 150 mg:* capsule di gelatina rigide di colore arancione scuro/arancione scuro opaco, di misura "0" con striscia circolare radiale spessa e sottile in inchiostro bianco sul corpo della capsula e sulla testa. La capsula è riempita con 12 mini compresse di colore bianco-biancastro, rotonde, biconvesse, rivestite con film da 12,5 mg ciascuna.

Venlafaxina Ranbaxy Generici 75 mg: blister da 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 capsule.  
Venlafaxina Ranbaxy Generici 150 mg: blister da 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:**

Ranbaxy Italia S.p.A. Piazza Filippo Meda, 3 – 20121 Milano

**Produttori:**

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary - Irlanda

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201 - D-51377 Leverkusen - Germania

Terapia SA

124 Fabricii Str. 400 632 Cluj-Napoca - Romania

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

Austria: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg Retardkapseln

Germania: VENLAFAXIN BASICS 75 mg Hartkapseln, retardiert

Spagna: VENLAFAXINA RETARD RANBAXYGEN 75 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EFG

Francia : Venlafaxine Ranbaxy LP 75 mg, gélule à libération prolongée

Islanda: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg

Italia: Venlafaxina Ranbaxy Generici

Paesi Bassi: Venlafaxin Ranbaxy 75 mg

Polonia: Venlabax MR

Romania : Venlafaxină Terapia 75 mg capsule cu eliberare prelungită

Svezia : Venlafaxin Ranbaxy 75 mg

Austria: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg Retardkapseln

Germania: VENLAFAXIN BASICS 150 mg Hartkapseln, retardiert

Spagna: VENLAFAXINA RETARD RANBAXYGEN 150 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EFG

Francia: Venlafaxine Ranbaxy LP 150 mg, gélule à libération prolongée

Islanda: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg

Italia: Venlafaxina Ranbaxy Generici

Paesi Bassi: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg

Polonia: Venlabax MR

Romania: Venlafaxină Terapia 150 mg capsule cu eliberare prelungită

Svezia: Venlafaxin Ranbaxy 150 mg

**Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta il:**