

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

**Ramipril Ranbaxy Italia 2,5 mg compresse**  
**Ramipril Ranbaxy Italia 5 mg compresse**  
**Ramipril Ranbaxy Italia 10 mg compresse**

### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Ramipril Ranbaxy Italia e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril Ranbaxy Italia
3. Come prendere Ramipril Ranbaxy Italia
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ramipril Ranbaxy Italia
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### 1. Che cos'è Ramipril Ranbaxy Italia e a che cosa serve

Ramipril Ranbaxy Italia contiene un medicinale chiamato ramipril. Questo appartiene al gruppo di farmaci chiamati ACE-inibitori (Inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensina).

Ramipril Ranbaxy Italia agisce:

- Diminuendo la produzione, da parte del corpo, di sostanze che possono causare un aumento della pressione sanguigna.
- Rilassando e allargando i vasi sanguigni.
- Facilitando il cuore nel pompare il sangue in circolo nel corpo.

Ramipril Ranbaxy Italia può essere usato:

- Per trattare la pressione alta del sangue (ipertensione).
- Per ridurre il rischio di un attacco cardiaco o di un ictus.
- Per ridurre il rischio o ritardare il peggioramento di problemi renali (in presenza o meno di diabete).
- Per trattare il cuore quando non riesce a pompare un sufficiente volume di sangue nel resto del corpo (insufficienza cardiaca).
- Come trattamento dopo un attacco cardiaco (infarto del miocardio) se associato ad insufficienza cardiaca.

## 2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril Ranbaxy Italia

### Non prenda Ramipril Ranbaxy Italia:

- Se è allergico al ramipril, ad altri medicinali ACE-inibitori o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Segni di una reazione allergica possono essere eruzioni cutanee, difficoltà a deglutire o a respirare, gonfiore di labbra, volto, gola o lingua.

- Se ha avuto una reazione allergica grave chiamata “angioedema”. I segni includono prurito, orticaria, macchie rosse sulle mani, sui piedi e in gola, gonfiore della gola e della lingua, gonfiore attorno agli occhi e delle labbra, difficoltà nel respirare e a deglutire.
- Se ha assunto o sta assumendo sacubitril/valsartan, un medicinale usato per trattare un tipo di insufficienza cardiaca a lungo termine (cronica) negli adulti, in quanto ciò aumenta il rischio di angioedema (rapido rigonfiamento sotto la pelle in zone come la gola).
- Se è in dialisi o sta subendo qualche altro tipo di filtrazione del sangue. A seconda del macchinario che viene utilizzato, Ramipril Ranbaxy Italia può non essere adatto per lei. Se ha problemi renali dovuti a insufficiente apporto di sangue ai reni (stenosi dell’arteria renale).
- Durante gli ultimi 6 mesi di gravidanza (vedere paragrafo sotto “Gravidanza, allattamento e fertilità”).
- Se la pressione sanguigna è eccessivamente bassa o instabile. Il medico dovrà fare questa valutazione.
- Se soffre di diabete o la sua funzionalità renale è compromessa ed è in trattamento con un medicinale che abbassa la pressione del sangue, contenente aliskiren.

Non prenda Ramipril Ranbaxy Italia se si verifica una delle condizioni sopra descritte. Se non è sicuro, si rivolga al medico prima di assumere Ramipril Ranbaxy Italia.

### Avvertenze e precauzioni

- Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ramipril Ranbaxy Italia:
- Se ha problemi di cuore, fegato o reni.
- Se ha perso molti sali o fluidi corporei (a causa di uno stato di malessere quale vomito, diarrea, sudorazione eccessiva, o a seguito ad una dieta povera di sale, o per l’assunzione di diuretici per un lungo periodo di tempo o avendo subito una dialisi).
- Se sta per sottoporsi ad un trattamento per ridurre l’allergia alle punture di api o vespe (desensibilizzazione).
- Se sta per ricevere un’anestesia. Questa può essere somministrata per un intervento chirurgico o un intervento ai denti. Può essere necessario interrompere il trattamento con Ramipril Ranbaxy Italia il giorno prima; chiedi consiglio al medico.
- Se ha un elevato quantitativo di potassio nel sangue (evidenziato da un esame del sangue).
- Se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali, il rischio di angioedema può essere aumentato.
- Racecadotril, un medicinale usato per trattare la diarrea.
- Medicinali usati per prevenire il rigetto di organi trapiantati e per trattare il cancro (come temsirolimus, sirolimus, everolimus).
- Vildagliptin, un medicinale usato per trattare il diabete.
- Se ha una patologia del collagene vascolare come sclerodermia o lupus eritematoso sistemico.

- Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza). Ramipril Ranbaxy Italia non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, e può causare grave danno al bambino dopo i primi 3 mesi di gravidanza, vedere paragrafo “Gravidanza, allattamento e fertilità”).
- Se sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
  - un antagonista del recettore dell’angiotensina-II (AIIRA) (anche noti come sartani, per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan), in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete.
  - aliskiren.

Il medico può controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue a intervalli regolari.

Vedere anche quanto riportato al paragrafo "**Non prenda Ramipril Ranbaxy Italia**".

### **Bambini e adolescenti**

L’uso di Ramipril Ranbaxy Italia non è raccomandato in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età poiché la sicurezza e l’efficacia di Ramipril Ranbaxy Italia nei bambini non è stata ancora stabilita.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non è sicuro), chiedi al medico prima di assumere Ramipril Ranbaxy Italia.

### **Altri medicinali e Ramipril Ranbaxy Italia**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Questo perché Ramipril Ranbaxy Italia può influenzare il meccanismo di azione di alcuni altri medicinali. Inoltre alcuni medicinali possono influenzare il meccanismo di azione di Ramipril Ranbaxy Italia.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Questi medicinali possono interferire con Ramipril Ranbaxy Italia alterandone l’azione:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolori ed infiammazioni (ad esempio Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene, indometacina e aspirina)
- Medicinali utilizzati per il trattamento della pressione del sangue bassa, dello shock, dell’insufficienza cardiaca, dell’asma o delle allergie come efedrina, noradrenalina o adrenalina. Il medico deve controllarle la pressione sanguigna.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Questi medicinali, se assunti con Ramipril Ranbaxy Italia, possono aumentare la probabilità che si verifichino effetti indesiderati:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolori ed infiammazioni (ad esempio Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene, indometacina, aspirina)
- Medicinali per la cura del cancro (chemioterapia)
- Medicinali per evitare il rigetto di organi dopo il trapianto, come ciclosporina
- Diuretici come furosemide
- Medicinali che possono aumentare il quantitativo di potassio nel sangue come spironolattone, triamterene, amiloride, sali di potassio ed eparina (usata per rendere il sangue più fluido)
- Trimetoprim e cotrimoxazolo (per infezioni causate da batteri).
- Medicinali steroidei per il trattamento delle infiammazioni come prednisolone

- Allopurinolo (usato per abbassare il contenuto di acido urico nel sangue)
- Procainamide (per i problemi di battito cardiaco)
- Temsirolimus (per il trattamento del cancro)
- Sirolimus, everolimus (per la prevenzione del rigetto dopo trapianto)
- Vildagliptin (usato per il trattamento del diabete di tipo 2)

Il medico potrebbe ritenere necessario modificare la dose e/o prendere altre precauzioni se sta assumendo un antagonista del recettore dell'angiotensina-II (AIIRA) o aliskiren (vedere anche quanto riportato al paragrafo "Non prenda Ramipril Ranbaxy Italia" e "Avvertenze e precauzioni").

- Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Il meccanismo di azione di questi medicinali può essere influenzato da Ramipril Ranbaxy Italia:
  - Medicinali per il diabete come ipoglicemizzanti orali e insulina. Ramipril Ranbaxy Italia può abbassare il quantitativo di zuccheri nel sangue. Controlli attentamente il livello degli zuccheri nel sangue quando assume Ramipril Ranbaxy Italia.
  - Litio (per problemi psichiatrici). Ramipril Ranbaxy Italia può aumentare il quantitativo di litio nel sangue. Il livello di litio nel sangue deve essere controllato attentamente dal medico.
- In particolare, informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere uno qualsiasi dei seguenti medicinali:
  - Integratori del potassio (inclusi sostituti del sale), diuretici risparmiatori del potassio e altri medicinali che potrebbero aumentare la quantità di potassio presente nel sangue (come trimetoprim e cotrimoxazolo per trattare infezioni provocate da batteri; ciclosporina, un medicinale immunosoppressore usato per prevenire il rigetto degli organi trapiantati; ed eparina, un medicinale usato per fluidificare il sangue e prevenire la formazione di coaguli)
  - Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non è sicuro), chiedi al medico prima di assumere Ramipril Ranbaxy Italia.

### **Ramipril Ranbaxy Italia con cibo, bevande e alcool**

Bere bevande alcoliche insieme a Ramipril Ranbaxy Italia può provocare sensazione di vertigini o di stordimento. Se vuole sapere quanto alcool bere quando sta prendendo Ramipril Ranbaxy Italia ne discuta con il medico, poiché i medicinali usati per ridurre la pressione sanguigna e l'alcool possono avere effetti additivi.

Ramipril Ranbaxy Italia può essere preso con o senza cibo.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

#### *Gravidanza*

Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o vi è la possibilità di dare inizio ad una gravidanza).

Non deve prendere Ramipril Ranbaxy Italia nelle prime dodici settimane di gravidanza e non deve assolutamente assumerlo dopo la tredicesima settimana perché il suo utilizzo può essere dannoso per il bambino. Se rimane incinta durante l'assunzione di Ramipril Ranbaxy Italia, informi immediatamente il medico. Prima della pianificazione di una gravidanza deve essere effettuato il passaggio ad un altro trattamento alternativo più adatto.

### *Allattamento*

Non deve prendere Ramipril Ranbaxy Italia se sta allattando.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di assumere qualsiasi medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Può avere sensazione di vertigini, mentre assume Ramipril Ranbaxy Italia. Questo è più probabile quando ha appena iniziato ad assumere Ramipril Ranbaxy Italia o ha appena aumentato la dose. Se ciò accade, non guidare o usare strumenti o macchinari.

### **3. Come prendere Ramipril Ranbaxy Italia**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista.

Se ha dubbi, si rivolga al medico o al farmacista.

### **Quanto ne deve prendere**

#### *Trattamento della pressione del sangue alta*

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico aggiusterà il quantitativo che lei assume finché la pressione sanguigna sarà sotto controllo.
- La dose massima giornaliera è 10 mg.
- Se sta già prendendo dei diuretici, il medico può interromperli o ridurne il quantitativo prima di farle iniziare il trattamento con Ramipril Ranbaxy Italia.

#### *Per ridurre il rischio di un attacco cardiaco o di un ictus*

- La dose iniziale abituale è 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico può decidere di aumentare il dosaggio che assume.
- La dose abituale è 10 mg una volta al giorno.

#### *Trattamento per ridurre o prevenire l'aggravamento di problemi renali*

- Può esserle data per iniziare una dose di 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico adeguerà il quantitativo che sta assumendo.
- La dose abituale è 5 mg o 10 mg una volta al giorno.

#### *Trattamento dell'insufficienza cardiaca*

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg una volta al giorno.
- Il medico adeguerà il quantitativo che assume.
- La dose massima è 10 mg al giorno. È preferibile dividere la dose in due somministrazioni giornaliere.

#### *Trattamento dopo un attacco cardiaco*

- La dose iniziale abituale è da 1,25 mg una volta al giorno a 2,5 mg due volte al giorno.
- Il medico adeguerà il quantitativo che assume.
- La dose abituale è 10 mg al giorno. È preferibile dividere la dose in due somministrazioni giornaliere.

### Anziani

Il medico ridurrà la dose iniziale e adeguerà il trattamento più lentamente.

### Assunzione del medicinale

- Prenda il medicinale per bocca nello stesso momento della giornata, ogni giorno.
- Ingerisca le compresse intere con del liquido.
- Non rompa le compresse e non le mastichi.

### Se prende più Ramipril Ranbaxy Italia di quanto deve

Informi il medico o vada al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non guidi per andare all'ospedale, si faccia accompagnare da qualcuno o chiami un'ambulanza. Porti con sé la scatola del medicinale. Questo perché il medico deve sapere che cosa ha assunto.

### Se dimentica di prendere Ramipril Ranbaxy Italia

- Se dimentica una dose, assuma la sua dose normale, quando è il momento.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

### Smetta di prendere Ramipril Ranbaxy Italia e si rivolga immediatamente al medico se nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati gravi, potrebbe avere bisogno di un trattamento medico urgente:

- Gonfiore di volto, labbra o gola tale da rendere difficoltoso deglutire o respirare, così come prurito o eruzione cutanea. Questo potrebbe essere segno di una reazione allergica grave a Ramipril Ranbaxy Italia.
- Reazioni cutanee gravi che includono eruzione cutanea, ulcere in bocca, peggioramento di una malattia cutanea pre-esistente, arrossamenti, formazione di vesciche e desquamazione della pelle (come Sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica o eritema multiforme).

### Informi il medico immediatamente se manifesta:

- Accelerazione del battito cardiaco, battito cardiaco irregolare o rinforzato (palpitazioni), dolore al torace, sensazione di oppressione al torace, o problemi più gravi che includono attacco cardiaco e ictus.
- Respiro corto o tosse. Questi possono essere segni di problemi polmonari.
- Formazione più facile di lividi, sanguinamento prolungato più del normale, qualsiasi segno di sanguinamento (ad esempio sanguinamento delle gengive), macchie viola sulla pelle o facilitata insorgenza di infezioni, irritazioni della gola e febbre, sensazione di stanchezza, svenimento, capogiri o colorito pallido. Questi possono essere segni di problemi circolatori o del midollo osseo.

- Dolore grave allo stomaco che può estendersi fino alla schiena. Questo può essere un segno di pancreatite (infiammazione del pancreas).
- Febbre, brividi, stanchezza, perdita dell'appetito, dolore allo stomaco, sensazione di malessere, ingiallimento della pelle o degli occhi (ittero). Questi possono essere segni di problemi al fegato come l'epatite (infiammazione del fegato) o danno al fegato.

### **Altri effetti indesiderati includono**

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o permane per un tempo più lungo di qualche giorno:

#### **Comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 10)

- Mal di testa o sensazione di stanchezza
- Sensazione di vertigini. Questo è più probabile che accada quando inizia a prendere Ramipril Ranbaxy Italia o inizia a prendere una dose più alta
- Svenimento, ipotensione (pressione del sangue insolitamente bassa), specialmente quando si è in piedi o ci si alza rapidamente
- Tosse secca stizzosa, infiammazione dei seni nasali (sinusite) o bronchite, fiato corto
- Dolore allo stomaco o all'intestino, diarrea, indigestione, sensazione di malessere o stato di malessere
- Eruzione cutanea con o senza rigonfiamenti
- Dolori al torace
- Crampi o dolori muscolari
- Esami del sangue che mostrano un livello di potassio più alto del normale

#### **Non comuni** (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Problemi di equilibrio (vertigini)
- Prurito e sensazioni insolite alla pelle come intorpidimento, formicolio, bruciore, sensazione di punture o di sfregamento (parestesia)
- Perdita o cambiamento del gusto
- Problemi di sonno
- Umore depresso, ansia, maggiore nervosismo rispetto al solito o irritabilità
- Naso chiuso, difficoltà respiratorie o peggioramento dell'asma
- Gonfiore all'intestino chiamato "angioedema intestinale" e che si presenta con sintomi come dolore addominale, vomito e diarrea
- Bruciore allo stomaco, stitichezza o secchezza della bocca
- Aumento della quantità di urina durante la giornata
- Maggiore sudorazione rispetto al solito
- Perdita o diminuzione dell'appetito (anoressia)
- Battito cardiaco accelerato o irregolare
- Braccia e gambe gonfie. Questo può essere il segno che il corpo sta trattenendo più acqua del solito
- Vampate
- Visione offuscata
- Dolore alle articolazioni
- Febbre

- Impotenza nel maschio, ridotto desiderio sessuale in uomini e donne
- Aumento nel numero dei globuli bianchi del sangue (eosinofilia) riscontrato durante gli esami del sangue
- Alterazioni della funzionalità di fegato, pancreas o reni evidenziate dalle analisi del sangue.

**Rari** (possono interessare fino a 1 persona su 1000)

- Sensazione di mancamento o confusione
- Lingua gonfia ed arrossata
- Grave sfaldamento o desquamazione della pelle, prurito, eruzione cutanea caratterizzata da pustole
- Problemi alle unghie (come perdita o separazione dell'unghia dalla sua sede)
- Eruzione cutanea o lividi
- Macchie sulla pelle ed estremità fredde
- Occhi arrossati, gonfi o acquosi o con prurito
- Disturbi dell'udito e tintinnio nell'orecchio
- Sensazione di debolezza
- Diminuzione nel numero dei globuli rossi, bianchi e delle piastrine del sangue o della concentrazione dell'emoglobina, evidenziato dagli esami del sangue.

**Molto rari** (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Maggiore sensibilizzazione al sole.

**Non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Urina concentrata (di colore scuro)
- Sensazione di malessere o malessere
- Crampi muscolari
- Confusione e convulsioni che possono essere dovuti a inappropriata secrezione di ADH (*antidiuretic hormone* [ormone antidiuretico]).

Se manifesta questi sintomi, contatti tempestivamente il medico.

**Altri effetti indesiderati riportati:**

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o permane per un tempo più lungo di qualche giorno.

- Difficoltà di concentrazione
- Gonfiore alla bocca
- Esami del sangue che mostrano un numero troppo basso di cellule del sangue
- Esami del sangue che mostrano un basso livello del sodio nel sangue
- Dita delle mani e dei piedi che cambiano colore quando si raffreddano e che formicolano o fanno male quando vengono riscaldate (fenomeno di Raynaud)
- Aumento del volume del seno negli uomini
- Reazioni rallentate o alterate
- Sensazione di bruciore
- Cambiamento della percezione degli odori
- Perdita dei capelli.



### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Ramipril Ranbaxy Italia**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sul blister dopo "Scad." La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene Ramipril Ranbaxy Italia**

- Il principio attivo è ramipril.
- Ogni compressa contiene 2,5 mg di ramipril.
- Ogni compressa contiene 5 mg di ramipril
- Ogni compressa contiene 10 mg di ramipril
- Gli altri componenti sono: ipromellosa, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato (mais), ferro ossido giallo (nel 5 e 10 mg) (E172), ferro ossido rosso (nel 2,5 mg) (E172), sodio stearil fumarato.

#### **Descrizione dell'aspetto di Ramipril Ranbaxy Italia e contenuto della confezione**

- Ramipril Ranbaxy Italia 2,5 mg sono compresse di colore da rosa a rosso screziato, 8,1x4,1x3,1 mm, oblunghe con R e 18 su entrambi i lati della linea di incisione su un lato e linea di incisione sull'altro lato.  
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
- Ramipril Ranbaxy Italia 5 mg sono compresse di colore da giallo a giallo screziato, 8,1x4,1x3,15 mm, oblunghe con R e 19 su entrambi i lati della linea di incisione su un lato e linea di incisione sull'altro lato.  
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
- Ramipril Ranbaxy Italia 10 mg sono compresse di colore da giallo a giallo screziato, 12,1x6,0x3,75 mm, oblunghe con R e 20 su entrambi i lati della linea di incisione su un lato e linea di incisione sull'altro lato.  
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Ramipril Ranbaxy Italia è dispensato in:

blister saldato a freddo (OPA/Al/PVC/Al) e in blister saldato a freddo con essiccante incorporato (OPA/Al/PE/essiccante/HDPE/Al).

Confezioni da:

Ramipril Ranbaxy Italia 2,5 mg: 28, 30, 90, 100 compresse.

Ramipril Ranbaxy Italia 5 mg: 14, 28, 30, 90, 100 compresse.

Ramipril Ranbaxy Italia 10 mg: 28, 30, 90 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Ranbaxy Italia S.p.A. Piazza Filippo Meda, 3 – 20121 Milano

**Produttori**

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 - Hooddorp 2132 JH – Paesi Bassi

Terapia S.A. 124 Fabricii Str. - 400 632 Cluj-Napoca - Romania

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

Francia: Ramipril RPG 2,5 mg, comprimé sécable/Ramipril RPG 2,5 mg, comprimé sécable/Ramipril RPG 5 mg, comprimé sécable/Ramipril RPG 10 mg, comprimé sécable

Spagna: Ramipril Ranbaxy 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG/Ramipril Ranbaxy 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Italia: Ramipril Ranbaxy Italia

Lituania: Ramipril Ranbaxy 5 mg tabletės/Ramipril Ranbaxy 10 mg tabletės

Polonia: Ramicor

Romania: Ramiran 2,5 mg comprimate/ Ramiran 5 mg comprimate/Ramiran 10 mg comprimate

Svezia: Ramipril Ranbaxy 2,5 mg tableter/Ramipril Ranbaxy 5 mg tableter

**Questo foglio è stato approvato l'ultima volta il:**