

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 2,5 mg + 12,5 mg compresse Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 5 mg + 25 mg compresse

#### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy
3. Come prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Che cos'è Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy e a che cosa serve

Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy è una associazione di due medicinali chiamati ramipril e idroclorotiazide.

Il ramipril appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "ACE-inibitori" (Inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensina). Esso agisce:

- Diminuendo la produzione, da parte del suo corpo, di sostanze che possono causare un aumento della pressione sanguigna.
- Rilassando e allargando i suoi vasi sanguigni.
- Facilitando il suo cuore nel pompare il sangue in circolo nel corpo.

L'idroclorotiazide appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "diuretici tiazidici" o diuretici orali. Esso agisce aumentando la quantità di acqua (urina) che viene prodotta. Questo abbassa la sua pressione sanguigna.

Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy è usato per trattare la pressione alta del sangue (ipertensione). I due principi attivi agiscono insieme per abbassare la sua pressione sanguigna. Essi vengono usati in associazione quando il trattamento con un componente da solo non funziona.

## 2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril e Idroclorotiazide

### Ranbaxy

#### Non prenda Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy:

- Se è allergico al ramipril, all'idroclorotiazide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se è allergico (ipersensibile) a medicinali simili a Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy (altri ACE-inibitori o medicinali derivati della sulfonamide). Segni di una reazione allergica possono essere eruzione cutanea, difficoltà ad inghiottire o a respirare, gonfiore di labbra, viso, gola o lingua.
- Se ha mai avuto una reazione allergica grave chiamata "angioedema". Questi segni includono prurito, eruzioni cutanee (orticaria), macchie rosse sulle mani, sui piedi e in gola, gonfiore di gola e lingua, gonfiore attorno agli occhi e delle labbra, difficoltà nel respirare e ad ingoiare.
- Se è in dialisi o sta subendo qualche altro tipo di filtrazione del sangue. A seconda del macchinario che viene utilizzato, Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può non essere adatto a lei.
- Se ha gravi problemi di fegato.
- Se ha livelli anormali di sali (calcio, potassio, sodio) nel sangue.
- Se ha problemi renali dovuti ad insufficiente apporto di sangue al rene (stenosi dell'arteria renale).
- Durante gli **ultimi 6 mesi di gravidanza** (vedere paragrafo sotto "Gravidanza e allattamento").
- Se sta allattando (vedere paragrafo sotto "Gravidanza e allattamento").
- Se soffre di diabete o la sua funzionalità renale è compromessa ed è in trattamento con un medicinale che abbassa la pressione del sangue, contenente aliskiren.

**Non assuma Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy se si verifica una delle condizioni sopra descritte.** Se ha dubbi, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.

#### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy:

- Se ha problemi al cuore, al fegato o ai reni.
- Se ha perso molti sali o fluidi corporei (a causa di uno stato di malessere quale vomito, diarrea, sudorazione eccessiva, o in seguito ad una dieta povera di sale, o per l'assunzione di diuretici per un lungo periodo di tempo o avendo subito una dialisi).
- Se sta per sottoporsi ad un trattamento per ridurre l'allergia alle punture di api o vespe (desensibilizzazione).
- Se sta per subire un'anestesia che può essere somministrata per un intervento chirurgico o un intervento ai denti. Può essere necessario interrompere il trattamento con Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy il giorno prima, chiedi consiglio al medico.
- Se ha un elevato quantitativo di potassio nel sangue (evidenziato da un esame del sangue).

- Se sta assumendo medicinali o si trova in condizioni tali che i livelli di sodio nel sangue possono diminuire. Il medico può prescrivere degli esami del sangue a intervalli regolari, in particolare per controllare i livelli di sodio nel sangue, soprattutto se lei è anziano.
- Se sta assumendo dei medicinali chiamati Inibitori di mTOR (ad esempio temsirolimus, everolimus, sirolimus) o vildagliptin, questi possono aumentare il rischio di angioedema, una grave reazione allergica.
- Se ha un calo della vista o dolore agli occhi, soprattutto se è a rischio di sviluppare una condizione chiamata glaucoma o di avere un'allergia ai medicinali che contengono penicillina o sulfonamide.
- Se soffre di una patologia del collagene vascolare come sclerodermia o lupus eritematoso sistemico.
- Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se sospetta di essere in stato di gravidanza). Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy non è raccomandato nei primi 3 mesi di gravidanza e può causare grave danno al bambino dopo i primi tre mesi di gravidanza (vedere sotto paragrafo "Gravidanza e allattamento").
- Se sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
  - un "antagonista del recettore dell'angiotensina-II" (AIIRA) (anche noti come sartani per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan), in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete.
  - aliskiren.

Il medico può controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue, e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue a intervalli regolari.

Vedere anche quanto riportato alla voce "**Non prenda Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**".

### **Bambini e adolescenti**

Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Questo perché il medicinale non è mai stato utilizzato in questa fascia di età.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte o non è sicuro, si rivolga al medico prima di assumere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.

### **Altri medicinali e Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può influenzare il meccanismo di azione di alcuni altri medicinali. Inoltre, alcuni medicinali possono influenzare il meccanismo di azione di Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.

Informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Essi possono alterare l'azione di Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolore e infiammazione (ad esempio Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene o indometacina e aspirina).
- Medicinali utilizzati per il trattamento della pressione del sangue bassa, dello shock, dell'insufficienza cardiaca, dell'asma o delle allergie come efedrina, noradrenalina o adrenalina. Il medico dovrà controllare la sua pressione sanguigna.

Informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Questi medicinali, se assunti con Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy, possono aumentare la probabilità che si verifichino effetti indesiderati:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolore e infiammazione (ad esempio Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene o indometacina e aspirina).
- Medicinali che possono abbassare la quantità di potassio nel sangue. Questi includono medicinali per la stitichezza, diuretici, amfotericina B (usata nelle infezioni da funghi) e ormone adrenocorticotropo (usato per verificare se le sue ghiandole surrenali funzionano correttamente).
- Medicinali per la cura del cancro (chemioterapia).
- Medicinali per problemi di cuore, inclusi i problemi del battito cardiaco.
- Medicinali per evitare il rigetto di organi dopo il trapianto, come ad esempio la ciclosporina.
- Diuretici come la furosemide.
- Medicinali che possono aumentare il quantitativo di potassio nel sangue come spironolattone, triamterene, amiloride, sali di potassio ed eparina (usata per rendere il sangue più fluido).
- Medicinali steroidei per il trattamento delle infiammazioni come prednisolone.
- Integratori di calcio.
- Allopurinolo (usato per abbassare il contenuto di acido urico nel sangue).
- Procainamide (per i problemi del battito cardiaco).
- Colestiramina (per ridurre la quantità di grassi nel sangue).
- Carbamazepina (per il trattamento dell'epilessia).
- Eparina (usata per fluidificare il sangue).
- Temsirolimus (per il cancro).
- Sirolimus, everolimus (per prevenire il rigetto dopo un trapianto).
- Vidagliptin (usato per trattare il diabete di tipo 2).
- Trimetoprim e cotrimoxazolo (per infezioni causate da batteri).

Il medico può ritenere necessario modificare la dose e/o prendere altre precauzioni:

- Se sta assumendo un antagonista del recettore dell'angiotensina-II (AIIRA) o aliskiren (vedere anche quanto riportato alla voce "**Non prenda Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**" e "**Avvertenze e precauzioni**").

Informi il medico se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Essi possono essere influenzati da Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy:

- Medicinali per il diabete come gli ipoglicemizzanti orali e l'insulina. Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può abbassare il quantitativo di zuccheri nel sangue. Controlli attentamente il livello degli zuccheri nel sangue quando assume Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.

- Litio (per problemi psichiatrici). Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può aumentare il quantitativo di litio nel sangue. Il livello di litio nel sangue deve essere controllato attentamente dal medico.
- Medicinali miorilassanti.
- Chinina (per il trattamento della malaria).
- Medicinali che contengono iodio, questi possono essere usati in ospedale prima di un esame ai raggi X o a scansione.
- Penicillina (per il trattamento delle infezioni).
- Medicinali che rendono fluido il sangue da assumere per via orale (anticoagulanti orali) come warfarin.

Se una delle condizioni sopra descritte la riguarda (o non è sicuro), si rivolga al medico prima di assumere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.

### **Esami di laboratorio**

Informi il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale:

- Se sta facendo un esame per la funzionalità della paratiroide. Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può alterare i risultati dell'esame.
- Per chi svolge attività sportiva: l'uso del medicinale senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.

### **Assunzione di Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy con cibi e alcool**

- Bere bevande alcoliche insieme a Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può provocare sensazione di vertigini o di stordimento. Se vuole sapere quanto alcool bere quando sta prendendo Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy, ne discuta con il medico poiché l'alcool aumenta gli effetti dei medicinali utilizzati per abbassare la pressione sanguigna.
- L'assunzione di Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può avvenire con o senza cibo.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy nelle prime 12 settimane di gravidanza e non deve assolutamente assumerlo dopo la 13<sup>a</sup> settimana perché il suo utilizzo può essere dannoso per il bambino.

Se rimane incinta durante la terapia con Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy, informi immediatamente il medico. Prima della pianificazione di una gravidanza deve essere effettuato il passaggio ad un adatto medicinale alternativo.

Non deve prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy se sta allattando con latte materno.

Chiedi al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Può avere sensazioni di vertigini, mentre assume Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy. Questo è più probabile che accada quando ha appena iniziato ad assumere Ramipril e Idroclorotiazide

Ranbaxy o ha appena aumentato la dose. Se accade ciò, non guidi o usi strumenti o macchinari.

### **3. Come prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**

Prenda sempre Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

#### **Quanto medicinale assumere**

##### *Trattamento della pressione alta*

Il medico aggiusterà il quantitativo che lei assume fino a quando la sua pressione sanguigna sarà sotto controllo.

##### *Anziani*

Il medico ridurrà la dose iniziale e adeguerà il trattamento più lentamente.

- **Via e modo di somministrazione** Prenda questo medicinale per bocca alla stessa ora della giornata, ogni giorno, di solito al mattino.
- Ingoi le compresse con del liquido.
- Non frantumi e non mastichi le compresse.
- Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 2,5 mg + 12,5 mg compresse: la linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.
- Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 5 mg + 25 mg compresse: la compressa può essere divisa in due dosi uguali.

#### **Se prende più Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy di quanto deve**

Informi il medico o vada al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non guidi per andare all'ospedale, si faccia accompagnare da qualcuno o chiami l'ambulanza. Porti con sé la scatola del medicinale. Questo perché il medico deve sapere che cosa ha assunto.

#### **Se dimentica di prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**

- Se dimentica una dose, assuma la sua dose normale, quando è il momento.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Smetta di prendere Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy e si rivolga immediatamente al medico se nota la comparsa di un qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati gravi, può aver bisogno di un trattamento medico urgente:**

- Gonfiore di viso, labbra o gola tale da rendere difficoltoso deglutire o respirare, così come prurito o eruzione cutanea. Questo può essere segno di una reazione allergica grave a Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy.
- Reazioni cutanee gravi che includono eruzione cutanea, ulcere in bocca, peggioramento di una patologia cutanea pre-esistente, arrossamenti, formazione di vesciche e desquamazione della pelle (come Sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica o eritema multiforme).

**Informi il medico immediatamente se manifesta:**

- Accelerazione del battito cardiaco, battito cardiaco irregolare o rinforzato (palpitazioni), dolore toracico, sensazione di oppressione al petto, o problemi più gravi che includono attacco cardiaco e ictus.
- Fiato corto, tosse, febbre che perdura da 2 a 3 giorni e minor sensazione di fame. Questi possono essere segni di problemi polmonari, compresa l'infezione.
- Formazione più facile di lividi, sanguinamento prolungato più del normale, qualsiasi segno di sanguinamento (ad esempio sanguinamento delle gengive) macchie viola sulla pelle o più facile insorgenza di infezioni rispetto al solito, irritazioni della gola e febbre, sensazione di stanchezza, debolezza, capogiri o colorito pallido. Questi possono essere segni di problemi circolatori o del midollo osseo.
- Dolore allo stomaco grave che può estendersi fino alla schiena. Questo può essere un segno di pancreatite (infiammazione del pancreas).
- Febbre, brividi, stanchezza, perdita dell'appetito, dolore allo stomaco, sensazione di malessere, ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi (ittero). Questi possono essere segni di problemi al fegato come l'epatite (infiammazione del fegato) o danno al fegato.

**Altri effetti indesiderati includono:**

**Informi il medico se una delle seguenti condizioni diventa grave o dura per un periodo di tempo più lungo di qualche giorno:**

**Comune** (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Mal di testa o sensazione di debolezza o stanchezza.
- Sensazione di vertigini. Questo è più probabile che accada quando la terapia con Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy è appena iniziata o ha appena aumentato la dose.
- Tosse secca stizzosa o bronchite.
- Esami del sangue che mostrano un livello di zuccheri più elevato del normale. Se soffre di diabete, questo può peggiorare.
- Esami del sangue che mostrano un livello di acido urico o di grassi più elevato del normale.
- Articolazioni dolorose, arrossate e gonfie.

**Non comune** (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Eruzione cutanea con o senza rigonfiamenti.
- Vampate di calore, debolezza, ipotensione (pressione sanguigna insolitamente bassa), specialmente quando si sta in piedi o ci si alza rapidamente.

- Problemi di equilibrio (vertigini).
- Prurito e sensazioni insolite alla pelle come intorpidimento, formicolio, bruciore, sensazione di punture o di sfregamento (parestesia).
- Perdita o alterazione del gusto.
- Problemi di sonno.
- Umore depresso, ansia, più nervosismo rispetto al solito o irritabilità.
- Naso chiuso, infiammazione dei seni nasali (sinusite), fiato corto.
- Infiammazione delle gengive (gengiviti), gonfiore della bocca.
- Occhi arrossati, gonfi, umidi o con prurito.
- Ronzii alle orecchie.
- Visione annebbiata.
- Perdita di capelli.
- Dolore al torace.
- Dolore ai muscoli.
- Stitichezza, dolore allo stomaco o all'intestino.
- Indigestione o sensazione di malessere.
- Aumento della quantità di urina durante la giornata.
- Maggiore sudorazione o sensazione di sete rispetto al solito.
- Perdita o diminuzione dell'appetito (anoressia), minore sensazione di fame.
- Battito cardiaco accelerato o irregolare.
- Braccia e gambe gonfie. Questo può essere il segno che il corpo sta trattenendo più acqua del solito.
- Febbre.
- Impotenza nel maschio.
- Diminuzione nel numero dei globuli rossi, bianchi e delle piastrine del sangue o della concentrazione dell'emoglobina, evidenziato da esami del sangue.
- Esami del sangue che mostrano alterazione della funzionalità di fegato, pancreas o reni.
- Esami del sangue che mostrano un livello di potassio inferiore al normale.

**Molto Raro** (può interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Sensazione di malessere, che provoca diarrea o bruciore di stomaco.
- Lingua gonfia ed arrossata o bocca secca.
- Esami del sangue che mostrano un livello di potassio più elevato del normale.

**Non nota** (la frequenza non può essere stabilita dai dati disponibili)

- Urina concentrata (di colore scuro), sensazione di malessere o malessere, crampi muscolari, confusione e convulsioni che possono essere dovuti a inappropriata secrezione di ADH (anti-diuretic hormone [ormone antidiuretico]). Se manifesta questi sintomi, contatti tempestivamente il medico.

**Altri effetti indesiderati riportati:**

Informi il medico se una qualsiasi delle seguenti condizioni diventa grave o dura per un periodo di tempo più lungo di qualche giorno.

- Difficoltà di concentrazione, sensazione di agitazione o confusione.



- Dita delle mani e dei piedi che cambiano colore quando si raffreddano e che formicolano o fanno male quando vengono riscaldate. Questo può essere il fenomeno di Raynaud.
- Aumento del volume del seno negli uomini.
- Coaguli nel sangue.
- Disturbi dell'udito.
- Occhi meno umidi del normale.
- Gli oggetti appaiono di colore giallo.
- Disidratazione.
- Gonfiore, dolore e pallore delle guance (infiammazione di una ghiandola salivare).
- Gonfiore dell'intestino chiamato "angioedema intestinale" e che si presenta con sintomi come dolore addominale, vomito e diarrea.
- Maggiore sensibilità alla luce solare.
- Grave sfaldamento o desquamazione della pelle, prurito, eruzione cutanea o altre reazioni della pelle come arrossamenti del viso o della fronte.
- Eruzione cutanea o lividi.
- Macchie sulla pelle ed estremità fredde.
- Problemi alle unghie (come perdita o separazione dell'unghia dalla sua sede).
- Rigidità muscoloscheletrica o incapacità a muovere la mascella (tetano).
- Debolezza o crampi muscolari.
- Riduzione del desiderio sessuale nell'uomo e nella donna.
- Presenza di sangue nelle urine. Questo può essere un segno di un problema renale (nefrite interstiziale).
- Maggiore quantità di zucchero nelle urine rispetto al normale.
- Aumento nel numero delle cellule bianche nel sangue (eosinofilia) riscontrato dagli esami del sangue.
- Esami del sangue che mostrano un numero troppo basso di cellule del sangue (pancitopenia).
- Esami del sangue che mostrano un cambiamento del livello dei sali come sodio, calcio, magnesio e cloro nel sangue.
- Reazioni rallentate o alterate.
- Modifica nella percezione degli odori.
- Difficoltà a respirare o peggioramento dell'asma.
- Forte dolore agli occhi, offuscamento della vista o visione con aloni di luce, mal di testa, lacrimazione abbondante o nausea e vomito che possono essere segni di una condizione chiamata glaucoma.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

[www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili)

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**

Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy**

#### ***Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 2,5 mg + 12,5 mg compresse:***

I principi attivi sono ramipril e idroclorotiazide.

Ogni compressa contiene 2,5 mg di ramipril e 12,5 mg di idroclorotiazide.

- Gli altri componenti sono: ipromellosa, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, sodio stearilfumarato.

#### ***Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 5 mg + 25 mg compresse:***

- I principi attivi sono ramipril e idroclorotiazide.

Ogni compressa contiene 5 mg di ramipril e 25 mg di idroclorotiazide.

Gli altri componenti sono: ipromellosa, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, sodio stearilfumarato.

### **Descrizione dell'aspetto di Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy e contenuto della confezione**

*Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 2,5 mg + 12,5 mg compresse:* compresse di colore bianco-biancastro, a forma di compressa oblunga, con impresso "R" e "21" su entrambi i lati della linea d'incisione su di un lato e linea d'incisione sull'altro lato.

La linea d'incisione non è concepita per rompere la compressa.

*Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy 5 mg + 25 mg compresse:* compresse di colore bianco-biancastro, a forma di compressa oblunga, con impresso "R" e "22" su entrambi i lati della linea d'incisione su di un lato e linea d'incisione sull'altro lato.

La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Ramipril e Idroclorotiazide Ranbaxy è disponibile in confezioni da 14, 20, 28, 50 e 100 compresse in blister saldato a freddo con essiccante incorporato (OPA/Al/PE/HDPE/Al) e in triplo blister (PVC/PE/PVDC/Al).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Ranbaxy Italia S.p.A. Piazza Filippo Meda, 3 – 20121 Milano

### **Rilascio dei lotti**

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irlanda

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, Germania

Terapia SA

124 Fabricii Str. 400 632 Cluj-Napoca, Romania

**Questo foglio illustrativo è stato approvato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco