

PRIMA DELL'USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista;
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

Osangin 0,250 mg compresse orosolubili

Dequalinio cloruro

Come si presenta

Osangin 0,250 mg compresse orosolubili si presenta sotto forma di compresse da sciogliere in bocca. Il contenuto della confezione è di 20 compresse.

Che cosa è

Osangin 0,250 mg compresse orosolubili è un disinfettante per uso locale della bocca e della gola.

Perchè si usa

Osangin 0,250 mg compresse orosolubili è indicato nel trattamento delle infezioni della bocca e della gola.

Quando non deve essere usato

Nei casi di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Nei bambini al di sotto dei 6 anni. Se vi è stato detto dal vostro medico che avete una intolleranza ad alcuni zuccheri (sorbitolo), consultatelo prima di assumere questo medicinale.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Sebbene non siano note controindicazioni all'uso durante la gravidanza e l'allattamento, tuttavia devono essere osservate le normali precauzioni riguardo l'uso dei farmaci durante la gravidanza e l'allattamento.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Evitare l'uso contemporaneo con altri disinfettanti della bocca e della gola.

E' importante sapere che

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

Come usare questo medicinale

Salvo diversa prescrizione medica, una compressa ogni 3-4 ore, lasciandola sciogliere molto lentamente in bocca, onde assicurare una ottimale disinfezione del cavo orale.

Le compresse di *Osangin 0,250 mg compresse orosolubili* non contengono sodio né zucchero e possono pertanto essere somministrate a pazienti diabetici, ipertesi o in dieta ipocalorica.

Per l'assenza di zucchero *Osangin 0,250 mg compresse orosolubili* non favorisce la carie.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di medicinale, avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

L'impiego prolungato di prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; ove ciò si verichi occorre sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista. E'

importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Richiedere o compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

Attenzione, non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Se si notano segni visibili di deterioramento della confezione, rivolgersi al farmacista.

Nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Composizione

Una compressa contiene: principio attivo: **dequalinio cloruro** 0,250 mg; eccipienti: sorbitolo, talco, magnesio stearato, essenza di menta.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Marco Antonetto Farmaceutici SpA - Via Arsenale 29 - Torino - I

Produttore e controllore finale

Marco Antonetto Farmaceutici SpA - Via Arsenale 29 - Torino - I

Ultima data di revisione del foglio illustrativo: giugno 2007