

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

**Lorazepam Accord 1 mg compresse rivestite con film**  
**Lorazepam Accord 2,5 mg compresse rivestite con film**

### **Medicinale Equivalente**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Lorazepam Accord e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lorazepam Accord
3. Come prendere Lorazepam Accord
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lorazepam Accord
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Lorazepam Accord e a che cosa serve**

Lorazepam Accord contiene il principio attivo lorazepam che appartiene ad un gruppo di medicinali detti benzodiazepine.

Le benzodiazepine sono utilizzate per alleviare gli stati di ansia gravi, che sottopongono il soggetto a grave disagio e ne limitano la normale attività.

Questo medicinale è indicato:

- per trattare l'ansia, la tensione ed altri disturbi associati all'ansia;
- per trattare i disturbi del sonno (insonnia).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Lorazepam Accord**

##### **Non prenda Lorazepam Accord**

- se è allergico al lorazepam, ad altri medicinali simili (benzodiazepine) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di miastenia gravis, una malattia che provoca indebolimento muscolare e stanchezza;
- se ha gravi problemi a respirare (insufficienza respiratoria);
- se ha gravi problemi al fegato (insufficienza epatica);
- se ha problemi a respirare durante il sonno (apnea notturna);
- se ha la pressione dell'occhio alta a causa di una malattia del nervo ottico (glaucoma ad angolo stretto);
- se è in stato di gravidanza (vedere paragrafo Gravidanza e allattamento).

## Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista **prima** di prendere Lorazepam Accord se pensa che una delle seguenti condizioni la riguardi (vedere anche paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati):

- ha o ha mai avuto problemi di respirazione perché questo medicinale può diminuire la capacità spontanea di respirare. I problemi di respirazione possono essere associati anche alle seguenti condizioni:
  - soffre di problemi al cuore (insufficienza cardiaca);
  - soffre di bassa pressione arteriosa del sangue;
  - soffre di problemi generali di respirazione, di incapacità cronica di respirare in modo adeguato e regolare, sotto sforzo o a riposo;
  - soffre di episodi di interruzione del respiro per diversi secondi durante il sonno (apnea nel sonno)

Se lei manifesta una di queste condizioni e deve iniziare il trattamento con Lorazepam Accord, il medico la sottoporrà a regolari controlli medici;

- soffre o ha mai sofferto di reazioni allergiche alle benzodiazepine. Questo medicinale può provocare reazioni allergiche gravi e a rapida comparsa (reazioni anafilattiche) oppure gonfiore del viso, della lingua e della gola con incapacità di deglutire e di respirare (angioedema). A volte, queste reazioni possono essere fatali. Appena uno o più sintomi si manifestano si rechi presso il più vicino pronto soccorso. In questi casi, il medico le consiglierà di non assumere più medicinali a base di lorazepam e di proseguire il trattamento della sua malattia con altri medicinali;
- ha o ha avuto problemi di abuso e dipendenza da alcol, droga o medicinali, perché anche Lorazepam Accord può causare dipendenza (vedere paragrafo “Sviluppo di dipendenza”);
- soffre o ha mai sofferto di depressione, perché Lorazepam Accord può peggiorare la sua situazione e la tendenza al suicidio;
- soffre o ha mai sofferto di difficoltà a rapportarsi con le altre persone o con le varie situazioni della vita, anche se non sempre si è reso conto di queste difficoltà. Lorazepam Accord non è consigliato come trattamento principale di questa condizione;
- ha o ha mai avuto problemi al fegato (insufficienza epatica), perché questo medicinale potrebbe peggiorare la sua condizione. Il medico le consiglierà il dosaggio più adatto per la sua condizione;
- ha o ha mai avuto problemi ai reni (insufficienza renale). Il medico le consiglierà il dosaggio più adatto per la sua condizione.

### Disturbi della memoria

Dopo aver preso Lorazepam Accord lei potrebbe avere difficoltà a ricordare ciò che è accaduto **dopo** l'assunzione del medicinale. Pertanto è consigliabile che lei possa dormire per 7-8 ore dopo l'assunzione di questo medicinale.

### Disturbi paradossi

Lorazepam Accord può causare reazioni mentali ed effetti opposti rispetto a quelli previsti (effetti paradossi) (vedere paragrafo “4 Possibili effetti indesiderati”). Questi effetti sono più frequenti nei bambini e nelle persone anziane.

Se manifesta questi effetti, si rivolga al medico che le consiglierà il modo corretto per interrompere l'assunzione di questo medicinale.

### Sviluppo di tolleranza

In seguito ad un uso ripetuto di questo medicinale per alcune settimane, potrebbe verificarsi una diminuzione della sua efficacia (tolleranza). Lorazepam Accord è consigliato per trattamenti di breve durata.

Inoltre, il trattamento con questo medicinale aumenta la sensibilità agli effetti dell'alcol e di altri medicinali che deprimono le funzioni del cervello. Quindi, quando si assume Lorazepam Accord, l'assunzione contemporanea di alcol e di questo tipo di medicinali dovrebbe essere evitata o ridotta.

### Sviluppo di dipendenza

L'uso di benzodiazepine, compreso Lorazepam Accord, può causare dipendenza, che si può manifestare come crescente bisogno, desiderio o ricerca esagerata di voler assumere il medicinale (dipendenza psichica) oppure sviluppo di disturbi fisici che diminuiscono o scompaiono solo dopo aver assunto il medicinale (dipendenza fisica). La probabilità che si sviluppi dipendenza psichica e fisica da questo medicinale aumenta con l'aumentare della dose e della durata del trattamento.

È più probabile che lei sviluppi dipendenza da Lorazepam Accord se:

- ha assunto in passato o assume attualmente droga;
- ha bevuto in passato o beve attualmente sostanze alcoliche di frequente e/o in grandi quantità;
- ha avuto in passato o ha attualmente il desiderio di assumere medicinali in quantità esagerata;
- soffre o ha mai sofferto di difficoltà a rapportarsi con le altre persone o con le varie situazioni della vita, anche se non sempre si è reso conto di queste difficoltà.

In caso di interruzione brusca del trattamento con Lorazepam Accord dopo lo sviluppo di dipendenza, lei potrebbe manifestare sintomi di **astinenza** quali:

- sintomi **gravi** (più probabili dopo assunzione di Lorazepam Accord ad alte dosi per lungo periodo di tempo): sensazione di distacco o estraniamento da se stessi o dal mondo esterno, sensibilità ai suoni aumentata, intorpidimento e formicolio delle gambe o delle braccia, ipersensibilità alla luce, al rumore e al contatto fisico, allucinazioni, delirio, attacchi epilettici, convulsioni. Gli attacchi epilettici e le convulsioni possono verificarsi più facilmente se lei sta assumendo medicinali contro la depressione (antidepressivi) contemporaneamente a Lorazepam Accord;
- altri sintomi: mal di testa, dolori muscolari, ansia estrema, tensione emotiva, irrequietezza, confusione, irritabilità, capogiri, nausea, diarrea, perdita di appetito, alterazione dell'umore con tendenza alla tristezza, depressione, insonnia, sudorazione, sensazione persistente di ronzii alle orecchie, movimenti involontari del corpo, vomito, sensazione di formicolio, alterazioni delle percezioni, crampi addominali e muscolari, tremore, agitazione, percezione accentuata dal battito del cuore (palpitazioni), aumento del ritmo del battito del cuore (tachicardia), attacchi di panico, vertigini, accentuazione dei riflessi, perdita della capacità di memorizzare avvenimenti recenti, forte aumento della temperatura corporea;
- **sintomi di rimbalzo**: insonnia e ansia. Questi sintomi sono gli stessi per i quali le è stato consigliato il trattamento con Lorazepam Accord ma, in caso di interruzione brusca del trattamento, potrebbero

transitoriamente ripresentarsi in forma più grave rispetto a prima di iniziare il trattamento con questo medicinale. Inoltre, lei potrebbe manifestare cambiamenti di umore, irrequietezza, ansia e disturbi del sonno.

**Durata del trattamento:** La durata del trattamento deve essere la più breve possibile e non deve superare le 4 settimane per il trattamento dell'insonnia e le 8-12 settimane per il trattamento dell'ansia, compreso un periodo di sospensione graduale.

**Non smetta di prendere Lorazepam Accord all'improvviso. Si rivolga al medico o al farmacista che le consiglieranno il modo corretto per interrompere il trattamento con questo medicinale.** Vedere paragrafo 3 Se interrompe il trattamento con Lorazepam Accord.

### **Se è anziano e/o soffre di particolari condizioni di salute**

Se è anziano e/o le sue condizioni generali di salute sono molto deboli o se soffre di importanti malattie del cervello (specialmente arteriosclerosi cerebrale), lei è più sensibile all'effetto di Lorazepam Accord.

Se lei soffre di bassa pressione arteriosa del sangue, questo medicinale potrebbe provocare un aumento degli episodi di abbassamento della pressione arteriosa.

Pertanto si consiglia l'uso di questo medicinale al dosaggio più basso possibile oppure di evitarne l'uso.

### **Se ha gravi problemi al fegato**

Se soffre di gravi problemi al fegato associati o meno a sintomi cerebrali quali confusione mentale, alterazione del livello di coscienza o coma, Lorazepam Accord non deve essere utilizzato perché potrebbe peggiorare la sua condizione (vedere anche paragrafo 2 Non prenda Lorazepam Accord).

### **Bambini e adolescenti**

Non è nota l'efficacia e la sicurezza di Lorazepam Accord nei bambini al di sotto dei 12 anni di età. Il medico deciderà se Lorazepam Accord può essere somministrato ai bambini in base alle loro condizioni. La durata del trattamento deve essere la più breve possibile.

### **Altri medicinali e Lorazepam Accord**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno dei seguenti medicinali insieme a Lorazepam Accord perché è necessaria cautela:

- medicinali che causano forte riduzione di tutte le funzioni del cervello, quali:
  - calmanti e stimolanti il sonno (barbiturici, ipnotici/sedativi)
  - medicinali per il trattamento di alcune malattie mentali (antipsicotici)
  - medicinali per il trattamento dell'ansia (ansiolitici)
  - medicinali per il trattamento della depressione (antidepressivi)
  - medicinali per il trattamento del dolore acuto o cronico di elevata intensità (analgesici narcotici)
  - medicinali per il trattamento degli attacchi epilettici (antiepilettici)
  - anestetici

- medicinali per contrastare le manifestazioni allergiche (antistaminici sedativi)

Lorazepam Accord, somministrato insieme a medicinali anestetici, può provocare euforia, con aumento delle probabilità di sviluppare dipendenza psichica;

- clozapina (medicinale usato contro i disturbi del pensiero), perché l'assunzione insieme a Lorazepam Accord può causare una marcata sedazione, aumento della salivazione e perdita della coordinazione dei movimenti;
- valproato (medicinale usato contro gli attacchi epilettici), perché può aumentare gli effetti di Lorazepam Accord. In questo caso il medico potrebbe decidere di dimezzare la dose di Lorazepam Accord;
- probenecid (medicinale usato contro la gotta), perché può aumentare gli effetti di Lorazepam Accord. In questo caso il medico potrebbe decidere di dimezzare la dose di Lorazepam Accord;
- teofillina e aminofillina (medicinali usati contro l'asma bronchiale), perché possono diminuire gli effetti di Lorazepam Accord;
- loxapina (medicinale usato contro i disturbi del pensiero), perché l'assunzione insieme a Lorazepam Accord può provocare uno stato caratterizzato da eccessiva passività e inerzia nei confronti degli eventi e delle persone (es. impossibilità al movimento e mutismo), notevole riduzione della frequenza del respiro e abbassamento della pressione arteriosa.
- baclofen (medicinale usato come muscolo rilassante)
- caffeina (una sostanza contenuta principalmente nel caffè, ma anche in numerose bevande energizzanti), perché può ridurre gli effetti di Lorazepam Accord.

L'uso concomitante di Lorazepam Accord e gli oppioidi (forti analgesici, medicinali per la terapia della dipendenza e alcuni medicinali per la tosse) aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere considerato solo quando le altre opzioni di trattamento non sono possibili.

Tuttavia se il medico le prescrive Lorazepam Accord insieme agli oppioidi, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere limitate dal medico.

Informi il medico riguardo a tutti i medicinali oppioidi che sta prendendo e segua attentamente la raccomandazione sulla dose del medico. Può essere utile informare amici o parenti di prestare attenzione ai segni e sintomi sopra elencati.

Si rivolga al medico qualora manifesti tali sintomi.

### **Lorazepam Accord con alcol**

Eviti di assumere alcol durante il trattamento con questo medicinale, perché può aumentare l'effetto sedativo del medicinale. Ciò influenza negativamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

## Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

### Gravidanza

**Questo medicinale non deve essere preso in gravidanza, soprattutto durante i primi 3 mesi,** perché può causare malformazioni congenite nel feto.

- Se, per gravi motivi, lei assume questo medicinale a dosi elevate durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza, durante il periodo che precede il parto (travaglio) oppure durante il parto, nel neonato possono manifestarsi i seguenti sintomi:
  - eccessiva diminuzione dell'attività motoria
  - scarso tono muscolare
  - moderata riduzione del ritmo del respiro
  - bassa temperatura corporea
  - sospensione del respiro per un periodo di diversi secondi (apnea)
  - problemi di alimentazione
  - diminuzione della resistenza al freddo e conseguenti alterazioni del metabolismo
  - colorazione gialla/giallastra della pelle e delle mucose (ittero)
- Se lei assume questo medicinale per lungo tempo durante l'ultimo periodo della gravidanza, il neonato potrà sviluppare subito dopo la nascita **sintomi di dipendenza** fisica oppure di **astinenza** (vedere paragrafo "Sviluppo di dipendenza").

### Allattamento

Questo medicinale passa nel latte materno. Il medico deciderà se lei può prendere Lorazepam Accord durante l'allattamento al seno.

Se lei allatta al seno durante l'assunzione di questo medicinale, il neonato potrà presentare sonnolenza e riduzione della capacità di assumere il latte materno.

### Fertilità

Se è una donna in età fertile, contatti il suo medico per interrompere l'assunzione del prodotto nel caso intenda iniziare una gravidanza o se sospetta di essere incinta, per pianificare la graduale sospensione.

### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

**Non guidi né utilizzi macchinari se durante il trattamento con Lorazepam Accord manifesta sonnolenza e stordimento.** Lorazepam Accord può anche causare amnesia, alterazione della capacità di concentrazione e alterazioni della funzione muscolare. La sua vigilanza può essere alterata soprattutto se lei non ha dormito per un tempo sufficiente dopo l'assunzione di Lorazepam Accord.

### Lorazepam Accord contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## 3. Come prendere Lorazepam Accord

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico. In base alle sue condizioni e alla sua malattia, il medico le consiglierà la dose, quante volte al giorno prendere il medicinale e la durata di trattamento con Lorazepam Accord, per fare in modo che lei assuma la dose più bassa possibile per il più breve tempo possibile. Qualora lei avesse bisogno di aumentare la dose di questo medicinale, il medico le suggerirà come procedere gradualmente all'aumento per evitare effetti indesiderati. In caso di aumento della dose di Lorazepam Accord, è necessario aumentare prima la dose serale e poi eventualmente aumentare anche la dose del mattino.

**Trattamento dell'ansia:** La durata del trattamento deve essere la più breve possibile. La durata del trattamento, generalmente, non deve superare le 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale.

Assuma la dose più alta possibilmente la sera prima di andare a letto.

In determinati casi, il medico può decidere di prolungare il trattamento, dopo aver valutato le sue condizioni di salute.

La dose raccomandata è di 2-3 compresse al giorno.

Nei casi gravi, la dose raccomandata è 3-4 compresse da 2,5 mg al giorno.

**Trattamento dell'insonnia:** La durata del trattamento deve essere la più breve possibile. La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a 2 settimane, fino ad un massimo di 4 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale.

In determinati casi, il medico può decidere di prolungare il trattamento, dopo aver valutato le sue condizioni di salute.

Assuma le compresse appena prima di andare a letto.

La dose raccomandata è di 1 o 2 compresse da 1 mg al giorno.

Nei casi di insonnia persistente, la dose raccomandata è di 1 o 2 compresse da 2,5 mg al giorno.

### **Terapia di pazienti in attesa di un intervento chirurgico**

:

Interventi chirurgici maggiori: la dose raccomandata è 2 mg-4 mg di Lorazepam Accord, la sera prima dell'intervento:

interventi chirurgici minori: la dose raccomandata è 2 mg-4 mg, 1-2 ore prima dell'intervento chirurgico.

### **Uso negli anziani**

Negli anziani e nei pazienti debilitati, la dose raccomandata è 1 o 2 mg al giorno, suddivisa in più assunzioni al giorno secondo la sua tollerabilità..

### **Uso nelle persone con problemi ai reni o al fegato**

I pazienti con gravi problemi ai reni o al fegato (insufficienza renale o epatica) il medico ridurrà il dosaggio secondo la risposta del paziente.

### **Se prende più Lorazepam Accord di quanto deve**

Se lei (o qualcun altro) ha assunto una dose eccessiva di Lorazepam Accord o se pensa che un bambino possa avere preso questo medicinale, avverta immediatamente il medico o si rivolga al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.

Se prende dosi eccessive di questo medicinale per molto tempo può sviluppare dipendenza, in particolare se è predisposto.

Un sovradosaggio può causare una forte depressione del sistema nervoso con sintomi lievi quali:

- offuscamento, stato soporoso, disorientamento e indebolimento delle funzioni sensoriali;
- disturbo dell'articolazione della parola;
- confusione mentale;
- sonno continuo e ridotta risposta ai normali stimoli;
- incapacità di svuotare completamente la vescica;
- variazioni del desiderio sessuale.

Nei casi più gravi, quando si prendono grandi quantità di medicinale a scopo suicida oppure quando questo medicinale è assunto assieme a bevande alcoliche oppure ad altri medicinali che riducono lo stato di coscienza e le principali funzioni cerebrali, i sintomi possono essere:

- perdita della capacità di coordinare i movimenti;
- scarso tono muscolare;
- bassa pressione arteriosa del sangue;
- sonnolenza eccessiva;
- sintomi opposti rispetto a quelli previsti dagli effetti di questo medicinale (sintomi paradossi);
- riduzione di tutte le funzioni del sistema nervoso centrale;
- riduzione del funzionamento del cuore;
- riduzione della respirazione;
- coma;
- morte.

Porti con sé questo foglio e la confezione relativa in ospedale o dal medico, in modo che sappiano quale medicinale sia stato consumato.

**Trattamento** Contatti immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso più vicino se assume più Lorazepam Accord di quanto prescritto dal medico. Se lei è cosciente, le verrà indotto il vomito entro un'ora da quando ha assunto il medicinale; se non è cosciente verrà sottoposto ad una lavanda gastrica. Se queste pratiche non sono sufficienti, le potrà essere somministrato carbone attivo, per ridurre l'assorbimento di Lorazepam Accord, o il flumazenil, un medicinale che contrasta gli effetti del Lorazepam Accord.

### **Se dimentica di prendere Lorazepam Accord**

Se dimentica di prendere una dose, la prenda appena se ne ricorda, ma faccia in modo di poter riposare subito dopo e abbastanza a lungo (7-8 ore). Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Se pensa di aver dimenticato più di una dose consulti il medico.

### **Se interrompe il trattamento con Lorazepam Accord**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Lorazepam Accord, si rivolga al medico o al farmacista.

Non interrompa l'assunzione di Lorazepam Accord improvvisamente perché le dosi devono essere ridotte gradualmente. Il medico le consiglierà come interrompere il trattamento.

Se lei smette di prendere Lorazepam Accord o riduce la dose improvvisamente, potrebbe sviluppare temporaneamente sintomi di astinenza oppure sintomi di rimbalzo (vedere paragrafo 2 Sviluppo di dipendenza).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. **Interrompa il trattamento e si rivolga immediatamente al medico** se manifesta:

depressione e disturbi della mente, quali irrequietezza, agitazione, irritabilità, aggressività, senso di delusione, rabbia, incubi, allucinazioni (vedere e sentire cose che non esistono), psicosi (grave condizione della mente nella quale una persona perde il contatto con la realtà e la capacità di pensare e giudicare chiaramente) e alterazioni del comportamento, dipendenza fisica e psichica dal medicinale (con conseguente bisogno di fare uso eccessivo del medicinale), sintomi di astinenza o di rimbalzo (vedere paragrafo 2).

Queste reazioni si verificano maggiormente in bambini e anziani.

Inoltre, **si rivolga immediatamente al medico o si rechi al pronto soccorso** più vicino se dovesse manifestare:

- grave reazione allergica (shock anafilattico);
- gonfiore del viso, della lingua e della gola con conseguente incapacità a deglutire e a respirare;
- difficoltà a ricordare ciò che è accaduto dopo l'assunzione del medicinale (amnesia anterograda), che può anche essere accompagnata da alterazioni del comportamento;
- pensieri di suicidio, tentativi di suicidio.
- riduzione della temperatura corporea (ipotermia);

#### **Effetti indesiderati molto comuni**

(possono interessare **più di 1** paziente **su 10**):

- Sonnolenza durante il giorno
- Stanchezza

#### **Effetti indesiderati comuni**

- (possono interessare fino a 1 persona su 10) depressione (preesistente ed emersa con il trattamento);
- Perdita della coordinazione muscolare (atassia)
- Confusione
- Debolezza muscolare

#### **Effetti indesiderati non comuni**

- (possono interessare fino a 1 persona su 100) Alterazione del desiderio sessuale .
- Nausea

### **Effetti indesiderati con frequenza non nota:**

(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati

- disponibili): riduzione di tutte le cellule presenti nel sangue (pancitopenia);
  - riduzione nel numero di globuli bianchi (agranulocitosi);
  - riduzione nel numero di piastrine del sangue (trombocitopenia);
- Reazioni allergiche improvvise potenzialmente fatali (reazioni anafilattiche/anafilattoidi)
- Reazioni di ipersensibilità
  - Alterazione della secrezione dell'ormone antidiuretico (SIADH),
  - riduzione livelli di sodio nel sangue (iponatremia)
- Modificazioni dell'appetito
  - Tentativi e pensieri suicidari, psicosi (grave condizione della mente nella quale una persona perde il contatto con la realtà e la capacità di pensare e giudicare chiaramente), alterazioni del comportamento, agitazione, aggressività, collera, disinibizione, abuso di benzodiazepine, dipendenza psichica, sviluppo di dipendenza fisica, disturbi del sonno, incubi, allucinazioni), delusione, disorientamento, euforia, irritabilità, diminuita capacità di vivere le emozioni, irrequietezza,
  - Coma, tremori e rigidità muscolare (sintomi extrapiramidali), disartria/difficoltà nella articolazione del linguaggio, convulsioni/crisi epilettiche, manifestazioni autonome, amnesia, amnesia anterograda, compromissione dell'attenzione/concentrazione, riduzione della vigilanza, disturbi dell'equilibrio, senso di instabilità, mal di testa (cefalea)
- Visione doppia (diplopia) o offuscata e altri disturbi della vista;
- Vertigine
- Abbassamento della pressione del sangue (ipotensione);
- Depressione del respiro
- Sospensione del respiro per un periodo di diversi secondi (apnea)
  - Peggioramento dell'apnea notturna già esistente prima dell'assunzione del medicinale
  - Peggioramento delle malattie polmonari croniche con difficoltà a respirare
  - Problemi allo stomaco e all'interstino
  - stitichezza
  - Colorazione gialla/giallastra della pelle e delle mucose (ittero)
  - Angioedema, sintomi dermatologici comprendenti reazioni anche molto gravi,
  - Reazioni allergiche a livello cutaneo
  - Perdita di capelli a chiazze (alopecia)
  - Incapacità di svuotare completamente la vescica di urina (ritenzione urinaria)
  - Aumento nel sangue dei livelli di bilirubina, transaminasi e fosfatasi alcalina (sostanze prodotte dal fegato)
  - riduzione della temperatura corporea (ipotermia);  
sintomi da
  - astinenza

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione

all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Lorazepam Accord**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad."

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Lorazepam Accord**

Lorazepam Accord 1 mg compresse rivestite con film

- Il principio attivo è lorazepam. Ogni compressa rivestita con film contiene 1 mg di lorazepam.

- Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato. Film di rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido, talco.

Lorazepam Accord 2,5 mg compresse rivestite con film

- Il principio attivo è lorazepam. Ogni compressa rivestita con film contiene 2,5 mg di lorazepam.

- Gli altri componenti sono: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato. Film di rivestimento: ipromellosa, macrogol 6000, titanio diossido, talco.

### **Descrizione dell'aspetto di Lorazepam Accord e contenuto della confezione**

Compresse rivestite con film da 1 mg in blister contenente 20 compresse divisibili.

Compresse rivestite con film da 2,5 mg in blister contenente 20 compresse divisibili.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

Accord Healthcare Limited  
Sage House, 319 Pinner Road,  
North Harrow, Middlesex  
HA1 4HF  
Regno Unito

### **Produttore**

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturmo, 48 Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano

(MI) - Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agenzia Italiana del Farmaco