

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

Nafiprosil 1 mg Compresse rivestite con film

Finasteride

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è Nafiprosil e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Nafiprosil
3. Come prendere Nafiprosil
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Nafiprosil
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Nafiprosil e a che cosa serve

Nafiprosil contiene il principio attivo finasteride. Nafiprosil deve essere usato solo per gli uomini.

Nafiprosil è usato per il trattamento della caduta dei capelli maschile (conosciuta anche come alopecia androgenetica) in uomini di età compresa tra i 18 e i 41 anni. Se, dopo aver letto questo foglio illustrativo, lei ha delle domande sulla perdita di capelli maschile, chiedi al medico.

La perdita dei capelli maschile è una condizione comune che si ritiene sia causata da una combinazione di fattori genetici e da un particolare ormone chiamato il diidrotestosterone (DHT).

Il DHT contribuisce a ridurre la crescita dei capelli e ad assottigliare i capelli.

Nafiprosil riduce in modo specifico i livelli di DHT nel cuoio capelluto bloccando un enzima (5-alfa reduttasi di Tipo II) che converte il testosterone in DHT. Solo gli uomini con una perdita dei capelli da lieve a moderata, ma non completa possono aspettarsi di trarre beneficio dall'uso di Nafiprosil.

Nella maggior parte degli uomini trattati con finasteride per 5 anni, la progressione della perdita dei capelli è stata rallentata, e almeno la metà di questi uomini ha avuto anche un certo miglioramento nella crescita dei capelli.

Come agisce Nafiprosil?

La finasteride abbassa i livelli di DHT nel cuoio capelluto. Questa azione aiuta ad arrestare il processo della calvizie, favorendo così un aumento della crescita dei capelli e prevenendone un'ulteriore perdita.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Nafiprosil

Non prenda Nafiprosil:

- se è allergico (ipersensibile) alla finasteride o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è una donna (vedere anche il paragrafo 'Gravidanza e allattamento'). Negli studi clinici si è osservato che la finasteride è inefficace nel trattamento della perdita di capelli (alopecia androgenetica) nelle donne.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Effetti sull'Antigene Prostatico Specifico (PSA)

Nafiprosil può alterare un test del sangue chiamato PSA (Antigene Prostatico Specifico) per il controllo del cancro alla prostata. Se lei ha fatto il test per il PSA, informi il medico o il farmacista che sta prendendo Nafiprosil poiché Nafiprosil riduce i livelli di PSA.

Effetti sulla fertilità

E' stata riportata infertilità negli uomini che hanno assunto finasteride per un lungo periodo o avevano altri fattori di rischio che possono influenzare la fertilità.

E' stata riportata una normalizzazione o un miglioramento della qualità del liquido seminale dopo interruzione di finasteride. Non sono stati effettuati studi clinici a lungo termine sull'effetto di finasteride sulla fertilità negli uomini.

Cancro al seno

Vedere paragrafo 4.

Alterazioni dell'umore e depressione

Alterazioni dell'umore, come umore depresso, depressione e, meno frequentemente, pensieri suicidi sono stati riportati nei pazienti trattati con Nafiprosil. Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, interrompa l'assunzione di Nafiprosil e contatti il medico il prima possibile per ulteriori informazioni.

Bambini e adolescenti

Nafiprosil non deve essere usato nei bambini. Non ci sono dati che dimostrano l'efficacia o la sicurezza di finasteride nei bambini sotto i 18 anni di età.

Altri medicinali e Nafiprosil

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Nafiprosil si usa per il trattamento della perdita dei capelli maschile esclusivamente negli uomini. Per gli effetti sulla fertilità negli uomini vedere paragrafo 2.

- **Le donne non devono usare Nafiprosil a causa del rischio in gravidanza**
- **Se è una donna in gravidanza o che può potenzialmente diventarlo non tocchi le compresse di Nafiprosil rotte o frantumate.**
- Se il principio attivo di Nafiprosil viene assorbito dopo uso orale o attraverso la pelle da una donna che è incinta di un bambino di sesso maschile, il bambino potrebbe nascere con malformazioni agli organi genitali.
- Se una donna incinta entra in contatto con il principio attivo di Nafiprosil deve consultare un medico.
- Le compresse di Nafiprosil sono rivestite e prevengono il contatto con il principio attivo durante il normale utilizzo
- Se ha domande, chiedi al suo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non ci sono informazioni che suggeriscano che Nafiprosil 1 mg compresse alteri la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Nafiprosil contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Nafiprosil

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di una compressa al giorno (equivalente ad 1 mg di finasteride). La compressa può essere presa con o senza cibo.

Il medico la aiuterà a valutare se Nafiprosil sta producendo gli effetti desiderati. E' importante proseguire l'assunzione di Nafiprosil per l'intero periodo di tempo prescritto dal medico. Nafiprosil può avere effetto soltanto a lungo termine, se lei continua a prenderlo.

Pazienti con compromissione della funzionalità epatica

Non vi è esperienza sull'uso della finasteride in pazienti con funzionalità epatica compromessa.

Pazienti con compromissione della funzionalità renale

Non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con funzionalità renale compromessa.

Se prende più Nafiprosil di quanto deve

Se prende troppe compresse per errore, contatti subito il suo medico. Nafiprosil non agisce più velocemente o meglio se lei lo prende più di una volta al giorno.

Se dimentica di prendere Nafiprosil

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Nafiprosil

Affinchè si sviluppi un pieno effetto del farmaco, può essere necessario un periodo compreso da 3 e 6 mesi. E' importante continuare a prendere finasteride per il periodo indicato dal suo medico. Se lei interrompe l'assunzione di finasteride, potrebbe perdere i capelli cresciuti in un periodo di tempo compreso tra i 9 e 12 mesi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati in genere sono temporanei con un trattamento continuo o scompaiono quando il trattamento viene interrotto.

Interrompa l'assunzione di Nafiprosil e informi immediatamente il suo medico se ha uno dei seguenti sintomi:

- gonfiore delle labbra, del viso, della lingua o della gola, difficoltà nel deglutire, ponfi sotto la pelle (orticaria) e difficoltà a respirare.

Si rivolga immediatamente al suo medico se compare qualsiasi cambiamento del tessuto mammario come tumefazioni, dolore, ingrossamento del tessuto mammario o secrezione dai capezzoli, poiché questi possono essere segni di una condizione seria, come il cancro della mammella.

Non comune: può interessare fino a 1 persona su 100

- diminuzione del desiderio sessuale
- difficoltà nel raggiungimento dell'erezione
- problemi di eiaculazione, quale una diminuzione della quantità di liquido seminale rilasciata
- Depressione

Non nota: la frequenza non è nota sulla base dei dati disponibili

- Reazioni allergiche come eruzione cutanea o prurito
- tumefazione gonfiore o dolorabilità della mammella
- dolore ai testicoli
- palpitazioni
- persistente difficoltà ad avere un'erezione dopo l'interruzione del trattamento
- persistente calo del desiderio sessuale dopo l'interruzione del trattamento
- problemi persistenti di eiaculazione dopo interruzione del trattamento
- infertilità maschile e/o bassa qualità seminale dello sperma
- enzimi epatici elevati
- Ansia

Segnalazione di effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Nafiprosil

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Nafiprosil

- Il principio attivo è la finasteride. Ogni compressa rivestita con film contiene 1 mg di finasteride.
- Gli altri componenti sono:
Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato (1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio docusato, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Descrizione dell'aspetto di Nafiprosil e contenuto della confezione

Compressa rivestita con film.

Compresse rivestite con film di colore marrone, di forma rotonda, incise con 'H' su un lato e '36' sull'altro lato.

Le compresse di Nafiprosil sono disponibili in confezioni blister contenenti 7, 28, 30, 50, 84, 98 or 100 compresse rivestite con film.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione

Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013,
100 28 Stoccolma
Svezia

Produttore

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stoccolma
Svezia

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Corradino Industrial Estate,
Paola, PLA 3000
Malta

Concessionario esclusivo per la vendita in Italia

Farma Group S.r.l.
Via Strampelli, 18
63074 – San Benedetto del Tronto (AP)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Stato membro	Nomi proposti (di fantasia)
Portogallo (RMS)	Finasterida Bluefish
Spagna	PREDSER 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Italia	Nafiprosil

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

Nafiprosil 5 mg Compresse rivestite con film

Finasteride

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è Nafiprosil e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Nafiprosil
3. Come prendere Nafiprosil
4. Possibili effetti indesiderati
6. Come conservare Nafiprosil
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

2. Che cos'è Nafiprosil e a che cosa serve

Finasteride appartiene ad un gruppo di medicinali denominati "inibitori della 5-alfa reduttasi". Questi agiscono riducendo le dimensioni della ghiandola prostatica negli uomini.

Finasteride è usato nel trattamento e nel controllo dell'ingrossamento benigno (cioè non canceroso) della prostata (iperplasia prostatica benigna - IPB). Induce la riduzione della prostata ingrossata, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati all'IPB, riduce il rischio di improvvisa incapacità ad urinare (conosciuta come ritenzione urinaria acuta) e la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico.

4. Cosa deve sapere prima di prendere Nafiprosil

Non prenda Nafiprosil:

- se è allergico alla finasteride o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è una donna (vedere anche il paragrafo 'Gravidanza e allattamento').
- se è un bambino.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere Nafiprosil.

- Se ha una considerevole quantità di urina residua nella vescica dopo aver urinato e/o un flusso urinario gravemente ridotto, deve essere attentamente controllato per il possibile restringimento del tratto urinario.
- Se la sua funzionalità epatica è ridotta, il livello di finasteride nel sangue può risultare aumentato.
- Se la sua partner sessuale è in stato di gravidanza o potrebbe potenzialmente essere in gravidanza, deve evitare di esporla al contatto con il suo liquido seminale che può contenere piccole quantità del farmaco.
- Se deve effettuare un esame del PSA (un esame usato per individuare il cancro della prostata), informi il medico che sta prendendo la finasteride. La finasteride può alterare i livelli nel sangue della sostanza che si sta esaminando, cioè il PSA.

Informi il medico se attualmente o in passato ha manifestato una qualsiasi delle condizioni sopra menzionate.

Comunichi prontamente al medico qualsiasi cambiamento nel tessuto del suo torace come tumefazioni, dolore, ingrossamento del petto o secrezione dai capezzoli, poichè questi potrebbero essere segni di una condizione grave, come il cancro della mammella.

Alterazioni dell'umore e depressione

Alterazioni dell'umore, come umore depresso, depressione e, meno frequentemente, pensieri suicidi sono stati riportati nei pazienti trattati con Nafiprosil. Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, contatti il medico il prima possibile per ulteriori informazioni.

Altri medicinali e Nafiprosil

Nafiprosil generalmente non interferisce con altri medicinali. Non sono state identificate interazioni farmacologiche significative.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Nafiprosil con cibi e bevande

Nafiprosil può essere preso ai pasti o lontano dai pasti.

Gravidanza e allattamento

Nafiprosil è destinato esclusivamente all'uso negli uomini.

Le donne in stato di gravidanza o che potrebbero potenzialmente essere in gravidanza non devono entrare in contatto con le compresse di finasteride, specialmente se rotte o frantumate. Se la finasteride viene assorbita attraverso la pelle oppure viene presa per bocca da una donna in stato di gravidanza con un feto di sesso maschile, il bambino potrebbe nascere con malformazioni agli organi genitali.

Se la partner sessuale del paziente è in stato di gravidanza o potrebbe essere in gravidanza, il paziente deve evitare l'esposizione della sua partner al proprio liquido seminale (ad es. utilizzando un preservativo) oppure interrompere il trattamento con la finasteride. Se una donna in stato di gravidanza entra in contatto con Nafiprosil è necessario consultare un medico.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non ci sono informazioni che suggeriscano che Nafiprosil alteri la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Nafiprosil contiene lattosio

Se il medico le ha comunicato che ha una intolleranza verso alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

5. Come prendere Nafiprosil

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di una compressa al giorno (equivalente a 5 mg di finasteride).

Le compresse rivestite con film possono essere assunte sia a stomaco vuoto sia ai pasti. Le compresse rivestite con film devono essere degluite intere e non devono essere divise o frantumate.

Sebbene i miglioramenti siano visibili in tempi brevi, può essere necessario proseguire il trattamento per almeno sei mesi per valutare se sia stata raggiunta una risposta favorevole.

Il medico le dirà per quanto tempo dovrà continuare ad assumere Nafiprosil. Non interrompa anticipatamente il trattamento, perchè i sintomi potrebbero ripresentarsi.

Pazienti con compromissione della funzionalità epatica

Non vi è esperienza sull'uso della finasteride in pazienti con funzionalità epatica compromessa (vedere anche "Avvertenze e precauzioni").

Pazienti con compromissione della funzionalità renale

Non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio. L'uso di Nafiprosil in pazienti che devono essere sottoposti a emodialisi non è stato ancora studiato.

Pazienti anziani

Non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio.

Si rivolga al medico o al farmacista se ritiene che gli effetti di Nafiprosil siano troppo forti o troppo deboli.

Se prende più Nafiprosil di quanto deve

Se ha assunto più compresse di quanto prescritto, o se qualcun'altro ha assunto le compresse, contatti il pronto soccorso del più vicino ospedale. Porti con sé le rimanenti compresse o la scatola vuota del medicinale per permettere l'identificazione del farmaco assunto.

Se dimentica di prendere Nafiprosil

Se dimentica di prendere una dose di Nafiprosil, può prenderla non appena se ne ricorda a meno che non sia già ora di prendere la dose successiva. In questo caso deve continuare con l'assunzione del medicinale secondo prescrizione. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza dell'altra dose.

Se interrompe il trattamento con Nafiprosil

Non smetta di prendere Nafiprosil a meno che il medico le dica che può farlo.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Per la valutazione degli effetti indesiderati sono state usate le seguenti categorie di frequenza:

Molto comune – si verifica in più di 1 paziente su 10

Comune – si verifica in più di 1 paziente su 100, ma in meno di 1 paziente su 10

Non comune – si verifica in meno di 1 paziente su 100, ma in più di 1 paziente su 1.000

Raro – si verifica in meno di 1 paziente su 1.000, ma in più di 1 paziente su 10.000

Molto raro – si verifica in meno di 1 paziente su 10.000, incluse le segnalazioni isolate

Gli effetti indesiderati più comuni sono impotenza e diminuzione del desiderio sessuale. Questi effetti normalmente si verificano all'inizio del trattamento ma in genere non durano a lungo nella maggior parte dei pazienti se il trattamento viene continuato.

Disturbi del sistema immunitario

Non nota: reazioni di ipersensibilità, incluso gonfiore delle labbra e del viso

Disturbi psichiatrici

Comune: diminuzione della libido

Non nota: diminuzione della libido che può continuare dopo l'interruzione della terapia, depressione, ansia

Patologie cardiache

Non nota: palpitazioni

Patologie epatobiliari

Non nota: aumento degli enzimi epatici

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Non comune: eruzione cutanea

Non nota: prurito, orticaria

Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella

Comune: impotenza

Non comune: disturbi dell'eiaculazione, dolorabilità delle mammelle, ingrossamento delle mammelle

Non nota: dolore testicolare

Esami diagnostici

Comune: diminuzione del volume dell'eiaculato

Nafiprosil può alterare il risultato dell'esame di laboratorio relativo al PSA.

Comunichi prontamente al medico qualsiasi cambiamento del tessuto del suo torace, come tumefazioni, dolore, ingrossamento del petto o secrezione dai capezzoli, poiché questi possono essere segni di una condizione seria, come il tumore della mammella

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Segnalazione di effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Nafiprosil

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede condizioni speciali per la conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Nafiprosil

Il principio attivo è la finasteride. Ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di finasteride.

Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato (1500), sodio amido glicolato (tipo A), sodio docusato, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), lacca di alluminio indaco carminio (E132), talco, ossido di ferro giallo (E172).

Descrizione dell'aspetto di Nafiprosil e contenuto della confezione

Compressa rivestita con film.

Compresse rivestite con film di colore blu, di forma rotonda, incise con 'H' su un lato e '37' sull'altro lato.

Le compresse di Nafiprosil sono disponibili in confezioni blister contenenti 15, 28, 30, 50, 60, 90, 98 o 100 compresse rivestite con film.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013,
100 28 Stoccolma
Svezia

Produttore

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stoccolma
Svezia

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Corradino Industrial Estate,
Paola, PLA 3000
Malta

Concessionario per la vendita

Farma Group S.r.l.
Via Strampelli, 18
63074 – San Benedetto del Tronto (AP)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Stato membro	Nomi proposti (di fantasia)
PT (RMS)	Finasterida Bluefish
DE	Finasteride Bluefish 5 mg Filmtabletten
ES	Finasterida Bluefish 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
FR	FINASTERIDE BLUEFISH 5 mg comprimé pelliculé
IT	Nafiprosil
PL	Finasteridum Bluefish

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il