

Foglio Illustrativo: informazioni per l'utente

Ramipril Aurobindo 2,5 mg compresse **Ramipril Aurobindo 5 mg compresse** **Ramipril Aurobindo 10 mg compresse**

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Ramipril Aurobindo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril Aurobindo
3. Come prendere Ramipril Aurobindo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ramipril Aurobindo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Ramipril Aurobindo e a cosa serve

Ramipril Aurobindo contiene una sostanza attiva chiamata ramipril che appartiene al gruppo di medicinali chiamati ACE inibitori (Inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensina).

Ramipril Aurobindo agisce:

- Diminuendo la produzione, da parte del corpo, di sostanze che possono causare un aumento della pressione del sangue
- Rilassando e allargando i suoi vasi sanguigni
- Facilitando il suo cuore nel pompare il sangue in circolo nel corpo.

Ramipril Aurobindo può essere usato:

- Per trattare la pressione alta del sangue (ipertensione)
- Per ridurre il rischio di un attacco cardiaco o di un ictus
- Per ridurre il rischio o ritardare il peggioramento di problemi ai reni (in presenza o meno di diabete)
- Per trattare il cuore quando non riesce a pompare un sufficiente volume di sangue nel resto del corpo (insufficienza cardiaca)
- Come trattamento dopo un attacco cardiaco (infarto del miocardio) se associato ad insufficienza cardiaca.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Ramipril Aurobindo

Non prenda Ramipril Aurobindo

- Se è allergico al ramipril, ad altri medicinali ACE inibitori o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Segni di una reazione allergica possono essere eruzioni cutanee, difficoltà a deglutire o a respirare, gonfiore delle labbra, della faccia, della gola o della lingua.
- Se ha avuto una reazione allergica grave chiamata "angioedema". Questi segni includono prurito, eruzione cutanea (orticaria), macchie rosse sulle mani, sui piedi e in gola, gonfiore della gola e della lingua, gonfiore attorno agli occhi e delle labbra, difficoltà a respirare e a deglutire.

- Se è in dialisi o sta subendo qualche altro tipo di filtrazione del sangue. A seconda del macchinario che viene utilizzato, Ramipril Aurobindo può non essere adatto per lei.
- Se ha problemi al rene dovuti a insufficiente apporto di sangue al rene (stenosi dell'arteria renale).
- Durante gli ultimi 6 mesi di gravidanza (vedere sotto il paragrafo "Gravidanza e allattamento").
- Se la pressione del sangue è eccessivamente bassa o instabile. Questa valutazione sarà fatta dal medico.
- Se ha il diabete o funzione compromessa dei reni e viene trattata con un medicinale che riduce la pressione sanguigna che contiene aliskiren.

Non prenda Ramipril Aurobindo se si verifica una delle condizioni sopra descritte. Se non è sicuro, chiedi al medico prima di prendere Ramipril Aurobindo.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ramipril Aurobindo:

- Se ha problemi al cuore, al fegato o ai reni
- Se ha perso molti sali o fluidi corporei (a causa di uno stato di malessere quale vomito, diarrea, sudorazione eccessiva, in seguito ad una dieta povera di sale, assunzione di diuretici orali per un lungo periodo di tempo o in seguito a dialisi)
- Se sta per sottoporsi ad un trattamento per ridurre l'allergia alle punture delle api o delle vespe (desensibilizzazione)
- Se sta per subire un'anestesia. Questa può essere somministrata per un intervento chirurgico o un intervento ai denti. Può essere necessario interrompere il trattamento con Ramipril Aurobindo il giorno prima, chiedi consiglio al medico
- Se ha un'elevata quantità di potassio nel sangue (evidenziato da un esame del sangue)
- Se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali, il rischio di angioedema (rapido gonfiore sottocutaneo in sedi quali la gola) è maggiore:
 - sirolimus, everolimus e altri medicinali appartenenti alla classe degli inibitori di mTOR (usati per evitare il rigetto di organi trapiantati) o vildagliptina o racecadotril
- Se ha una patologia del collagene vascolare come sclerodermia o lupus eritematoso sistemico.
- Deve informare il medico se pensa di essere in gravidanza (o se vi è la possibilità di iniziare una gravidanza). Ramipril Aurobindo non è raccomandato nei primi 3 mesi di gravidanza e può causare gravi danni al bambino dopo i primi 3 mesi di gravidanza (vedere sotto il paragrafo "Gravidanza e allattamento").
- Se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali usati per il trattamento della pressione alta:
 - Un ACE-inibitore (ad es. enalapril, lisinopril, ramipril), in particolare se ha problemi ai reni legati al diabete
 - aliskiren.

Il medico potrebbe controllare la funzionalità dei suoi reni, la pressione del sangue e la quantità di elettroliti (ad es. potassio) nel sangue ad intervalli regolari.

Veda anche le informazioni al paragrafo "Non prenda Ramipril Aurobindo".

Bambini e adolescenti

Non è raccomandato l'uso di Ramipril Aurobindo nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni di età perché la sicurezza e l'efficacia di ramipril non sono ancora state stabilite.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non ne è sicuro), si rivolga al medico prima di prendere Ramipril Aurobindo.

Altri medicinali e Ramipril Aurobindo

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Questo perché Ramipril Aurobindo può influenzare il meccanismo d'azione di alcuni altri medicinali. Inoltre alcuni medicinali possono influenzare il meccanismo d'azione di Ramipril Aurobindo.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Questi medicinali possono ridurre l'effetto di Ramipril Aurobindo:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolori ed infiammazioni (ad es. Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene o indometacina e aspirina)
- Medicinali utilizzati per il trattamento della pressione del sangue bassa, dello shock, dell'insufficienza cardiaca, dell'asma o delle allergie come efedrina, noradrenalina o adrenalina. Il medico dovrà controllare la sua pressione del sangue.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Tali medicinali, se assunti con Ramipril Aurobindo, possono aumentare la probabilità che si verifichino effetti indesiderati:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolore ed infiammazione (ad es. Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) come ibuprofene, indometacina, aspirina)
- Medicinali per il trattamento del cancro (chemioterapia)
- Medicinali per evitare il rigetto di organi dopo il trapianto come ad esempio la ciclosporina
- Diuretici orali come la furosemide
- Integratori di potassio o sostituti salini contenenti potassio, diuretici (compresse che facilitano la minzione, in particolare quelli cosiddetti risparmiatori di potassio), altri farmaci che possono aumentare i livelli di potassio nel corpo (tra cui eparina e cotrimossazolo noto anche come trimetoprim/sulfametossazolo).
- Medicinali steroidei per il trattamento dell'infiammazione come il prednisolone
- Allopurinolo (usato per abbassare il contenuto di acido urico nel sangue)
- Procainamide (per i problemi di battito cardiaco).
- Temsirolimus (per il cancro).
- Medicinali utilizzati solitamente per evitare il rigetto di organi trapiantati (sirolimus, everolimus e altri medicinali appartenenti alla classe degli inibitori di mTOR). Vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni".
- Vildagliptin (usato per trattare il diabete di tipo 2)
- Racecadotril (usato contro la diarrea)
- Il medico potrà aver bisogno di modificare la dose e/o prendere altre precauzioni se sta assumendo un antagonista del recettore dell'angiotensina II (ARB) o aliskiren (vedere anche le informazioni al paragrafo "Non prenda Ramipril Aurobindo" e "Avvertenze e precauzioni").

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Il meccanismo d'azione di questi medicinali può essere influenzato da Ramipril Aurobindo:

- Medicinali per il diabete come gli ipoglicemizzanti orali e l'insulina. Ramipril Aurobindo può abbassare la quantità di zuccheri nel sangue. Controlli attentamente il livello degli zuccheri nel sangue quando assume Ramipril Aurobindo.
- Litio (per problemi psichiatrici). Ramipril Aurobindo può aumentare la quantità di litio nel sangue. Il livello di litio nel sangue deve essere controllato attentamente dal medico.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non ne è sicuro), si rivolga al medico prima di assumere Ramipril Aurobindo.

Ramipril Aurobindo con cibi e alcol

- Bere bevande alcoliche insieme a Ramipril Aurobindo può provocare sensazione di capogiro o di stordimento. Se vuole sapere quanto alcol può bere quando sta prendendo Ramipril Aurobindo ne discuta con il medico, poiché i medicinali usati per ridurre la pressione del sangue e l'alcol possono avere effetti additivi.
- Ramipril Aurobindo può essere preso con o senza cibo.

Gravidanza e allattamento

Gravidanza

Deve informare il medico se pensa di essere in gravidanza (o potrebbe iniziare una gravidanza). Non deve prendere Ramipril Aurobindo nelle prime 12 settimane di gravidanza, e non deve prenderlo affatto dopo la 13a settimana poiché l'uso durante la gravidanza può essere dannoso per il bambino.

Se inizia una gravidanza mentre sta prendendo Ramipril Aurobindo, informi immediatamente il medico. Deve essere effettuato il passaggio ad un trattamento alternativo prima di pianificare una gravidanza.

Allattamento

Non deve prendere Ramipril Aurobindo se sta allattando al seno.
Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Potrebbe avere sensazione di capogiro, mentre prende Ramipril Aurobindo. Questo è più probabile che si verifichi quando ha appena iniziato a prendere Ramipril Aurobindo o ha appena aumentato la dose. Se ciò dovesse accadere, non guidi veicoli o usi strumenti o macchinari.

Ramipril Aurobindo compresse contiene lattosio monoidrato.

Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di assumere questo medicinale.

3. Come prendere Ramipril Aurobindo

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Ramipril Aurobindo 2,5 mg compresse:

Questo dosaggio non è adatto per dosaggi al di sotto di 1,25 mg.

Ramipril Aurobindo 5 mg compresse:

Questo dosaggio non è adatto per dosaggi al di sotto di 2,5 mg.

Ramipril Aurobindo 10 mg compresse:

Questo dosaggio non è adatto per dosaggi al di sotto di 5 mg.

Quanto ne deve prendere

Trattamento della pressione del sangue alta

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico modificherà la dose da prendere finché la sua pressione del sangue sarà sotto controllo.
- La dose massima è 10 mg una volta al giorno.
- Se sta già prendendo dei diuretici orali, il medico potrebbe interromperli o ridurne la quantità prima di farle iniziare il trattamento con Ramipril Aurobindo.

Per ridurre il rischio di un attacco cardiaco o di un ictus

- La dose iniziale abituale è 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico potrebbe decidere di aumentare la dose da prendere
- La dose abituale è 10 mg una volta al giorno.

Trattamento per ridurre o prevenire l'aggravamento dei problemi ai reni

- Può esserle data per iniziare una dose di 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno
- Il medico adeguerà la dose che sta prendendo.
- La dose abituale è 5 mg o 10 mg una volta al giorno.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg una volta al giorno.
- Il medico adeguerà la dose da prendere.
- La dose massima è 10 mg al giorno. E' preferibile dividere la dose in due somministrazioni al giorno.

Trattamento dopo un attacco cardiaco

- La dose iniziale abituale è da 1,25 mg una volta al giorno a 2,5 mg due volte al giorno.
- Il medico adeguerà la dose da prendere.
- La dose abituale è 10 mg al giorno. E' preferibile dividere la dose in due somministrazioni al giorno.

Anziani

Il medico ridurrà la dose iniziale e adeguerà il trattamento più lentamente.

Assunzione del medicinale

- Prenda il medicinale per bocca nello stesso momento della giornata, ogni giorno.
- Deglutisca le compresse intere con del liquido.
- Non rompa le compresse e non le mastichi.

Se prende più Ramipril Aurobindo di quanto deve

Informi il medico o vada al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non guidi per andare all'ospedale, si faccia accompagnare da qualcuno o chiami un'ambulanza. Porti con sé la scatola del medicinale. Questo perché il medico deve sapere che cosa ha assunto.

Se dimentica di prendere Ramipril Aurobindo

- Se dimentica una dose, prenda la dose abituale quando è il momento di prendere quella successiva.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Smetta di prendere Ramipril Aurobindo e si rivolga immediatamente al medico se nota la comparsa di uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati gravi – potrebbe avere bisogno di un trattamento medico urgente:

- Gonfiore del volto, delle labbra o della gola tale da rendere difficoltoso deglutire o respirare, così come prurito ed eruzione cutanea. Questo potrebbe essere segno di una reazione allergica grave a Ramipril Aurobindo
- Reazioni cutanee gravi che includono eruzione cutanea, ulcere in bocca, peggioramento di una patologia cutanea pre-esistente, arrossamenti, formazione di vesciche o desquamazione della pelle (come Sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica o eritema multiforme).

Informi il medico immediatamente se manifesta:

- Accelerazione della frequenza cardiaca, battito cardiaco irregolare o rinforzato (palpitazioni), dolore al petto, sensazione di oppressione al petto, o problemi più gravi che includono attacco cardiaco e ictus
- Respiro corto o tosse. Questi possono essere segni di problemi ai polmoni
- Formazione più facile di lividi, sanguinamento prolungato più del normale, qualsiasi segno di sanguinamento (ad es. sanguinamento delle gengive) macchie viola sulla pelle o facilitata insorgenza di infezioni, irritazioni della gola e febbre, sensazione di stanchezza, svenimento, capogiri o colorito pallido. Questi possono essere segni di problemi circolatori o del midollo osseo
- Forte dolore all'addome che può estendersi fino alla schiena. Questo può essere un segno di pancreatite (infiammazione del pancreas)
- Febbre, brividi, stanchezza, perdita dell'appetito, dolore allo stomaco, sensazione di malessere, ingiallimento della pelle o degli occhi (ittero). Questi possono essere segni di problemi al fegato come epatite (infiammazione del fegato) o danno al fegato.

Altri effetti indesiderati includono:

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o dura più di qualche giorno.

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Mal di testa o sensazione di stanchezza
- Sensazione di capogiro. Questo è più probabile che accada quando la terapia con Ramipril Aurobindo è appena iniziata o ha appena incrementato la dose
- Svenimento, ipotensione (pressione del sangue insolitamente bassa), specialmente quando si è in piedi o ci si alza rapidamente

- Tosse secca stizzosa, infiammazione dei seni nasali (sinusite) o bronchite, fiato corto
- Dolore allo stomaco o all'intestino, diarrea, cattiva digestione, nausea o vomito
- Eruzione cutanea con o senza rigonfiamenti
- Dolore al petto
- Crampi o dolori ai muscoli
- Gli esami del sangue mostrano un livello di potassio più elevato del normale.

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Problemi di equilibrio (vertigini)
- Prurito e sensazioni insolite alla pelle come intorpidimento, formicolio, bruciore, sensazione di punture o di sfregamento (parestesia)
- Perdita o alterazione del gusto
- Disturbi del sonno
- Umore depresso, ansia, maggiore nervosismo rispetto al solito o irritabilità
- Naso chiuso, difficoltà a respirare o peggioramento dell'asma
- Gonfiore all'intestino chiamato "angioedema intestinale" che si presenta con sintomi come dolore addominale, vomito e diarrea
- Bruciore allo stomaco, stitichezza o secchezza della bocca
- Aumento della quantità di urina durante la giornata
- Maggiore sudorazione rispetto al solito
- Perdita o diminuzione dell'appetito (anoressia)
- Battito cardiaco accelerato o irregolare, braccia e gambe gonfie. Questo può essere il segno che il suo corpo sta trattenendo più acqua del solito
- Vampate
- Visione offuscata
- Dolore alle articolazioni
- Febbre
- Impotenza negli uomini, ridotto desiderio sessuale negli uomini o nelle donne
- Aumento nel numero di alcune cellule bianche del sangue (eosinofilia) riscontrato durante gli esami del sangue
- Alterazioni della funzionalità di fegato, pancreas o reni evidenziate da analisi del sangue.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Sensazione di mancamento o confusione
- Lingua gonfia ed arrossata
- Grave sfaldamento o desquamazione della pelle, prurito, eruzione cutanea caratterizzata da pustole
- Problemi alle unghie (come perdita o separazione dell'unghia dalla sua sede)
- Eruzione cutanea o lividi
- Macchie sulla pelle ed estremità fredde
- Occhi arrossati, gonfi o acquosi o con prurito
- Disturbi dell'udito e tintinnio nell'orecchio
- Sensazione di debolezza
- Diminuzione nel numero dei globuli rossi, bianchi e delle piastrine del sangue o della concentrazione dell'emoglobina, evidenziata da esami del sangue.

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Maggiore sensibilità al sole rispetto al solito

Altri effetti indesiderati riscontrati:

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o permane per un tempo più lungo di qualche giorno.

- Difficoltà di concentrazione
- Gonfiore alla bocca
- Esami del sangue che mostrano un numero troppo basso di cellule del sangue

- Esami del sangue che mostrano un basso livello del sodio nel sangue rispetto al solito
- urina concentrata (di colore scuro), sentirsi o stare male, avere crampi muscolari, confusione e convulsioni che potrebbero essere causati dalla inadeguata secrezione di ADH (ormone antidiuretico). Se ha questi sintomi contatti il suo medico il prima possibile.
- Dita delle mani e dei piedi che cambiano colore quando si raffreddano e che formicolano o fanno male quando vengono riscaldate (fenomeno di Raynaud)
- Aumento del volume del seno negli uomini
- Reazioni rallentate o compromesse
- Sensazione di bruciore
- Modifica nella percezione degli odori
- Perdita dei capelli.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Ramipril Aurobindo

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Tenere il contenitore in HDPE ben chiuso per proteggere il medicinale dall'umidità.

2,5 mg (confezione da 1000)

Validità in uso: utilizzare entro 12 mesi dalla prima apertura del flacone HDPE.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sull'etichetta del flacone e sul blister dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ramipril Aurobindo

- Il principio attivo è il ramipril. Ogni compressa contiene 2,5 mg, 5 mg o 10 mg di ramipril.
- Gli altri componenti sono: amido pregelatinizzato (di mais), lattosio monoidrato, sodio idrogeno carbonato (E500), croscarmellosa sodica (E468), ferro ossido giallo [solo per 2,5 mg compresse] (E172) ferro ossido rosso [solo per 5 mg compresse] (E172) e sodio stearil fumarato.

Descrizione dell'aspetto di Ramipril Aurobindo e contenuto della confezione

Ramipril Aurobindo compresse da 2,5 mg:

Compressa non rivestita, rotonda, piatta, con i bordi smussati [diametro 5,0 mm], di colore da giallo chiaro a giallo, con impresso "H" e "18" separati da una linea di incisione su un lato e piatta sull'altro lato. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Ramipril Aurobindo 5 mg compresse:

Compressa non rivestita, rotonda, piatta, con i bordi smussati [diametro 6,0 mm], di colore rosa chiaro chiazato, con impresso "H" e "19" separati da una linea di incisione su un lato e piatta sull'altro lato. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Ramipril Aurobindo compresse da 10 mg:

Compresa non rivestita, rotonda, piatta, con i bordi smussati [diametro 8,0 mm], di colore da bianco a biancastro, con impresso "H" e "20" separati da una linea di incisione su un lato e piatta sull'altro lato. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

Ramipril Aurobindo compresse è disponibile in:

- Confezione in blister (PVC trasparente/Alluminio).
- Contenitore in HDPE bianco opaco con tappo a vite in PP

Confezioni:

Ramipril Aurobindo 2,5 mg compresse:

Blister: 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 e 500 compresse

Contenitore in HDPE: 30 e 1000 (confezione ospedaliera) compresse

Ramipril Aurobindo 5 mg compresse:

Blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 e 500 compresse

Contenitore in HDPE: 30 e 1000 (confezione ospedaliera) compresse

Ramipril Aurobindo 10 mg compresse:

Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 e 500 compresse

Contenitore in HDPE: 30 e 1000 (confezione ospedaliera) compresse

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Via San Giuseppe 102

21047 Saronno (VA)

Italia

Produttori

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD

Regno Unito

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia, BEG 3000

Malta

Galenicum Health, S.L.

Avenida Diagonal 538, 4º 1ª

08006, Barcelona

Spagna

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri della EEA con le seguenti denominazioni:

Danimarca	Ramipril Aurobindo
Finlandia	Ramipril Orion 5 mg / 10 mg tabletti
Francia	RAMIPRIL ARROW LAB 1,25 mg comprimé RAMIPRIL ARROW LAB 2,5 mg / 5 mg / 10 mg, comprimé sécable
Germania	Ramipril Aurobindo 2,5 mg / 5 mg / 10 mg Tabletten
Grecia	RAMISYN 5 mg / 10 mg δισκία
Italia	Ramipril Aurobindo
Malta	Ramipril Aurobindo 1.25mg/ 2.5 mg/ 5 mg / 10 mg tablets
Paesi Bassi	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten
Polonia	AWERPIL 2,5 mg

Romania	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg
Spagna	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate
Svezia	ramipril cinfa 2,5 mg/ 5 mg / 10 mg comprimidos EFG
Regno Unito	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tableter
	Ramipril 5 mg / 10 mg tablets

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco