

## **INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO**

### **SCATOLA**

#### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

Gogolox 10 mg/erogazione soluzione orale

Ambroxolo cloridrato

#### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO ATTIVO|**

1 ml di soluzione orale contiene 50 mg di ambroxolo cloridrato.

1 erogazione da 0,2 ml contiene 10 mg di ambroxolo cloridrato (50 mg/ml).

#### **3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene etanolo (96 %) e levomentolo.

Vedere il foglio illustrativo prima dell'uso.

#### **4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO ↓**

Soluzione orale

13 ml

25 ml

#### **5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale. Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

#### **6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

#### **7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

## **8. DATA DI SCADENZA**

SCAD:

Usare entro 1 mese dalla prima apertura/dal primo uso

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non refrigerare o congelare.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

## **11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE**

### **ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfplatz 2/1/8,

1010 Vienna

Austria

## **12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

AIC n. 040831012

AIC n. 040831024

## **13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto....

#### **14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

Medicinale di automedicazione.



#### **15. ISTRUZIONI PER L'USO**

Gogolox viene usato negli adulti e negli adolescenti di età pari e superiore a 12 anni per il trattamento mucolitico nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche caratterizzate da turbe della secrezione. Il dosaggio abituale negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni è di 3 erogazioni, tre volte al giorno.

#### **16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

Gogolox

#### **17. IDENTIFICATIVO UNICO - CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

<Non pertinente.>

#### **18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI RESI LEGGIBILI**

<Non pertinente>

## **INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO ETICHETTA - Flacone**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

Gogolox 10 mg/erogazione soluzione orale

Ambroxolo cloridrato

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO ATTIVO**

1 ml di soluzione orale contiene 50 mg di ambroxolo cloridrato.

1 erogazione da 0,2 ml contiene 10 mg di ambroxolo cloridrato (50 mg/ml).

### **3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Contiene etanolo (96%) e levomentolo.

Vedere il foglio illustrativo prima dell'uso.

### **4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Soluzione orale

13 ml

25 ml

### **5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso orale. Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

### **6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

**8. DATA DI SCADENZA**

SCAD:

Usare entro 1 mese dalla prima apertura/dal primo uso.

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non refrigerare o congelare.

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8,

1010 Vienna

Austria

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

AIC n. 040831012

AIC n. 040831024

### **13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto

### **14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

Medicinale di automedicazione

### **15. ISTRUZIONI PER L'USO**

Gogolox è usato negli adulti e adolescenti di età pari e superiore a 12 anni per il trattamento mucolitico nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche caratterizzate da turbe della secrezione. Il dosaggio abituale negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni è di 3 erogazioni tre volte al giorno.

### **16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

<Giustificazione per non apporre il Braille accettata.>

### **17. IDENTIFICATIVO UNICO - CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

<Non pertinente.>

### **18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI RESI LEGGIBILI**

<Non pertinente>