

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE 20 mg compresse rivestite con film **ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE 40 mg compresse rivestite con film**

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE
3. Come prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE e a cosa serve

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE contiene il principio attivo eletriptan. ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE è un medicinale che appartiene al gruppo chiamato agonisti dei recettori della serotonina. La serotonina è una sostanza naturale che si trova nel cervello che aiuta a restringere i vasi sanguigni.

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE può essere usato per trattare la cefalea emicranica con o senza aura negli adulti. Prima che inizi una cefalea emicranica, può manifestare una fase chiamata aura, che può evolvere in disturbi della vista, intorpidimento e disturbi della parola.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Non prenda ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

- se è allergico (ipersensibile) all'eletriptan o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se ha una grave malattia al fegato o ai reni.
- Se ha la pressione sanguigna alta da moderata a grave o pressione sanguigna alta lieve non trattata.
- Se ha avuto problemi al cuore [ad es. attacco di cuore, angina, insufficienza cardiaca o ritmo cardiaco significativamente anormale (aritmia), restringimento temporaneo e improvviso di una delle arterie coronariche].
- Se ha scarsa circolazione (vasculopatia periferica).
- Se ha avuto un ictus (anche lieve che è durato pochi minuti o poche ore).
- Se ha preso ergotamina o medicinali simili all'ergotamina (inclusa metisergide) entro le 24 ore prima o dopo l'assunzione di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE .
- Se sta prendendo altri medicinali il cui nome termina per "triptan" (ad esempio sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan e frovatriptan).

Consulti il medico e non prenda ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE se questi casi la riguardano ora o l'hanno riguardata in qualsiasi momento in passato.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE .

- Se ha il diabete
- Se fuma o usa una terapia sostitutiva a base di nicotina
- Se è un uomo e ha più di 40 anni
- Se è una donna ed è in post-menopausa
- Se lei o un suo familiare soffre di malattia coronarica
- Le è stato detto che può avere un aumento del rischio di malattie cardiache, ne parli con il medico prima di usare ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Se usa ripetutamente ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE o qualsiasi medicinale per il trattamento dell'emicrania per numerosi giorni o settimane, questo può causare mal di testa giornalieri di lunga durata. Informi il medico se si verifica questa condizione poiché potrebbe aver bisogno di sospendere il trattamento per qualche tempo.

Altri medicinali e ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'assunzione di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE con alcuni medicinali può causare gravi effetti indesiderati. Non usi ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE se:

- ha assunto ergotamina o altri medicinali come l'ergotamina (inclusa metisergide) entro 24 ore prima o dopo l'assunzione di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE
- se sta prendendo altri medicinali il cui nome termina per "triptan" (ad esempio sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan e frovatriptan).

Alcuni medicinali possono influenzare il modo di agire di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE oppure lo stesso ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE può ridurre l'efficacia di altri medicinali assunti contemporaneamente. Questi includono:

- farmaci usati per trattare le infezioni fungine (ad es. ketoconazolo e itraconazolo)
- farmaci usati per trattare le infezioni batteriche (ad es. eritromicina, claritromicina e josamicina)
- farmaci usati per trattare AIDS e HIV (ad es. ritonavir, indinavir e nelfinavir).

La preparazione a base di Erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*) non deve essere assunta contemporaneamente. Se sta già prendendo l'Erba di San Giovanni, consulti il medico prima di interromperne l'assunzione.

Informi il medico prima di iniziare il trattamento con eletriptan, se sta assumendo alcuni medicinali (comunemente detti SSRIs* o SNRIs**) per la depressione e altri disturbi mentali. Questi medicinali possono aumentare il rischio di sviluppare sindrome serotoninergica durante l'uso associato con alcuni medicinali per l'emicrania. Vedere il paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati" per maggiori informazioni sui sintomi della sindrome serotoninergica.

SSRIs* - inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina

SNRIs** - inibitori della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE con cibi e bevande

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE può essere usato prima o dopo aver consumato cibo o bevande.

Gravidanza e allattamento

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di assumere qualsiasi medicinale. Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Si raccomanda di evitare l'allattamento per 24 ore dopo aver assunto questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE o l'emicrania stessa possono causare sonnolenza. Questo medicinale può anche causarle dei capogiri. Pertanto eviti di guidare o usare macchinari durante l'attacco di emicrania o dopo aver assunto il medicinale.

ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE contiene lattosio monoidrato e giallo tramonto lacca d'alluminio

- Lattosio monoidrato: se il medico le ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.
- Giallo tramonto lacca d'alluminio: questo componente può causare reazioni allergiche

3. Come prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti

Il medicinale può essere assunto in qualsiasi momento dopo l'inizio della cefalea emicranica, ma è meglio prenderlo il prima possibile. Tuttavia deve prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE solo durante la fase cefalalgica dell'emicrania.

Non deve prendere questo medicinale per prevenire l'attacco di emicrania.

- La dose iniziale abituale è di 1 compressa da 40 mg.
- Ingerisca la compressa intera con un sorso d'acqua.
- Se la prima compressa non dà sollievo alla sua emicrania, non prenda una seconda compressa per lo stesso attacco.
- Se dopo la prima compressa l'emicrania migliora e poi torna, può prendere una seconda compressa. Tuttavia dopo aver preso la prima compressa deve aspettare almeno 2 ore prima di prendere la seconda compressa.
- Non deve prendere più di 80 mg (2 compresse x 40 mg) entro 24 ore.
- Se si rende conto che una dose da 1 compressa da 40 mg non dà sollievo alle sue emicranie, informi il medico – lui o lei può decidere di aumentare la dose a due compresse da 40 mg per gli attacchi futuri.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Le compresse di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE non sono raccomandate nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

Anziani

Le compresse di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE non sono raccomandate per i pazienti al di sopra dei 65 anni di età.

Compromissione renale

Questo medicinale può essere usato in pazienti con problemi renali lievi o moderati. In questi pazienti si raccomanda una dose iniziale di 20 mg, e la dose totale giornaliera non deve superare i 40 mg. Il medico le dirà la dose da prendere.

Compromissione epatica

Questo medicinale può essere usato in pazienti con problemi al fegato lievi o moderati. Nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata non sono necessari aggiustamenti di dose.

Se prende più ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE di quanto deve

Se prende accidentalmente troppo ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE, contatti immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Porti sempre con sé la confezione etichettata del medicinale, indipendentemente dal medicinale rimasto.

Gli effetti indesiderati dovuti all'assunzione di troppo ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE includono pressione sanguigna elevata e problemi cardiaci.

Se dimentica di prendere ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena lo ricorda a meno che non sia ora della dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Informi immediatamente il medico se manifesta uno qualsiasi dei seguenti sintomi dopo aver assunto questo medicinale:

- Affanno improvviso, difficoltà a respirare, gonfiore delle palpebre, del volto o delle labbra, eruzione cutanea o prurito (specialmente se riguardano l'intero corpo) poiché può essere un segno di una reazione di ipersensibilità.
- Dolore o rigidità al petto, che possono essere intensi e coinvolgere la gola. Questi possono essere sintomi di problemi della circolazione del sangue (cardiopatía ischemica).
- Segni e sintomi di sindrome serotoninergica che possono includere irrequietezza, allucinazioni, perdita di coordinazione, battito cardiaco veloce, aumento della temperatura corporea, alterazioni rapide nella pressione sanguigna e riflessi iperattivi.

Altri effetti indesiderati che possono verificarsi sono:

Comune:

(può interessare fino a 1 persona su 10)

- Dolore al petto o senso di costrizione o pressione, palpitazioni cardiache, aumento della frequenza cardiaca .
- Capogiri, sensazione di rotazione (vertigini), mal di testa, sonnolenza, ridotta sensibilità al tatto e al dolore
- Mal di gola, senso di costrizione alla gola, bocca secca
- Dolore addominale e allo stomaco, indigestione (dolore allo stomaco), nausea (sensazione di disagio o fastidio allo stomaco o all'addome con l'impulso di vomitare)
- Rigidità (aumentato tono muscolare), debolezza muscolare, mal di schiena, dolore muscolare
- Sensazione generale di debolezza, sensazione di caldo, brividi, naso che cola, sudorazione, formicolio o sensazione anormale, rossore, dolore

Non comune

(può interessare fino a 1 persona su 100)

- Difficoltà a respirare, sbadigli
- Gonfiore del volto o delle mani o dei piedi, infiammazione o infezione della lingua, eruzione cutanea, prurito
- Aumentato senso del tatto o dolore (iperestesia), perdita di coordinazione, movimenti lenti o ridotti, tremore, linguaggio confuso
- Non sentirsi se stesso (depersonalizzazione), depressione, pensieri alterati, agitazione, confusione, sbalzi d'umore (euforia), periodi di mancanza di reazione (stupore), sensazione generale di fastidio, malattia o mancanza di benessere (malessere), mancanza di sonno (insonnia)
- Perdita di appetito e perdita di peso (anoressia), disturbi del gusto, sete
- Degenerazione delle articolazioni (artrosi), dolore alle ossa, dolore alle articolazioni
- Aumentata necessità di urinare, problemi ad urinare, passaggio di eccessive quantità di urina, diarrea
- Visione anormale, dolore agli occhi, intolleranza alla luce, occhi secchi o che lacrimano
- Mal d'orecchio, ronzio alle orecchie (tinnito)
- Diminuzione della circolazione (vasculopatia periferica)

Raro

(può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Shock, asma, orticaria, disturbi della pelle, lingua gonfia
- Infezione alla gola o al torace, gonfiore delle ghiandole linfatiche
- Battito cardiaco rallentato
- Instabilità emotiva (sbalzi d'umore)
- Degenerazione delle articolazioni (artrite), disturbi muscolari, contrazioni
- Stitichezza, intestino infiammato, ruttii
- Dolore al seno, mestruazioni intense o prolungate
- Infezione agli occhi (congiuntivite)
- Cambiamenti della voce

Altri effetti indesiderati segnalati includono svenimento, pressione sanguigna elevata, infiammazione dell'intestino crasso, vomito, accidenti correlati al cervello e ai vasi sanguigni, insufficiente afflusso di sangue al cuore, attacco di cuore, spasmo alle arterie o al muscolo cardiaco.

Il medico può inoltre prelevare regolarmente campioni di sangue per verificare gli enzimi epatici elevati o qualsiasi problema al sangue. Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola o sul blister dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

- Il principio attivo è eletriptan (come bromidrato). Ogni compressa rivestita con film contiene 24,24 mg di eletriptan bromidrato (equivalente a 20,0 mg di eletriptan).
- Il principio attivo è eletriptan (come bromidrato). Ogni compressa rivestita con film contiene 48,48 mg di eletriptan bromidrato (equivalente a 40,0 mg di eletriptan).
- Gli altri eccipienti sono cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, Opadry II orange 85F230075 (alcool polivinilico parzialmente idrolizzato, titanio diossido, PEG 3350, talco, giallo tramonto FCF lacca d'alluminio)

Descrizione dell'aspetto di ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE e contenuto della confezione

Le compresse di Eletriptan MEDIPHA SANTE sono arancioni, biconvesse, rotonde, rivestite con film a rilascio immediato, con impresso "20" su un lato e lisce sull'altro lato con un diametro di circa 6 mm.

Le compresse sono fornite in confezioni blister da 2, 3 o 6 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Le compresse di Eletriptan MEDIPHA SANTE sono arancioni, biconvesse, rotonde, rivestite con film a rilascio immediato, con impresso "40" su un lato e lisce sull'altro lato con un diametro di circa 8 mm.

Le compresse sono fornite in confezioni blister da 2, 3, 6 o 10 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

MEDIPHA SANTE

Les Fjords Immeuble Oslo, 19 Avenue de Norvege

91953 Courtaboeuf Cedex

Francia

Produttore responsabile del rilascio lotti

LABORATOIRES BTT

ZI de Krafft

67150 ERSTEIN

FRANCIA

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Olanda: ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE 20 mg – 40 mg filmomhulde tabletten

Francia: ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE 20 mg- 40 mg, comprimé pelliculé

Italia: ELETRIPTAN MEDIPHA SANTE

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Altre fonti di informazioni