

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

**Etoricoxib Chanelle 30 mg compresse rivestite con film**  
**Etoricoxib Chanelle 60 mg compresse rivestite con film**  
**Etoricoxib Chanelle 90 mg compresse rivestite con film**  
**Etoricoxib Chanelle 120 mg compresse rivestite con film**

### Etoricoxib

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Etoricoxib Chanelle e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Etoricoxib Chanelle
3. Come prendere Etoricoxib Chanelle
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Etoricoxib Chanelle
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Etoricoxib Chanelle e a che cosa serve**

- Etoricoxib Chanelle fa parte di un gruppo di medicinali chiamati inibitori selettivi della COX-2. Questi appartengono ad una famiglia di medicinali noti come farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS).
- Etoricoxib Chanelle aiuta a ridurre il dolore ed il gonfiore (infiammazione) a livello delle articolazioni e dei muscoli di persone con osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e gotta.
- Etoricoxib Chanelle è usato anche per il trattamento a breve termine del dolore moderato successivo alla chirurgia dentale.

Etoricoxib Chanelle è indicato negli adulti e adolescenti sopra i 16 anni.

#### **Cos'è l'artrosi (OA)?**

L'artrosi è una malattia delle articolazioni. Essa è causata dal progressivo deterioramento delle cartilagini che ricoprono le estremità delle ossa. Questo fatto comporta gonfiore (infiammazione), dolore, dolorabilità, rigidità e disabilità.

#### **Cos'è l'artrite reumatoide?**

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria a lungo termine delle articolazioni. Essa causa dolore, rigidità, gonfiore e perdita progressiva dei movimenti nelle articolazioni colpite. Essa può inoltre causare infiammazione in altre parti del corpo.

#### **Cos'è la gotta?**

La gotta è una malattia con improvvisi e ricorrenti attacchi di infiammazione molto dolorosa e arrossamento delle articolazioni. È causata dal deposito di cristalli minerali nelle articolazioni.

### **Cos'è la spondilite anchilosante?**

La spondilite anchilosante è una malattia infiammatoria della colonna vertebrale e delle grandi articolazioni.

## **2. Cosa deve sapere prima di prendere Etoricoxib Chanelle Non prenda Etoricoxib Chanelle:**

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è allergico ai farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), compresa l'aspirina e gli inibitori della COX-2 (vedere Possibili effetti indesiderati, paragrafo 4)
- se ha un'ulcera dello stomaco in fase attiva o un sanguinamento dello stomaco o dell'intestino in fase attiva
- se ha una grave malattia al fegato
- se ha una grave malattia al rene
- se è incinta o c'è la possibilità che sia incinta, o se allatta (vedere 'Gravidanza, allattamento e fertilità')
- se ha un'età inferiore ai 16 anni
- se ha una malattia infiammatoria dell'intestino, come malattia di Crohn, Colite ulcerosa, o colite
- se il medico le ha diagnosticato problemi cardiaci come insufficienza cardiaca (di grado moderato o grave), angina (dolore toracico), o se ha avuto un attacco cardiaco, o se è stato sottoposto ad intervento di bypass coronarico, se ha avuto un'arteriopatia periferica (ridotta circolazione a gambe e piedi a causa di vasi sanguigni ristretti o occlusi) o se ha avuto qualsiasi tipo di ictus (incluso mini-ictus, attacco ischemico transitorio o TIA). Etoricoxib Chanelle può aumentare lievemente il rischio di attacco cardiaco e di ictus; per questo motivo non deve essere usato in persone che hanno già avuto problemi di cuore o ictus
- se ha la pressione sanguigna elevata che non viene controllata dal trattamento (si rivolga al medico o al farmacista se non è sicuro che la pressione sanguigna sia sotto adeguato controllo).

Se pensa che una qualsiasi di queste condizioni La riguarda, non prenda queste compresse prima di aver consultato il medico.

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Etoricoxib Chanelle:

- se ha una storia di sanguinamenti o di ulcere dello stomaco.
- se è disidratato, per esempio a causa di un episodio prolungato di vomito o diarrea.
- se ha un gonfiore dovuto a ritenzione di liquidi.
- se ha una storia di insufficienza cardiaca, o qualsiasi altra forma di malattia del cuore.
- se ha una storia di alta pressione sanguigna. In alcune persone Etoricoxib Chanelle, specialmente ad alte dosi, può aumentare la pressione sanguigna, e il medico periodicamente controllerà la sua pressione sanguigna.
- se ha una storia di malattie del fegato o del rene.

- se è in terapia per un'infezione. Etoricoxib Chanelle può mascherare o nascondere una febbre, che è un segno di infezione.
- se è una donna che sta tentando di rimanere incinta.
- se è un anziano (età superiore ai 65 anni).
- se ha diabete, colesterolo alto o abitudine al fumo. Queste sono condizioni che possono aumentare il Suo rischio di malattia cardiaca.

Se ha dei dubbi su qualsiasi delle condizioni appena menzionate, ne parli con il medico prima di prendere Etoricoxib Chanelle per verificare se il medicinale è adatto per Lei.

Etoricoxib Chanelle ha la stessa efficacia sia nel paziente più giovane che in quello più anziano. Se Lei è anziano (età superiore ai 65 anni), il medico la controllerà in modo appropriato. Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti anziani.

### **Bambini e adolescenti**

Non dia questo medicinale a bambini e adolescenti di età inferiore a 16 anni.

### **Altri medicinali e Etoricoxib Chanelle**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. In particolare se lei sta prendendo una qualsiasi delle seguenti medicine, è possibile che il medico richieda dei controlli per vedere se queste medicine funzionano bene una volta che Lei ha iniziato a prendere Etoricoxib Chanelle:

- fluidificanti del sangue (anticoagulanti), come il warfarin
- rifampicina (un antibiotico)
- metotrexato (un farmaco usato per la soppressione del sistema immunitario e spesso utilizzato nel trattamento dell'artrite reumatoide)
- farmaci utilizzati per la pressione sanguigna elevata e l'insufficienza cardiaca chiamati ACE-inibitori e bloccanti dei recettori dell'angiotensina, come ad esempio enalapril e ramipril, e losartan e valsartan
- litio (un farmaco usato per alcuni tipi di depressione)
- diuretici
- ciclosporina o tacrolimus (farmaci usati per la soppressione del sistema immunitario)
- digossina (un farmaco per il trattamento dell'insufficienza cardiaca e del ritmo cardiaco irregolare)
- minoxidil (un farmaco per il trattamento della pressione sanguigna alta)
- salbutamolo compresse o soluzione orale (un farmaco per il trattamento dell'asma)
- contraccettivi orali
- terapia ormonale sostitutiva
- aspirina, il rischio di ulcere allo stomaco è più elevato se prende Etoricoxib Chanelle con aspirina.
  - Etoricoxib Chanelle può essere assunto con basse dosi di aspirina. Se Lei è in cura con aspirina a bassa dose per la prevenzione di attacchi cardiaci o ictus, Lei non deve interrompere il trattamento con aspirina senza consultare il medico.
  - Lei non deve prendere alte dosi di aspirina o medicinali antiinfiammatori mentre prende Etoricoxib Chanelle.

### **Etoricoxib Chanelle con cibi e bevande**

L'insorgenza dell'effetto di Etoricoxib Chanelle può essere più veloce quando assunto senza cibo.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

Etoricoxib Chanelle compresse non deve essere preso durante la gravidanza. In caso di gravidanza o di sospetta gravidanza, o se Lei sta pianificando di rimanere incinta, non prenda le compresse. Se resta incinta, smetta di prendere le compresse e consulti il medico. Se non è sicura o se ha bisogno di più informazioni a riguardo, consulti il medico.

#### Allattamento

Non è noto se Etoricoxib Chanelle venga escreto nel latte umano. Se Lei sta allattando, o pensa che allatterà, contatti il medico prima di prendere Etoricoxib Chanelle. Se Lei sta usando Etoricoxib Chanelle non deve allattare.

#### Fertilità

Etoricoxib Chanelle non è raccomandato nelle donne che stanno pianificando una gravidanza.

### **Guida di veicoli o utilizzo di macchinari**

Alcuni pazienti che prendevano Etoricoxib Chanelle hanno riferito capogiro e sonnolenza. Non guidi se avverte capogiro o sonnolenza.

Non utilizzi attrezzi o macchinari se avverte capogiro o sonnolenza.

### **Etoricoxib Chanelle contiene lattosio**

Se il medico Le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere Etoricoxib Chanelle**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

Non prendere più della dose raccomandata per il trattamento della Sua malattia. Il medico valuterà periodicamente il trattamento. È importante che Lei usi la dose più bassa in grado di controllare il dolore e che non prenda Etoricoxib Chanelle più a lungo del necessario. Questo perché il rischio di attacchi cardiaci e ictus può aumentare dopo un trattamento prolungato, specialmente con alte dosi.

La dose raccomandata è:

#### **Per il dosaggio da 30 mg:**

##### **Artrosi**

La dose raccomandata è di 30 mg (equivalente a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino ad una dose massima di 60 mg (equivalenti a 2 compresse di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno.

##### **Artrite reumatoide**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno.

### **Spondilite anchilosante**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno.

### **Condizioni di dolore acuto**

Etoricoxib deve essere usato solo per il periodo del dolore acuto.

### **Gotta**

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 4 compresse di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente ad un massimo di 8 giorni di trattamento.

### **Dolore postoperatorio da chirurgia dentale**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse di Etoricoxib Chanelle da 30 mg) una volta al giorno, limitatamente ad un massimo di 3 giorni di trattamento.

### **Per il dosaggio da 60 mg:**

#### *Artrosi*

La dose raccomandata è di 30 mg (non realizzabile con il dosaggio da 60 mg) una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino ad una dose massima di 60 mg (equivalenti a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 60 mg) una volta al giorno.

#### *Artrite reumatoide*

La dose raccomandata è di 90 mg. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 60 mg. Per il trattamento dell'artrite reumatoide è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

#### *Spondilite anchilosante*

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 60 mg. Per il trattamento della spondilite anchilosante è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

#### *Condizioni di dolore acuto*

Etoricoxib deve essere usato solo per il periodo del dolore acuto.

#### *Gotta*

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 2 compresse di Etoricoxib Chanelle da 60 mg) una volta al giorno che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente ad un massimo di 8 giorni di trattamento.

#### *Dolore postoperatorio da chirurgia dentale*

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno, limitatamente ad un massimo di 3 giorni di trattamento. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 60 mg. Per il trattamento del dolore postoperatorio da chirurgia dentale è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

### **Per il dosaggio da 90 mg:**

#### **Artrosi**

La dose raccomandata è di 30 mg una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino ad una dose massima di 60 una volta al giorno. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 90 mg. Per il trattamento dell'artrosi è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 30 mg), consulti il medico.

### **Artrite reumatoide**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 90 mg) una volta al giorno.

### **Spondilite anchilosante**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 90 mg) una volta al giorno.

### **Condizioni di dolore acuto**

Etoricoxib deve essere usato solo per il periodo del dolore acuto.

### **Gotta**

La dose raccomandata è di 120 mg una volta al giorno che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente ad un massimo di 8 giorni di trattamento. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 90 mg. Per il trattamento della gotta è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 120 mg), consulti il medico.

### **Dolore postoperatorio da chirurgia dentale**

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 90 mg) una volta al giorno, limitatamente ad un massimo di 3 giorni di trattamento.

### **Per il dosaggio da 120 mg:**

#### **Artrosi**

La dose raccomandata è di 30 mg una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino ad una dose massima di 60 una volta al giorno. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 120 mg. Per il trattamento dell'artrosi è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 30 mg), consulti il medico.

#### **Artrite reumatoide**

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 120 mg. Per il trattamento dell'artrite reumatoide è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

#### **Spondilite anchilosante**

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 120 mg. Per il trattamento della spondilite anchilosante è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

### **Condizioni di dolore acuto**

Etoricoxib deve essere usato solo per il periodo del dolore acuto.

### **Gotta**

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 1 compressa di Etoricoxib Chanelle da 120 mg) una volta al giorno che deve essere utilizzata solo per il

periodo del dolore acuto, limitatamente ad un massimo di 8 giorni di trattamento.

### **Dolore postoperatorio da chirurgia dentale**

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno, limitatamente ad un massimo di 3 giorni di trattamento. Questo dosaggio non è realizzabile con Etoricoxib Chanelle da 120 mg. Per il trattamento del dolore postoperatorio da chirurgia dentale è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Chanelle 90 mg), consulti il medico.

### **Persone con problemi di fegato**

- Se Lei ha una leggera malattia del fegato non deve prendere più di 60 mg al giorno.
- Se ha una malattia **moderata** del fegato non deve prendere più di **30 mg al giorno**.

### **Uso nei Bambini e negli adolescenti**

Etoricoxib Chanelle non deve essere assunto dai bambini o dagli adolescenti sotto i 16 anni di età.

### **Anziani**

Non sono necessari aggiustamenti del dosaggio nei pazienti anziani. Come per altri medicinali, è necessaria cautela nei pazienti anziani.

### Modo di somministrazione

Etoricoxib Chanelle è per uso orale. Assumere le compresse una volta al giorno. Etoricoxib Chanelle può essere assunto insieme al cibo o a stomaco vuoto.

### **Se prende più Etoricoxib Chanelle di quanto dovrebbe**

Non deve mai prendere più compresse di quelle raccomandate dal medico. Se prende troppe compresse di Etoricoxib Chanelle deve contattare immediatamente un medico.

### **Se dimentica di prendere Etoricoxib Chanelle**

È importante attenersi alla dose di Etoricoxib Chanelle indicata dal medico. Se dovesse dimenticare una dose, il giorno seguente si limiti a riprendere il Suo schema di dose abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

### **Se si manifesta uno dei seguenti sintomi deve interrompere la terapia con Etoricoxib Chanelle e deve immediatamente contattare il medico:**

- respiro affannoso, dolori toracici, o gonfiore delle caviglie che insorgono o iniziano a peggiorare
- colorazione gialla della cute e degli occhi (ittero) - questi sono sintomi di problemi di fegato
- dolore di stomaco grave o continuo o feci che diventano nere

- una reazione allergica che può comprendere problemi cutanei come ulcere o formazione di vescicole, o gonfiore di faccia, labbra, lingua, o gola che può rendere difficoltosa la respirazione.

**Molto Comune (possono interessare più di 1 persona su 10):**

- dolore allo stomaco

**Comune (possono interessare fino ad 1 persona su 10):**

- alveolite (infiammazione e dolore dopo un'estrazione dentale)
- gonfiore delle gambe e/o dei piedi dovuto a ritenzione di liquidi (edema)
- capogiro, mal di testa
- palpitazioni (battito cardiaco accelerato o irregolare), ritmo cardiaco irregolare (aritmia)
- aumento della pressione sanguigna
- respiro sibilante o corto (broncospasmo)
- stitichezza, flatulenza (eccesso di gas), gastrite (infiammazione della superficie interna dello stomaco), bruciore di stomaco, diarrea, difficoltà nella digestione (dispepsia)/fastidio di stomaco, nausea, conati di vomito (vomito), infiammazione dell'esofago, ulcere della bocca
- alterazioni di alcuni esami del sangue legati alla funzione del fegato
- comparsa di lividi
- debolezza e affaticamento, malattia simil-influenzale

**Non comune (possono interessare fino ad 1 persona su 100):**

- gastroenterite (infiammazione del tratto gastrointestinale che coinvolge sia lo stomaco che l'intestino tenue/influenza gastrointestinale), infezione della parte alta dell'apparato respiratorio, infezione del tratto urinario
- diminuzione del numero dei globuli rossi nel sangue, diminuzione del numero dei globuli bianchi nel sangue, diminuzione delle piastrine
- ipersensibilità (una reazione allergica inclusa l'orticaria che può essere abbastanza grave da richiedere l'intervento immediato del medico)
- aumenti o diminuzioni dell'appetito, aumento di peso
- ansia, depressione, diminuzione dell'acutezza mentale; percezioni visive, sensitive o uditive non provocate da stimoli reali (allucinazioni)
- alterazione del gusto, difficoltà a dormire, formicolio o intorpidimento, sonnolenza
- visione offuscata, irritazione e arrossamento degli occhi
- ronzio alle orecchie, vertigine (sensazione di capogiro persistente)
- anomalie del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale), frequenza cardiaca accelerata, insufficienza cardiaca, sensazione di oppressione, pressione o pesantezza toracica (angina pectoris), attacco di cuore
- vampate, ictus, mini-ictus (attacco ischemico transitorio), grave aumento della pressione sanguigna, infiammazione dei vasi sanguigni
- tosse, mancanza di respiro, sangue dal naso
- gonfiore di stomaco o d'intestino, cambiamenti delle abitudini intestinali, bocca secca, ulcera dello stomaco, infiammazione della superficie interna dello stomaco che può diventare grave e può portare a sanguinamento, sindrome del colon irritabile, infiammazione del pancreas
- gonfiore del viso, eruzione della pelle o prurito della pelle, arrossamento della pelle
- crampi/spasmi muscolari, dolore/rigidità muscolare



- livelli elevati di potassio nel sangue, alterazione di alcuni esami del sangue o delle urine legati alla funzionalità del rene, gravi problemi renali
- dolore toracico

**Raro (possono interessare fino ad 1 persona su 1.000):**

- angioedema (una reazione allergica con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola che può causare difficoltà a respirare e ad inghiottire, che può essere abbastanza grave da richiedere l'intervento immediato del medico)/reazioni anafilattiche/anafilattoidi compreso lo shock (una grave reazione allergica che richiede l'intervento immediato del medico)
- confusione, irrequietezza
- problemi al fegato (epatite)
- bassi livelli di sodio nel sangue
- insufficienza del fegato, colorazione gialla della cute e/o degli occhi (ittero)
- reazioni cutanee gravi

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>  
 Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**5. Come conservare Etoricoxib Chanelle**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi Etoricoxib Chanelle dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

**Che cosa contiene Etoricoxib Chanelle**

- Il principio attivo è etoricoxib. Ogni compressa rivestita con film contiene 30, **60, 90 o 120** milligrammi di etoricoxib.
- Gli altri componenti (eccipienti) sono: Nucleo: idrogenofosfato di calcio (anidro), croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato e idrossipropilcellulosa. Rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, biossido di titanio (E171), triacetina. Le compresse da 30 mg, 60 mg e 120 mg contengono anche ossido di ferro giallo (E172, agente colorante) e lacca di indaco carminio (E132, agente colorante).

**Descrizione dell'aspetto di Etoricoxib Chanelle e contenuto della confezione**

Le compresse di Etoricoxib Chanelle rivestite con film sono disponibili in quattro dosaggi:

- **30 mg:** compresse rivestite con film biconvesse, a forma di mela, di colore verde-blu con incisione del numero '30' su un lato e lisce sull'altro lato. Il dosaggio da 30 mg è disponibile in blister contenenti 28 compresse.
- **60 mg:** compresse rivestite con film biconvesse, a forma di mela, di colore verde scuro con incisione del numero '60' su un lato e lisce sull'altro lato. Il dosaggio da 60 mg è disponibile in blister contenenti 7, 14, 20, 28, 50 e 100 compresse.
- **90 mg:** compresse rivestite con film biconvesse, a forma di mela, di colore bianco con incisione del numero '90' su un lato e lisce sull'altro lato. Il dosaggio da 90 mg è disponibile in blister contenenti 7, 14, 20, 28, 30, 50 e 100 compresse.
- **120 mg:** compresse rivestite con film biconvesse, a forma di mela, di colore verde chiaro con incisione del numero '120' su un lato e lisce sull'altro lato. Il dosaggio da 120 mg è disponibile in blister contenenti 5, 7, 14 e 28 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

#### **Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

Germania: Etoricoxib Chanelle 30mg, 60mg, 90mg & 120mg Filmtabletten

Irlanda: Etoricoxib 30mg, 60mg, 90mg & 120mg Film-coated Tablets

Italia: Etoricoxib Chanelle

Malta: Etoricoxib 30mg, 60mg, 90mg & 120mg Film-coated Tablets

Portogallo: Etoricoxib Chanelle

Romania: Etoricoxib Chanelle Medical 30mg, 60mg, 90mg & 120mg

comprimate filmate

Spagna: Etoricoxib Chanelle 30mg, 60mg, 90mg & 120mg comprimidos

EFG

#### **Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**