

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione.

Tuttavia va usato in modo accurato per ottenere i migliori risultati.

- **Conservare questo foglio potreste avere bisogno di leggerlo di nuovo**
- **Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.**
- **Consultate il medico se il disturbo non si risolve o peggiora dopo un breve periodo di trattamento.**

PanOxyl® crema
Benzoil perossido 4%

Composizione

100 g di crema contengono: benzoil perossido 4%; Eccipienti: alcool cetilico; Promulgen G, simeticone emulsione; propilenglicole alginato; dimetilisorbide, fragranza X-23304; acqua purificata.

Come si presenta

Il contenuto della confezione di PanOxyl crema è di 40 g.

Che cosa è

PanOxyl crema è un preparato antiacne per uso topico contenente Benzoil perossido.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd - Finisklin Business Park - Sligo - Irlanda

Produttore e controllore finale

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd - Sligo (Irlanda)

Perché si usa

PanOxyl crema si usa per il trattamento delle forme moderate di acne.

Quando non deve essere usato

PanOxyl crema non deve essere utilizzato dai pazienti con ipersensibilità nota verso i componenti o altre sostanze chimicamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso il Benzoil perossido.

Quando deve essere usato solo dopo aver consultato il medico

Gravidanza e allattamento (vedere cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento).

Consultare il medico nei casi di contemporanea utilizzo di:

- preparati contenenti cheratolitici quali salicilati o zolfo.
- Preparati topici contenenti derivati della vitamina A.

Uso pediatrico (vedi *È importante sapere che*).

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza e nell'allattamento PanOxyl crema deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il medico nel caso sospettiate una gravidanza o desideriate pianificare una maternità. PanOxyl crema non deve essere usato durante l'ultimo mese di gravidanza

Precauzioni per l'uso

PanOxyl crema deve essere applicato sulla pelle.

La sicurezza e l'efficacia di PanOxyl crema non è stata valutata nei bambini in quanto l'acne volgare raramente si presenta nell'infanzia.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale:

Non usate PanOxyl crema, salvo diversa prescrizione medica, se state seguendo una terapia a base di:

- cheratolitici quali salicilati o zolfo.
- preparati topici contenenti derivati della vitamina A.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

Nei bambini PanOxyl crema deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Evitare il contatto con gli occhi, bocca, mucose. Usare con cautela quando si applica su zone sensibili quali ad esempio il collo. Il propilenglicole alginato può provocare irritazione della pelle. L'alcool stearilico e l'alcool cetilico possono comportare reazioni cutanee localizzate (p.e. dermatiti da contatto). Si raccomanda di ridurre al minimo l'esposizione al sole ed alle lampade solari abbronzanti.

Il prodotto può decolorare i capelli ed i tessuti colorati.

Non sono noti effetti sulla guida e sull'uso di macchine.

Come usare questo medicinale

Quanto

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Gli adulti devono applicare PanOxyl crema sulla zona colpita dall'acne una o due volte al giorno, dopo aver lavato con acqua e sapone.

Alla prima applicazione farsi consigliare dal medico sul quantitativo di prodotto da utilizzare in base al tipo di pelle.

Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

In genere si osserva un miglioramento dopo 4-6 settimane di trattamento.

Come

Applicare PanOxyl crema sulla zona colpita dall'acne, dopo lavaggio con acqua e sapone.

Lavarsi le mani prima e dopo aver spalmato la crema.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di assunzione accidentale di PanOxyl crema avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi

Continuare la terapia come da posologia consigliata, e avvertire il proprio medico.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Nessun effetto.

Effetti indesiderati

È possibile la comparsa in occasione delle prime applicazioni di lieve bruciore, moderato arrossamento e desquamazione per qualche giorno. Nelle prime settimane di trattamento può verificarsi un improvviso aumento della desquamazione nella maggior parte dei pazienti; tale effetto non è dannoso e scomparirà in uno o due giorni interrompendo temporaneamente il trattamento.

Possono comparire un gonfiore al volto accompagnato da rossore e prurito che scompaiono dopo poco tempo.

Come per tutti i preparati a base di Benzoin perossido possono a volte comparire casi di dermatite allergica da contatto.

Quando si presentano questi effetti collaterali è opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati anche non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Il prodotto integro e correttamente conservato ha una validità di 18 mesi.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco Ottobre 2011