Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Delecit 1g/4ml soluzione iniettabile

Colina alfoscerato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Delecit e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit
3. Come prendere Delecit
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Delecit
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Delecit e a cosa serve

Delecit appartiene ad un gruppo di farmaci detti psicostimolanti in quanto la sostanza attiva contenuta, la colina alfoscerato, viene utilizzata per stimolare le funzioni del cervellonei pazienti anziani.
Delecit viene utilizzato per trattare i sintomi e i segni di malattie degenerative del cervello dell'anziano, causate anche da un'insufficiente circolazione del sangue nel cervello, oppure per curare i disturbi di conoscenza e disorientamento che si manifestano con:
- mancanza di memoria
- confusione e perdita dell'orientamento
- calo di motivazione ed iniziativa
- riduzione dell'attenzione.

È inoltre indicato per trattare nell'anziano i problemi del comportamento e delle relazioni affettive come:
- emotività,
- irritabilità,
- indifferenza all'ambiente che lo circonda
- passività.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit

Non prenda Delecit
- se è allergico a colina alfoscerato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Delecit.

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Altri medicinali e Delecit
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Non sono note interazioni del prodotto con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere Delecit in gravidanza perché non è previsto l'uso di questo medicinale in tale situazione. Comunque studi specifici hanno evidenziato la mancanza di effetti tossici negativi.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Delecit non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

3. Come prendere Delecit

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di una fiala al giorno per via intramuscolare o endovenosa.
Il suo medico effettuerà la somministrazione endovenosa lentamente.

Se lo ritiene necessario, il suo medico può aumentarle il dosaggio.

Istruzioni per l'apertura delle fiale
Per aprire correttamente le fiale, deve seguire le seguenti istruzioni:



La linea di apertura è sotto il puntino colorato.



Posizioni la fiala come indicato nella figura.



Per aprire le fiale appoggi il pollice sul puntino colorato e spinga all'indietro.

Se prende più Delecit di quanto deve
In caso di dosaggio eccessivo, si rivolga immediatamente al suo medico, o raggiunga il più vicino ospedale, dove provvederanno ad assicurarle le cure adeguate.

Se dimentica di prendere Delecit
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Se interrompe il trattamento con Delecit
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dato che è naturalmente presente nell'organismo umano, la somministrazione anche per lunghi periodi di colina alfoscerato generalmente non crea problemi di tollerabilità.

Durante il trattamento con Delecit potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati, dei quali non è possibile stimare la frequenza, per cui il medico potrebbe ridurle la dose:

Effetti che riguardano lo stomaco:
- nausea

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Delecit

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota variazioni nell'aspetto della soluzione, che deve essere limpida ed incolore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Delecit

- Il principio attivo è: Colina alfoscerato. Ogni fiala da 4 ml contiene 1000 mg di colina alfoscerato

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

- L’altro componente è l’acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell’aspetto di Delecit e contenuto della confezione

Delecit soluzione iniettabile è disponibile in astuccio di cartone contenente 3 o 5 fiale di vetro incolore da 4 ml alloggiate in cassonetto di materiale plastico.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Neopharmed Gentili S.p.A.
Via San Giuseppe Cottolengo, 15 – 20143 Milano

Produttore
ITALFARMACO S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: …….

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Delecit 400 mg capsule molli

Colina alfoscerato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Cos'è Delecit e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit
3. Come prendere Delecit
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Delecit
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Delecit e a cosa serve

Delecit appartiene ad un gruppo di farmaci detti psicostimolanti in quanto la sostanza attiva contenuta, la colina alfoscerato, viene utilizzata per stimolare le funzioni del cervello nei pazienti anziani.
Delecit viene utilizzato per trattare i sintomi e i segni di malattie degenerative del cervello dell'anziano, causate anche da un'insufficiente circolazione del sangue nel cervello, oppure per curare i disturbi di conoscenza e disorientamento che si manifestano con:

- mancanza di memoria,
- confusione e perdita dell'orientamento,
- calo di motivazione ed iniziativa
- riduzione dell'attenzione.

È inoltre indicato per trattare nell'anziano i problemi del comportamento e delle relazioni affettive come:
- emotività,
- irritabilità,
- indifferenza all'ambiente che lo circonda,
- passività.

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit

Non prenda Delecit
- se è allergico a colina alfoscerato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Delecit.

Altri medicinali e Delecit
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Non sono note interazioni del prodotto con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere Delecit in gravidanza perché non è previsto l'uso di questo medicinale in tale situazione. Comunque studi specifici hanno evidenziato la mancanza di effetti tossici negativi.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Delecit non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

Delecit contiene etile p-idrossibenzoato sodico e **propile p-idrossibenzoato sodico**
Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate)

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Delecit

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 capsula 2- 3 volte al giorno.
Se lo ritiene necessario, il suo medico può aumentarle il dosaggio.

Se prende più Delecit di quanto deve
In caso di dosaggio eccessivo, si rivolga immediatamente al suo medico, o raggiunga il più vicino ospedale, dove provvederanno ad assicurarle le cure adeguate.

Se dimentica di prendere Delecit
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Se interrompe il trattamento con Delecit
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dato che è naturalmente presente nell'organismo umano, la somministrazione anche per lunghi periodi di colina alfoscerato generalmente non crea problemi di tollerabilità.

Durante il trattamento con Delecit potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati, dei quali non è possibile stimare la frequenza, per cui il medico potrebbe ridurle la dose:

Effetti che riguardano lo stomaco:
- nausea

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Delecit

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Delecit

- Il principio attivo è: Colina alfoscerato. Ogni capsula di gelatina molle contiene 400 mg di colina alfoscerato
- Gli altri componenti sono: acqua depurata, glicerolo.

I Costituenti della capsula sono: gelatina, esitolo, sorbitani, **etile p-idrossibenzoato sodico**, **propile p-idrossibenzoato sodico** (vedere paragrafo 2), titanio biossido (E 171), ferro ossido-ico (E 172).

Descrizione dell'aspetto di Delecit e contenuto della confezione
Capsule di gelatina molle ovoidali opache di colore giallo, in blister di PVC opaco/Al. Astuccio di cartone contenente 14 capsule.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Neopharmed Gentili S.p.A.

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Via San Giuseppe Cottolengo, 15 – 20143 Milano

Produttore
Italfarmaco S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 330
20126 Milano

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: ……

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Delecit 600 mg/7 ml soluzione orale

Colina alfoscerato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:
1. Cos'è Delecit e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit
3. Come prendere Delecit
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Delecit
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Delecit e a cosa serve
Delecit appartiene ad un gruppo di farmaci detti psicostimolanti in quanto la sostanza attiva contenuta, la colina alfoscerato, viene utilizzata per stimolare le funzioni del cervello nei pazienti anziani.
Delecit viene utilizzato per trattare i sintomi e i segni di malattie degenerative del cervello dell'anziano, causate anche da un'insufficiente circolazione del sangue nel cervello, oppure per curare i disturbi di conoscenza e disorientamento che si manifestano con:
- mancanza di memoria
- confusione e perdita dell'orientamento
- calo di motivazione ed iniziativa
- riduzione dell'attenzione.

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

È inoltre indicato per trattare nell'anziano i problemi del comportamento e delle relazioni affettive come:

- emotività,
- irritabilità,
- indifferenza all'ambiente che lo circonda,
- passività.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Delecit

Non prenda Delecit

- se è allergico a colina alfoscerato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Delecit.

Altri medicinali e Delecit
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Non sono note interazioni del prodotto con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere Delecit in gravidanza perché non è previsto l'uso di questo medicinale in tale situazione. Comunque studi specifici hanno evidenziato la mancanza di effetti tossici negativi.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Delecit non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

Delecit contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato
Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Questo medicinale contiene 23,04 mg di **alcol (etanolo)** in ogni flaconcino o bustina da 7 ml che è equivalente a 3,29 mg/ml. La quantità in 7 ml di questo medicinale è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 7 ml di soluzione (un flaconcino/bustina), cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Delecit

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 flaconcino o 1 bustina da prendere 2 volte al giorno.
Se lo ritiene necessario, il suo medico può aumentarle il dosaggio

Se prende più Delecit di quanto deve
In caso di dosaggio eccessivo, si rivolga immediatamente al suo medico, o

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

raggiunga il più vicino ospedale, dove provvederanno ad assicurarle le cure adeguate.

Se dimentica di prendere Delecit
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Se interrompe il trattamento con Delecit
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Dato che è naturalmente presente nell'organismo umano, la somministrazione anche per lunghi periodi di colina alfoscerato generalmente non crea problemi di tollerabilità.

Durante il trattamento con Delecit potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati, dei quali non è possibile stimare la frequenza, per cui il medico potrebbe ridurle la dose:

Effetti che riguardano lo stomaco:
- nausea

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Delecit

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota variazioni nell'aspetto della soluzione che deve essere limpida ed incolore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Cosa contiene Delecit

- Il principio attivo è: Colina alfoscerato. Un contenitore o una bustina monodose da 7 ml contengono 600 mg di colina alfoscerato
- Gli altri componenti sono: **metile p-idrossibenzoato**, **propile p-idrossibenzoato** (vedere paragrafo 2), saccarina sodica, aroma arancio, acqua depurata

Descrizione dell'aspetto di Delecit e contenuto della confezione
Soluzione per uso orale
Astuccio di cartone contenente 10 contenitori monodose da 7 ml in vetro bruno.
Astuccio di cartone contenente 14 bustine monodose da 7 ml in poliestere, alluminio e polietilene.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Neopharmed Gentili S.p.A.
Via San Giuseppe Cottolengo, 15 – 20143 Milano

Produttore

Soluzione orale – 10 contenitori monodose:
Mipharm S.p.A.
Via B. Quaranta, 12
20141 Milano (MI), Italia

Oppure

Italfarmaco S.A.
San Rafael 3,
28108 Alcobendas, Madrid, Spain

Soluzione orale – 14 bustine monodose:
Special Product's Line S.p.A.
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1
03012 Anagni (FR), Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: ……

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 30/12/2022
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).