

ISCHEMOL A 0,05% + 0,1% collirio, soluzione
Tetrizolina cloridrato + Clorfeniramina maleato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è ISCHEMOL A e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ISCHEMOL A
3. Come usare ISCHEMOL A
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ISCHEMOL A
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ISCHEMOL A e a cosa serve

ISCHEMOL A collirio, soluzione è un medicinale contenente tetrizolina, un vasocostrittore che restringe i piccoli vasi del sangue ad azione decongestionante, e clorfeniramina, un antistaminico.

Ischemol A è indicato negli adulti e nei bambini di età superiore a 3 anni per il trattamento di forme allergiche ed in caso di arrossamento (iperemia) a carico di palpebre, congiuntiva ed apparato lacrimale (annessi oculari). Stati di congestione ed edema della congiuntiva.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare ISCHEMOL A

Non usi/dia al bambino Ischemol A se lei/il bambino:

- è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),
- soffre di glaucoma ad angolo stretto (aumento della pressione interna dell'occhio con danneggiamento progressivo del nervo ottico) o di altre gravi malattie dell'occhio,
- ha meno di 3 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare/dare al bambino Ischemol A.

In particolare, informi il medico se lei/il bambino:

- soffre di pressione alta (ipertensione arteriosa),
- soffre di disturbi al cuore,
- soffre di disturbi della tiroide (ipertiroidismo),
- soffre di diabete;
- è in trattamento con farmaci per la depressione (antidepressivi).

In questi pazienti, il medicinale, pur presentando scarso assorbimento generale, deve essere usato con cautela. Il medico farà particolare attenzione se lei/il bambino presenta infezioni, pus, corpi estranei nell'occhio, danni meccanici e da calore.

Bambini e adolescenti

Non dia Ischemol A a bambini sotto i 3 anni di età.

L'uso nei bambini sopra i 3 anni di età richiede l'approvazione del medico.

Altri medicinali e Ischemol A

Informi il medico o il farmacista se lei/il bambino sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Usi/dia al bambino Ischemol A solo dopo aver consultato il medico se lei/il bambino è in trattamento con farmaci antidepressivi.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare Ischemol A durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

A causa della presenza di un antistaminico, che può causare una lieve sonnolenza, la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari è ridotta durante l'uso del farmaco.

Ischemol A contiene benzalconio cloruro

Può causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

3. Come usare ISCHEMOL A


Usi/dia al bambino questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e bambini di età superiore a 3 anni

La dose raccomandata è 1-2 gocce, 2-5 volte al giorno.

Istruzioni per l'uso

Instillare nel sacco congiuntivale.



PER APRIRE
PREMERE
E SVITARE

Se usa/dà al bambino più Ischemol A di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Ischemol A avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Il prodotto, se accidentalmente ingerito o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici.

Sintomi

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Ischemol A, lei/il bambino potrebbe manifestare sedazione spiccata.

Terapia

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Ischemol A il medico adatterà la terapia idonea di supporto.

Se dimentica di usare/dare al bambino Ischemol A

Non usi/dia al bambino una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Ischemol A

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In caso di persistere o aggravarsi dei sintomi dopo breve periodo di trattamento, sospenda l'uso e consulti il medico.

Se manifesta fenomeni di sensibilizzazione con Ischemol A, **sospenda immediatamente** il trattamento e informi il medico che valuterà se istituire una terapia idonea.

Gli ulteriori effetti indesiderati che possono manifestarsi durante l'uso di Ischemol A sono i seguenti:

Effetti che riguardano l'occhio

dilatazione della pupilla, aumento della pressione interna dell'occhio (pressione endoculare)

Effetti che riguardano lo stomaco e l'intestino

nausea

Effetti che riguardano il sistema nervoso

mal di testa (cefalea)

Effetti che riguardano la circolazione del sangue

pressione alta (ipertensione), disturbi al cuore

Effetti che riguardano il metabolismo e la nutrizione

quantità di glucosio nel sangue superiore al normale (iperglicemia)

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se lei/il bambino manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione [all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ISCHEMOL A

Non conservare a temperatura superiore a 30°C

Il medicinale non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ischemol A

- I principi attivi sono Tetrizolina cloridrato (0,05 g in 100 ml di soluzione), Clorfeniramina maleato (0,1 g in 100 ml di soluzione)
- Gli altri componenti sono saccarosio, sodio cloruro, **benzalconio cloruro** (vedere paragrafo 2. Ischemol A contiene benzalconio cloruro), disodio edetato, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Ischemol A e contenuto della confezione

ISCHEMOL A è un collirio, soluzione, disponibile in una confezione contenente 1 flacone con contagocce da 10 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

THEA FARMA S.p.A.

Via Giotto, 36

20145 MILANO

Produttore

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50

20019 Settimo Milanese (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il