

FLUDARENE® Cromocarb dietilammina “200 mg capsule rigide” 30 capsule

Informazioni complete sulla prescrizione sono riportate sulla scheda tecnica del prodotto, disponibile a medici e farmacisti.

COMPOSIZIONE

Ogni capsula di **FLUDARENE** contiene:

principio attivo: Cromocarb sale di dietilammonio (2-Cromon-carbossilato di dietilammonio) 200 mg ;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale idrata;

Costituenti della capsula: gelatina, titanio diossido.

FORMA FARMACEUTICA

Capsule rigide da 200 mg (Confezione da 30 capsule).

CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA

FLUDARENE è un farmaco oftalmologico, ad attività vasculotropica.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO

THEA FARMA S.p.A. – Via Giotto, 36 – 20145 MILANO

OFFICINA DI PRODUZIONE e CONTROLLO

ALFA WASSERMANN S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1 - Alanno (PE)

INDICAZIONI

Stati di fragilità capillare.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità a qualsiasi componente del prodotto.

PRECAUZIONI

Consigliabile l'assunzione del farmaco durante i pasti principali.

Da usare sotto il diretto controllo del medico.

Usa in Gravidanza e Allattamento

Nelle donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico.

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE E INTERAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE

Non sono note interazioni medicamentose.

AVVERTENZE SPECIALI

Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

Non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

DOSAGGIO, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Una capsula da 200 mg tre volte al giorno ai pasti principali.

Nelle affezioni a carattere degenerativo e/o evolutivo (retinopatia diabetica, ipertensiva, arteriosclerotica, ecc.) tenuto anche conto dell'ottima tollerabilità del farmaco, il trattamento può essere protratto per diversi mesi.

Sovradosaggio

Non sono noti effetti tossici da sovradosaggio.

EFFETTI COLLATERALI

FLUDARENE è di solito ben tollerato. Raramente sono stati segnalati lievi disturbi a carico dell'apparato gastroenterico (gastralgie, nausea, ecc.).

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Data ultima revisione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: Maggio 2012