

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Etoricoxib Zydus France 30 mg compresse rivestite con film
Etoricoxib Zydus France 60 mg compresse rivestite con film
Etoricoxib Zydus France 90 mg compresse rivestite con film
Etoricoxib Zydus France 120 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Etoricoxib Zydus France e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Etoricoxib Zydus France
3. Come prendere Etoricoxib Zydus France
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Etoricoxib Zydus France
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Etoricoxib Zydus France e a cosa serve

Etoricoxib Zydus France fa parte di un gruppo di medicinali chiamati inibitori selettivi della COX-2. Questi appartengono a una famiglia di medicinali noti come farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Etoricoxib Zydus France aiuta a ridurre il dolore e il gonfiore (infiammazione) a livello delle articolazioni e dei muscoli di persone con artrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e gotta.

Etoricoxib Zydus France è utilizzato anche per il trattamento a breve termine del dolore moderato in seguito a chirurgia dentale.

Che cos'è l'artrosi?

L'artrosi è una malattia delle articolazioni. Essa è causata dal progressivo deterioramento delle cartilagini che ricoprono le estremità delle ossa. Questo fatto comporta gonfiore (infiammazione), dolore, dolorabilità, rigidità e disabilità.

Cos'è l'artrite reumatoide?

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria a lungo termine delle articolazioni, che causa dolore, rigidità, gonfiore e perdita progressiva dei movimenti nelle articolazioni colpite. Può inoltre causare infiammazione in altre parti del corpo.

Cos'è la gotta?

La gotta è una malattia con improvvisi e ricorrenti attacchi di infiammazione molto dolorosa e arrossamento delle articolazioni. È causata dal deposito di cristalli minerali nelle articolazioni.

Cos'è la spondilite anchilosante?

La spondilite anchilosante è una malattia infiammatoria della colonna vertebrale e delle grandi articolazioni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Etoricoxib Zydus France

Non prenda Etoricoxib Zydus France

- se è allergico all'etoricoxib o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è allergico ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), compreso l'acido acetilsalicilico e gli inibitori della COX-2 (ciclossigenasi-2) (vedere anche paragrafo 4, *Possibili effetti indesiderati*)
- se ha un'ulcera dello stomaco in fase attiva o un sanguinamento dello stomaco o dell'intestino in fase attiva
- se ha una grave malattia al fegato
- se ha una grave malattia al rene
- se è incinta, o c'è la possibilità che sia incinta, o se allatta (vedere anche paragrafo 2, *Gravidanza e allattamento*)
- se ha un'età inferiore a 16 anni
- se ha una malattia infiammatoria dell'intestino, come malattia di Crohn, colite ulcerosa o colite
- se il medico le ha diagnosticato problemi cardiaci come insufficienza cardiaca (di grado moderato o grave), angina (dolore toracico); o se ha avuto un attacco cardiaco; o se è stato sottoposto ad intervento di bypass coronarico; se ha avuto un'arteropatia periferica (ridotta circolazione a gambe e piedi a causa di arterie ristrette o occluse) o se ha avuto qualsiasi tipo di ictus (incluso mini-ictus, attacco ischemico transitorio o TIA). L'etoricoxib può aumentare lievemente il rischio di attacco cardiaco e di ictus; per questo motivo non deve essere usato in persone che hanno già avuto problemi di cuore o ictus
- se ha una pressione sanguigna elevata che non viene controllata dal trattamento (si rivolga al medico o al farmacista se non è sicuro che la pressione sanguigna sia sotto adeguato controllo).

Se pensa che una qualsiasi di queste condizioni la riguardi, non prenda queste compresse prima di aver consultato il medico.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Etoricoxib Zydus France se:

- ha una storia di sanguinamenti o ulcere dello stomaco
- è disidratato, ad esempio a causa di un episodio prolungato di vomito o diarrea
- ha un gonfiore dovuto a ritenzione di liquidi
- ha una storia di insufficienza cardiaca o qualsiasi altra forma di malattia del cuore
- ha una storia di alta pressione sanguigna. In alcune persone Etoricoxib Zydus France, specialmente ad alte dosi, può aumentare la pressione sanguigna, e il medico periodicamente controllerà la sua pressione sanguigna
- ha una storia di malattie del fegato o del rene
- è in terapia per un'infezione; Etoricoxib Zydus può mascherare o nascondere una febbre, che è un segno di infezione
- è una donna che sta tentando di rimanere incinta (vedere anche paragrafo 2, *Non prenda Etoricoxib Zydus France*)
- è un anziano (età superiore ai 65 anni)
- ha diabete, colesterolo alto o abitudine al fumo. Queste sono condizioni che possono aumentare il rischio di malattia cardiaca.

Se ha dei dubbi su qualsiasi delle condizioni appena menzionate, **ne parli con il medico prima di prendere Etoricoxib Zydus France** per verificare se il medicinale sia adatto a lei.

Etoricoxib Zydus France ha la stessa efficacia sia nel paziente più giovane sia in quello più anziano. Se lei è anziano (età superiore ai 65 anni), il medico la controllerà in modo appropriato. Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti anziani.

Bambini e adolescenti

Non somministri Etoricoxib Zydus France a bambini o adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

Altri medicinali ed Etoricoxib Zydus France

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare, se lei sta prendendo una qualsiasi delle seguenti medicine, è possibile che il medico richieda dei controlli per verificare se queste medicine funzionino bene una volta che lei ha iniziato a prendere Etoricoxib Zydus France:

- fluidificanti del sangue (anticoagulanti), come il warfarin
- rifampicina (un antibiotico)
- metotrexato (un farmaco usato per la soppressione del sistema immunitario e spesso utilizzato nell'artrite reumatoide)
- farmaci utilizzati per la pressione sanguigna elevata e l'insufficienza cardiaca chiamati ACE-inibitori e bloccanti dei recettori dell'angiotensina, come ad esempio enalapril e ramipril, e losartan e valsartan
- litio (un medicinale usato per il trattamento di alcuni tipi di depressione)
- diuretici
- ciclosporina o tacrolimus (farmaci usati per la soppressione del sistema immunitario)
- digossina (un farmaco per il trattamento dell'insufficienza cardiaca e del ritmo cardiaco irregolare)
- minoxidil (un farmaco per il trattamento della pressione alta)
- salbutamolo compresse o soluzione orale (un farmaco per il trattamento dell'asma)
- contraccettivi orali
- terapia ormonale sostitutiva
- acido acetilsalicilico, perché il rischio di ulcere allo stomaco è più elevato se prende Etoricoxib Zydus France con acido acetilsalicilico. Etoricoxib Zydus France può essere assunto con acido acetilsalicilico a bassa dose. Se lei è in cura con acido acetilsalicilico a bassa dose per la prevenzione di attacchi cardiaci o ictus, non deve interrompere il trattamento con acido acetilsalicilico senza consultare il medico. Non deve prendere alte dosi di acido acetilsalicilico o altri medicinali antinfiammatori mentre prende Etoricoxib Zydus France.

Etoricoxib Zydus France con cibi e bevande

L'inizio dell'effetto di Etoricoxib Zydus France può essere più rapido in caso di assunzione lontano dai pasti.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Etoricoxib Zydus France compresse non deve essere preso durante la gravidanza. Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, non prenda le compresse. Se resta incinta, smetta di prendere le compresse e consulti il medico. Se ha dubbi o se ha bisogno di maggiori informazioni consulti il medico.

Allattamento

Non deve allattare durante il trattamento con Etoricoxib Zydus France. Non è noto se Etoricoxib Zydus France sia escreto nel latte materno. Se sta allattando o prevede di allattare, consulti il medico prima di prendere Etoricoxib Zydus France.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Alcuni pazienti che prendevano Etoricoxib Zydus France hanno riferito capogiro e sonnolenza. Non guidi e non utilizzi attrezzi o macchinari se avverte capogiro o sonnolenza.

Etoricoxib Zydus France contiene lattosio

Se il medico le ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, consulti il medico prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Etoricoxib Zydus France

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Non prenda una dose superiore a quella raccomandata per la sua malattia. Il medico valuterà periodicamente il trattamento. È importante che lei usi la dose più bassa in grado di controllare il dolore.

La dose raccomandata è:

Artrosi

La dose raccomandata è di 30 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino a una dose massima di 60 mg (equivalenti a 2 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno.

Artrite reumatoide

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno.

Spondilite anchilosante

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno.

Stati dolorosi acuti

Etoricoxib deve essere usato solo durante il periodo del dolore acuto.

Gotta

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 4 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno, che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente a un massimo di 8 giorni di trattamento.

Dolore postoperatorio da chirurgia dentale

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 3 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 30 mg) una volta al giorno, limitatamente a un massimo di 3 giorni di trattamento.

Artrosi

La dose raccomandata è di 30 mg (non ottenibile con il dosaggio da 60 mg) una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino a una dose massima di 60 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 60 mg) una volta al giorno.

Artrite reumatoide

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 60 mg. Per il trattamento dell'artrite reumatoide, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Spondilite anchilosante

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 60 mg. Per il trattamento della spondilite anchilosante, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Stati dolorosi acuti

Etoricoxib deve essere usato solo durante il periodo del dolore acuto.

Gotta

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 2 compresse rivestite con film di Etoricoxib Zydus France da 60 mg) una volta al giorno, che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente a un massimo di 8 giorni di trattamento.

Dolore postoperatorio da chirurgia dentale

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno, limitatamente a un massimo di 3 giorni di trattamento. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 60 mg. Per il trattamento del dolore postoperatorio da chirurgia dentale è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Artrosi

La dose raccomandata è di 30 mg una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino a una dose massima di 60 mg una volta al giorno.

Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 90 mg. Per il trattamento dell'artrosi, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 30 mg).

Artrite reumatoide

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 90 mg) una volta al giorno.

Spondilite anchilosante

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 90 mg) una volta al giorno.

Stati dolorosi acuti

Etoricoxib deve essere usato solo durante il periodo del dolore acuto.

Gotta

La dose raccomandata è di 120 mg una volta al giorno, che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente a un massimo di 8 giorni di trattamento. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 90 mg. Per il trattamento della gotta, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 120 mg).

Dolore postoperatorio da chirurgia dentale

La dose raccomandata è di 90 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 90 mg) una volta al giorno, limitatamente a un massimo di 3 giorni di trattamento.

Artrosi

La dose raccomandata è di 30 mg una volta al giorno, aumentabile, se necessario, fino a una dose massima di 60 mg una volta al giorno. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 120 mg. Per il trattamento dell'artrosi, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 30 mg).

Artrite reumatoide

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 120 mg. Per il trattamento dell'artrite reumatoide, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Spondilite anchilosante

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 120 mg. Per il trattamento della spondilite anchilosante, è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Stati dolorosi acuti

Etoricoxib deve essere usato solo durante il periodo del dolore acuto.

Gotta

La dose raccomandata è di 120 mg (equivalenti a 1 compressa rivestita con film di Etoricoxib Zydus France da 120 mg) una volta al giorno, che deve essere utilizzata solo per il periodo del dolore acuto, limitatamente a un massimo di 8 giorni di trattamento.

Dolore postoperatorio da chirurgia dentale

La dose raccomandata è di 90 mg una volta al giorno, limitatamente a un massimo di 3 giorni di trattamento. Questa dose non è ottenibile con Etoricoxib Zydus France 120 mg. Per il trattamento del dolore postoperatorio da chirurgia dentale è disponibile un altro dosaggio (Etoricoxib Zydus France 90 mg).

Uso nei bambini e negli adolescenti

Etoricoxib Zydus France non deve essere assunto da bambini o adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

Anziani

Non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti anziani. Come con altri medicinali, si deve agire con cautela nei pazienti anziani.

Pazienti con problemi di fegato

Se ha una **lieve** malattia del fegato non deve prendere più di 60 mg una volta al giorno.

Se ha una **moderata** malattia del fegato non deve prendere più di 30 mg una volta al giorno.

Durata della somministrazione

Non deve prendere Etoricoxib Zydus France per un periodo più lungo del necessario. Questo perché il rischio di attacco cardiaco e ictus potrebbe aumentare dopo il trattamento prolungato, soprattutto ad alte dosi.

Modo di somministrazione

Prenda Etoricoxib Zydus France per bocca una volta al giorno. Etoricoxib Zydus France può essere assunto con o senza cibo.

Se prende più Etoricoxib Zydus France di quanto deve

Non deve mai prendere più compresse di quelle raccomandate dal medico. Se prende troppe compresse di Etoricoxib Zydus France deve contattare immediatamente un medico.

Se dimentica di prendere Etoricoxib Zydus France

È importante attenersi alle dosi di Etoricoxib Zydus France prescritta dal medico. Se dovesse dimenticare una dose, il giorno seguente si limiti a riprendere il suo schema di dosaggio abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si manifesta uno dei seguenti sintomi deve interrompere la terapia con Etoricoxib Zydus France e deve contattare immediatamente il medico:

- respiro affannoso, dolore toracico, o gonfiore delle caviglie che insorgono o iniziano a peggiorare;
- colorazione gialla della cute e degli occhi (ittero) - questi sono sintomi di problemi di fegato;
- dolore di stomaco grave o continuo o feci che diventano nere;

- una reazione allergica che può comprendere problemi cutanei come ulcere o formazione di vescicole, o gonfiore di faccia, labbra, lingua, o gola che può rendere difficoltosa la respirazione.

Nel corso del trattamento con Etoricoxib Zydus France possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (può interessare più di 1 persona su 10)

- mal di stomaco.

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- cavità secca (infiammazione e dolore dopo un'estrazione dentale);
- gonfiore delle gambe e/o dei piedi dovuto a ritenzione di liquidi (edema);
- capogiro, mal di testa;
- palpitazioni (battito del cuore accelerato o irregolare), ritmo del cuore irregolare (aritmia);
- aumento della pressione sanguigna;
- respiro sibilante o respiro corto (broncospasmo);
- stitichezza, flatulenza (eccesso di gas), gastrite (infiammazione della superficie interna dello stomaco), bruciore di stomaco, diarrea, problemi di digestione (dispepsia)/fastidio allo stomaco, nausea, vomito, infiammazione dell'esofago, ulcere della bocca;
- alterazione di alcuni esami del sangue legati alla funzione del fegato;
- comparsa di lividi;
- debolezza e affaticamento, malattia simil-influenzale.

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- gastroenterite (infiammazione del tratto gastrointestinale che coinvolge sia lo stomaco che l'intestino tenue/influenza gastrointestinale), infezione delle vie respiratorie superiori, infezione del tratto urinario;
- diminuzione del numero di globuli rossi, diminuzione del numero di globuli bianchi, diminuzione delle piastrine
- ipersensibilità (una reazione allergica che comprende orticaria, che può essere abbastanza seria da richiedere un intervento medico immediato);
- aumento o diminuzione dell'appetito, aumento di peso;
- ansia, depressione, diminuzione dell'acutezza mentale; percezioni visive, sensitive o uditive non provocate da stimoli reali (allucinazioni);
- alterazione del gusto, impossibilità di dormire, sonnolenza, formicolio o intorpidimento;
- visione offuscata, irritazione e arrossamento degli occhi;
- ronzio alle orecchie, vertigine (sensazione di capogiro pur rimanendo fermi);
- anomalia del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale), frequenza cardiaca accelerata, insufficienza cardiaca, sensazione di oppressione, pressione o pesantezza al torace (angina pectoris), attacco di cuore;
- vampate, ictus, mini-ictus (attacco ischemico transitorio), grave aumento della pressione sanguigna, infiammazione dei vasi sanguigni;
- tosse, affanno, sangue dal naso;
- gonfiore dello stomaco o dell'intestino, cambiamenti delle abitudini intestinali, bocca secca, ulcera dello stomaco, infiammazione della superficie interna dello stomaco che può diventare grave e provocare sanguinamento, sindrome del colon irritabile, infiammazione del pancreas;
- gonfiore della faccia, eruzione della pelle o prurito della pelle, arrossamento della pelle;
- crampi/spasmi muscolari, dolore/rigidità muscolare;
- livelli elevati di potassio nel sangue, alterazione di alcuni esami del sangue o delle urine legati alla funzionalità del rene, seri problemi renali;
- dolore toracico.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- angioedema (una reazione allergica con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola, che può causare difficoltà di respirazione o deglutizione e diventare abbastanza grave da richiedere un intervento medico immediato), reazioni anafilattiche/anafilattoidi incluso shock (una reazione allergica grave che richiede un intervento medico immediato);
- confusione, irrequietezza;
- problemi al fegato (epatite);
- bassi livelli di sodio nel sangue;
- insufficienza epatica, colorazione gialla della cute e/o degli occhi (ittero);
- gravi reazioni cutanee.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Etoricoxib Zydus France

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola o sul blister dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale se nota danneggiamento della compressa o del rivestimento.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Etoricoxib Zydus France

- Il principio attivo è etoricoxib. Ogni compressa rivestita con film contiene 30 mg, 60 mg, 90 mg o 120 mg di etoricoxib.

- Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa:

Etoricoxib Zydus France 30 mg compresse rivestite con film

sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato [di origine vegetale]

Etoricoxib Zydus France 60 mg compresse rivestite con film

sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato [di origine vegetale]

Etoricoxib Zydus France 90 mg compresse rivestite con film

sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato [di origine vegetale]

Etoricoxib Zydus France 120 mg compresse rivestite con film

sodio laurilsolfato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato [di origine vegetale]

Rivestimento delle compresse:

Etoricoxib Zydus France 30 mg compresse rivestite con film

lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, HPMC 2910/ipromellosa, titanio diossido (E171), carminio d'indaco lacca (E132), ferro ossido (III) idrossido x H₂O (E172)

Etoricoxib Zydus France 60 mg compresse rivestite con film

lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, HPMC 2910/ipromellosa, titanio diossido (E171), carminio d'indaco lacca (E132), ferro ossido (III) idrossido x H₂O (E172)

Etoricoxib Zydus France 90 mg compresse rivestite con film

lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, HPMC 2910/ipromellosa, titanio diossido (E171)

Etoricoxib Zydus France 120 mg compresse rivestite con film

lattosio monoidrato, glicerolo triacetato, HPMC 2910/ipromellosa, titanio diossido (E171), carminio d'indaco lacca (E132), ferro ossido (III) idrossido x H₂O (E172)

Descrizione dell'aspetto di Etoricoxib Zydus France e contenuto della confezione

Compresse rivestite con film di colore da verde chiaro a verde-bluastro, rotonde, biconvesse, lisce su entrambi i lati.

Compresse rivestite con film di colore verde, rotonde, biconvesse, con 60 inciso su un lato e lisce sull'altro.

Compresse rivestite con film di colore da bianco a biancastro, rotonde, biconvesse, lisce su entrambi i lati.

Compresse rivestite con film di colore verde, rotonde, biconvesse, con 120 inciso su un lato e lisce sull'altro.

Confezioni da 28 compresse in blister di OPA/alluminio/PVC-alluminio, contenenti ciascuno 7 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

ZYDUS France
ZAC des hautes pâtures
25, rue des peupliers
92752 Nanterre
Francia

Produttore responsabile del rilascio lotti

ZYDUS France
ZAC des hautes pâtures
25, rue des peupliers
92752 Nanterre
Francia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Belgio	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Comprimé pelliculé
Germania	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten
Grecia	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Spagna	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Comprimido recubierto con película

France	Etoricoxib Zydus France 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Comprimé pelliculé
Hungary	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletta
Italia	Etoricoxib Zydus France 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Compresse rivestite con film
Paesi Bassi	Etoricoxib Zydus 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmomhulde tablet
Polonia, Portogallo	Etoricoxib Zydus
Regno Unito	Etoricoxib 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg film-coated tablets

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco