

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN 20 mg/10 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Che cos'è ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN
3. Come prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN e a cosa serve

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN è un'associazione fissa di un ACE-inibitore (enalapril) e un calcio-antagonista (lercanidipina), due farmaci che abbassano la pressione sanguigna.

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN è indicato per il trattamento della pressione alta (ipertensione) nei pazienti adulti in cui non si è raggiunto un adeguato controllo della pressione tramite la sola somministrazione di 20 mg di enalapril. ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN non deve essere usato per il trattamento iniziale dell'ipertensione.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Non prenda ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

- Se è allergico all'enalapril, alla lercanidipina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se è allergico ad un medicinale simile a ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN (ad es. farmaci chiamati ACE-inibitori o calcio antagonisti come amlodipina, felodipina, nifedipina, captopril, fosinopril, lisinopril, ramipril).
- Se ha il diabete o problemi renali e prende medicine che contengono aliskiren per ridurre la pressione sanguigna.
- Se ha superato il terzo mese di gravidanza (inoltre è meglio evitare di prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN anche nei primi mesi di gravidanza - vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento"). Se soffre di alcune malattie cardiache quali:
 - Insufficienza cardiaca congestizia non trattata (condizione in cui il cuore è incapace di pompare quantità di sangue sufficienti).
 - Ostruzione del flusso del sangue dal cuore, incluso restringimento della valvola aortica del cuore (stenosi aortica).
 - Angina pectoris instabile (angina a riposo o angina a peggioramento progressivo) (condizione caratterizzata dalla presenza di dolore al petto).
 - Attacco di cuore insorto da meno di un mese (infarto del miocardio)
- Se ha gravi problemi al fegato o ai reni e, o se e in dialisi.
- Se prende medicinali quali:
 - Medicinali usati per il trattamento delle infezioni da funghi (ad es. ketoconazolo, itraconazolo)
 - Antibiotici appartenenti alla classe dei macrolidi (ad es. eritromicina, troleandomicina)
 - Medicinali usati per il trattamento delle infezioni da virus (ad es. ritonavir) (vedere "Altri medicinali e ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN")

- Se sta prendendo contemporaneamente un medicinale chiamato ciclosporina
- Insieme al pompelmo o al succo di pompelmo (vedere "ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN con cibi, bevande e alcol")
- Se ha manifestato in passato angioedema (condizione caratterizzata da gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della laringe, delle mani e dei piedi) sia per causa ereditaria che dopo un precedente trattamento con un ACE-inibitore (vedere paragrafo 4).
- Se ha una predisposizione ereditaria al gonfiore dei tessuti o se ha manifestato gonfiore dei tessuti per cause ignote (angioedema ereditario o idiopatico).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN:

- se ha problemi al cuore che causano interruzione del flusso sanguigno (ischemia)
- se ha una malattia che coinvolge il flusso sanguigno nel cervello (malattia cerebrovascolare)
- se ha problemi ai reni
- se segue una dieta iposodica
- se i livelli degli enzimi del fegato sono alti o se manifesta l'ittero
- se i livelli dei globuli bianchi sono ridotti a vari livelli (leucopenia, agranulocitosi), con conseguente probabile suscettibilità alle infezioni e sintomi generali gravi
- se ha problemi del sangue, come una bassa conta piastrinica (trombocitopenia) o un ridotto numero di globuli rossi (anemia)
- Se ha una di quelle malattie del tessuto connettivo che coinvolgono i vasi sanguigni (malattie vascolari del collagene, ad es. *lupus eritematoso*, artrite reumatoide o sclerodermia)
- Se sta prendendo contemporaneamente allopurinolo (un medicinale usato per trattare la gotta), procainamide (un medicinale usato per il trattamento del battito cardiaco irregolare) o litio (usato per il trattamento di alcune forme di depressione)
- Se manifesta reazioni di ipersensibilità o gonfiore a livello dei tessuti (angioedema) durante il trattamento con enalapril e lercanidipina
- Se ha il diabete
- Se compare una tosse secca persistente
- Se c'è il rischio di un aumento dei livelli di potassio nel sangue in quanto sta assumendo integratori di potassio, agenti risparmiatori di potassio o sostituti del sale contenenti potassio
- Se l'abbassamento della pressione è inadeguato a causa della sua origine etnica (specialmente in pazienti dalla pelle nera), inoltre se è un paziente di colore deve essere consapevole che i pazienti di colore hanno un rischio di reazione allergica maggiore con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e della gola, con difficoltà nella deglutizione e nella respirazione durante l'assunzione di ACE-inibitori
- Se sta assumendo uno dei seguenti medicinali usati per trattare la pressione alta del sangue:
 - un "antagonista del recettore dell'angiotensina II" (AIIRA) (anche noti come sartani - per esempio valsartan, telmisartan, irbesartan), o se sta assumendo aliskiren, in particolare se soffre di problemi renali correlati al diabete
- Se pensa sia in corso una gravidanza (o che possa instaurarsi una gravidanza), in quanto ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN non è raccomandato nelle prime fasi della gravidanza e non deve essere assunto se è oltre il terzo mese di gravidanza, poiché può causare danni gravi al bambino se usato in questa fase (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento").

Il medico può controllare la sua funzionalità renale, la pressione del sangue, e la quantità di elettroliti (ad esempio il potassio) nel sangue a intervalli regolari.

Vedere anche quanto riportato alla voce " Non prenda ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN".

Se necessita di una terapia di desensibilizzazione per il veleno di insetti (per esempio api o vespe), ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN deve essere temporaneamente sostituito da un medicinale appropriato di un altro tipo. In caso contrario, possono manifestarsi sintomi potenzialmente fatali. Queste reazioni possono verificarsi anche dopo le punture di insetto (per esempio punture di api o vespe).

L'uso di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN mentre è in corso la dialisi o il trattamento di condizioni caratterizzate da elevate quantità di lipidi nel sangue, può causare reazioni di ipersensibilità gravi e perfino un collasso potenzialmente fatale.

Riferisca al medico che sta assumendo ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN o che necessita della dialisi, così che il medico possa tenerne conto al momento della prescrizione del trattamento.

Se deve sottoporsi a breve ad un'operazione o deve ricevere un'anestesia (inclusa un'anestesia dentale), comunichi al medico che sta assumendo ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN, poiché può verificarsi un improvviso abbassamento della pressione durante l'anestesia.

Si rivolga immediatamente al medico se manifesta uno dei seguenti segni o sintomi:

- Gonfiore del viso, degli arti, delle labbra, delle mucose, della lingua e/o della laringe, o mancanza di respiro
- Ingiallimento della pelle e delle mucose
- Febbre, gonfiore dei linfonodi e/o infiammazione della gola.

In questi casi, deve interrompere l'assunzione di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN e il medico adotterà le misure appropriate (vedere paragrafo 4).

L'uso di questo medicinale richiede un monitoraggio medico regolare. Pertanto, si sottoponga assolutamente alle analisi di laboratorio e agli esami prescritti dal medico.

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini perché non ci sono informazioni sull'efficacia e la sicurezza del suo uso nei bambini.

Altri medicinali e ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Quando ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN è assunto insieme ad alcuni medicinali, il suo effetto o quello degli altri medicinali possono risultare intensificati o ridotti, o alcuni effetti indesiderati possono presentarsi più frequentemente.

L'effetto relativo all'abbassamento della pressione può essere intensificato se prende uno dei seguenti medicinali insieme a ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN:

- Ciclosporina (un medicinale usato per sopprimere il sistema immunitario)
- Medicinali orali contro le infezioni da funghi come il chetoconazolo e l'itraconazolo
- Agenti usati contro le infezioni da virus come il ritonavir
- Antibiotici della classe dei macrolidi come l'eritromicina e la troleandomicina
- La cimetidina, un medicinale antiulcera, a dosi giornaliere superiori a 800 mg
- Diuretici come l'idroclorotiazide, il clortalidone, la furosemide, il triamterene, l'amiloride, l'indapamide, lo spironolactone o altri medicinali che abbassano la pressione
- Altri medicinali vasodilatatori come il gliceril trinitrato e i nitrati organici (isosorbide) o agenti anestetici
- Farmaci per la depressione chiamati antidepressivi triciclici
- Farmaci per problemi mentali chiamati antipsicotici
- Midazolam (un farmaco che aiuta a dormire)

L'effetto relativo all'abbassamento della pressione può essere indebolito se usa uno dei seguenti medicinali insieme a ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN:

- Alcuni antidolorifici (per esempio il paracetamolo, l'ibuprofene, il naprossene, l'indometacina o l'aspirina a meno che non siano assunti a bassi dosaggi)
- Medicinali che agiscono sui vasi sanguigni (per esempio noradrenalina, isoprenalina, dopamina, salbutamolo)
- Alcuni farmaci per la tosse e il raffreddore e farmaci per la riduzione del peso contenenti una sostanza chiamata "agente simpaticomimetico"
- Alcuni farmaci per il dolore o l'artrite tra cui la terapia con oro

- Farmaci usati per il trattamento delle convulsioni come la fenitoina e la carbamazepina
- La rifampicina (un farmaco usato per il trattamento della tubercolosi)
- Beta-bloccanti (farmaci per il trattamento di problemi di pressione alta e di cuore)

Se usa la digossina (un medicinale che ha effetto sul tono del muscolo cardiaco), chiedi al medico a quali segni deve fare attenzione.

Se usa i diuretici risparmiatori di potassio (spironolattone) o supplementi di potassio, i livelli di potassio nel sangue possono aumentare.

L'uso contemporaneo di litio carbonato e ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN può portare a tossicità da litio.

Se usa farmaci che sopprimono il sistema immunitario o medicinali contro la gotta, in rari casi può essere sensibile a infezioni gravi.

Se soffre di diabete, consideri che l'uso contemporaneo di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN e insulina o agenti antidiabetici orali come sulfoniluree e biguanidi può causare ipoglicemia (riduzione eccessiva dei livelli di zuccheri nel sangue) durante il primo mese di trattamento.

Si rivolga al medico se sta usando antistaminici come la terfenadina o l'astemizolo o agenti antiaritmici come l'amiodarone o la chinidina, l'estramustina o l'amifostina, poiché possono verificarsi alcune interazioni farmacologiche con questi agenti.

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN con cibi, bevande e alcol

Assuma ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN almeno 15 minuti prima del pasto.

Le compresse non devono essere assunte con il pompelmo o il succo di pompelmo.

L'assunzione di alcol può aumentare gli effetti di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN. Per tale ragione si consiglia di non assumere alcol o di ridurne al minimo il consumo.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Deve informare il medico se pensa sia in corso una gravidanza (o possa instaurarsi). Il medico normalmente le consiglierà di interrompere l'assunzione di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN prima di intraprendere una gravidanza o non appena lei viene a conoscenza di essere in gravidanza e le consiglierà di prendere un altro medicinale al posto di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN. ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN non è raccomandato durante le prime fasi della gravidanza, e non deve essere assunto dopo il terzo mese, in quanto può causare gravi danni al bambino.

Allattamento

Informi il medico se sta allattando al seno o se sta per iniziare l'allattamento al seno. L'allattamento dei neonati (nelle prime settimane dopo la nascita), e soprattutto dei neonati prematuri, non è raccomandato se sta assumendo ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN. Nel caso di un neonato più grande il medico deve consigliarla in merito ai benefici e ai rischi dell'assunzione di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN mentre allatta, in confronto ad altri trattamenti.

Si rivolga al medico o al farmacista per un consiglio prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli o utilizzo di macchinari

Eviti di guidare un veicolo o di usare macchinari se nota la comparsa di capogiri, debolezza, stanchezza o sonnolenza durante il trattamento con questo medicinale.

3. Come prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

A meno che il medico non le abbia dato altre indicazioni, la dose raccomandata è una compressa una volta al giorno, assunta alla stessa ora ogni giorno. La compressa deve essere preferibilmente assunta al mattino, almeno 15 minuti prima della colazione. La compressa deve essere deglutita intera con acqua.

Le compresse non devono essere prese insieme al pompelmo o al succo di pompelmo.

Se ha l'impressione che l'effetto di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN sia troppo forte o troppo debole, si rivolga al medico.

Uso nei pazienti con problemi ai reni/anziani: il suo medico deciderà la dose di farmaco da prendere in base a come funzionano i suoi reni.

Se prende più ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN di quanto deve

Se assume una dose maggiore di quella prescritta dal medico o in caso di sovradosaggio, consulti il medico immediatamente o si rechi immediatamente in ospedale e, se possibile, porti con sé le compresse e/o la confezione.

L'assunzione di una dose maggiore di medicinale rispetto alla dose corretta può determinare un eccessivo abbassamento della pressione e la comparsa di irregolarità nel ritmo cardiaco o tachicardia. Ciò può portare alla perdita di coscienza.

Inoltre un grave abbassamento della pressione può determinare una riduzione del flusso sanguigno agli organi importanti, insufficienza cardiovascolare e insufficienza renale.

Se dimentica di prendere ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Se dimentica di prendere una compressa, prenda la compressa dimenticata appena possibile a meno che non sia già il momento di prendere la dose successiva. Poi continui a prendere le compresse come di consueto. Non prenda una dose doppia lo stesso giorno.

Se interrompe il trattamento con ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Se interrompe il trattamento con ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN la pressione può aumentare nuovamente. Si rivolga al medico prima di interrompere l'assunzione di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati più frequenti (frequenza da 1% a 10%) osservati con l'uso di enalapril e lercanidipina 20 mg/10 mg sono tosse, mal di testa, capogiri, edema periferico e eruzioni cutanee.

Certi effetti indesiderati possono essere gravi.

Se alcuni dei seguenti effetti si presentano, informi immediatamente il suo medico:

- Reazione allergica con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola che può causare difficoltà nella deglutizione o respirazione.

All'inizio del trattamento con ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN può sentire debolezza o capogiri o avere visione offuscata; questo è causato da un improvviso calo della pressione e se ciò accadesse sarebbe d'aiuto sdraiarsi. Se questo le causa preoccupazione, ne parli con il medico.

Effetti indesiderati osservati con ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Comune (può colpire fino ad 1 persona su 10)

Tosse, sensazione di capogiro, mal di testa.

Non comune (può colpire fino ad 1 persona su 100)

Alterazione dei valori del sangue come la riduzione del numero di piastrine del sangue, aumento del livello di potassio nel sangue, nervosismo (ansia), sensazione di capogiro nell'alzarsi in piedi, vertigini, tachicardia, battito cardiaco veloce o irregolare (palpitazioni), improvviso arrossamento al viso, al collo o alla parte superiore del petto (flushing), bassa pressione sanguigna, dolori addominali, stipsi, sensazione di malessere (nausea), livelli alti di enzimi epatici, arrossamento della pelle, dolori articolari, aumento della frequenza

dell'eliminazione di urina, sensazione di debolezza, stanchezza, vampate di calore, gonfiore alle caviglie.

Raro (può colpire fino ad 1 persona su 1000)

Anemia, reazioni allergiche, fischi nelle orecchie (tinnito), svenimento, gola secca, mal di gola, indigestione, sensazione di salato sulla lingua, diarrea, bocca secca, ingrossamento delle gengive, reazione allergica con gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola con difficoltà nella deglutizione e respirazione, eruzione cutanea, orticaria, sveglia notturna per urinare, elevata produzione di urina, impotenza.

Effetti indesiderati aggiuntivi con enalapril o lercanidipina assunti separatamente

Enalapril

Molto comune (colpisce più di 1 persona su 10)

Vista offuscata.

Comune (colpisce meno di 1 persona su 10)

Depressione, dolore al petto, variazioni del ritmo cardiaco, angina, respiro corto, alterazione del gusto, aumento dei livelli di creatinina nel sangue (generalmente rilevato da un esame).

Non comune (colpisce meno di 1 persona su 100)

Anemia (compresa l'anemia aplastica ed emolitica), calo improvviso della pressione arteriosa, confusione, insonnia o sonnolenza, sensazione di formicolio o di insensibilità alla pelle, attacco cardiaco (probabilmente a causa di pressione sanguigna molto bassa in alcuni pazienti ad alto rischio, compresi quelli con problemi di flusso di sangue al cuore o al cervello), ictus (probabilmente a causa di pressione sanguigna molto bassa nei pazienti ad alto rischio), naso che cola, mal di gola e raucedine, asma, ridotta motilità intestinale, infiammazione del pancreas, malessere, stomaco irritato (irritazione gastrica), ulcera, anoressia, aumento della sudorazione, prurito o orticaria, perdita di capelli, funzione renale ridotta, insufficienza renale, alto livello di proteine nelle urine (misurato con un esame), crampi muscolari, sensazione generale di non star bene (malessere), temperatura alta (febbre), basso livello di zucchero o di sodio nel sangue, elevato livello di urea nel sangue (tutti rilevati con un esame del sangue).

Raro (colpisce meno di 1 persona su 1000)

Alterazioni dei valori di laboratorio come riduzione del numero dei globuli bianchi, riduzione della funzionalità del midollo osseo, malattie autoimmuni, sogni alterati o disturbi del sonno, fenomeno di Raynaud (dove mani e piedi possono diventare molto freddi e bianchi a causa del ridotto flusso di sangue), infiltrati polmonari, infiammazione del naso, polmonite, problemi al fegato come una diminuita funzione epatica, infiammazione del fegato, ittero (colorazione giallastra della cute e/o della parte bianca degli occhi), aumento dei livelli di bilirubina (misurati con un esame del sangue), eritema multiforme (macchie rosse di diverse forme sulla pelle), sindrome di Stevens-Johnson (una grave condizione della pelle per cui si ha arrossamento e desquamazione della pelle, vesciche o piaghe, o il distacco dello strato superiore della pelle), diminuzione dell'eliminazione di urina, ingrandimento della ghiandola mammaria nell'uomo.

Molto raro (colpisce meno di 1 persona su 10000)

Gonfiore intestinale (angioedema intestinale).

Lercanidipina

Raro (colpisce meno di 1 persona su 1000)

Angina pectoris (dolore al petto causato da un insufficiente apporto di sangue al cuore), vomito, bruciore di stomaco, dolore muscolare.

Molto raro (colpisce meno di 1 persona su 10000)

Dolore al petto.

I pazienti con una pre-esistente angina pectoris possono presentare un aumento della frequenza, della durata o della gravità degli attacchi con il gruppo di farmaci ai quali la lercanidipina appartiene. Si possono osservare isolati casi di infarto.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista. Si rivolga al medico o al farmacista per avere ulteriori informazioni sugli effetti indesiderati. Entrambi hanno una lista più completa degli effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Che cosa contiene ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN

- I principi attivi sono l'enalapril maleato e la lercanidipina cloridrato. Ogni compressa rivestita con film contiene: 20 mg di enalapril (come enalapril maleato) e 10 mg di lercanidipina (come lercanidipina cloridrato).
- Gli altri componenti sono: *nucleo della compressa*: sodio idrogeno carbonato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, sodio carbossimetilamido, silice colloidale anidra, magnesio stearato; *rivestimento della compressa*: ipromellosa, macrogol 6000, talco, diossido di titanio (E171), ferro ossido giallo (E172).

Descrizione dell'aspetto di ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN e contenuto della confezione

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN sono compresse rivestite con film rotonde, biconvesse, di colore da giallo a giallognolo, con un diametro di circa 9 mm e un'altezza di circa 4 mm.

ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TECNIGEN è confezionato in blister in PA/Alluminio/PVC, in confezioni da 28 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Tecnigen S.r.l.
Via Galileo Galilei 40
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

- Merckle GmbH - Ludwig-Merckle-StraÙsse 3 - 89143 Blaubeuren (Germania)
- TEVA PHARMA S.L.U. - Polígono Industrial Malpica c/C n. 4 - 50016 Saragozza (Spagna)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il