

**PRIMA DELL'USO**  
**LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE**  
**NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

**Denominazione del prodotto : PREPACORTH (0,5% Idrocortisone+5% Benzocaina)**  
**crema**

**Composizione**

100 g di crema contengono:

Principio attivo: idrocortisone acetato 500 mg, benzocaina 5 g.

Eccipienti: vaselina bianca.

**Come si presenta**

PREPACORTH si presenta in forma di crema.

Il contenuto della confezione è di 20 g.

**Che cosa è**

Antiemorroidale, preparazione topica a base di corticosteroidi.

**Titolare Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

PFIZER S.r.l, Via Isonzo 71, 04100 Latina

**Produttore e controllore finale**

DOPPEL FARMACEUTICI Srl – Cortemaggiore (PC)

**Perché si usa**

PREPACORTH si usa in caso di emorroidi esterne non complicate e loro conseguenze (ad esempio prurito anale).

**Quando non deve essere usato**

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

Come per ogni preparato cortisonico ad uso topico, l'impiego del medicinale è controindicato nelle lesioni cutanee di natura tubercolare o virale.

**Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico**

Gravidanza ed allattamento: vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento".

**E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi (emorroidi esterne, prurito anale) si fossero manifestati in passato.**

**Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento**

In gravidanza e nell'allattamento PREPACORTH deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultare il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

**Precauzioni per l'uso**

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il proprio medico.

L'efficacia e la sicurezza della benzocaina dipendono da un corretto dosaggio. Bisogna pertanto impiegare la quantità minima del preparato sufficiente ad ottenere l'effetto desiderato applicandolo con cautela nei soggetti con mucose gravemente danneggiate o sede di processi infiammatori che potrebbero causare un assorbimento eccessivo del principio attivo. Un elevato assorbimento della benzocaina può provocare gravi reazioni in particolare nei bambini e nei pazienti anziani.

Evitare il contatto con gli occhi. Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

#### **Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale**

Non sono note interazioni con altri farmaci.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

#### **E' importante sapere che**

Il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

#### **Come usare questo medicinale**

##### Quanto

2-3 volte al giorno.

**Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.**

##### Quando e per quanto tempo

**Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.**

**Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.**

##### Come

Applicare localmente uno strato sottile, tramite la cannula, per uso anale, presente nella confezione.

#### **Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale**

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di PREPACORTH avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Gli interventi di emergenza dovranno essere rivolti a contrastare i sintomi che si possono presentare.

#### **Effetti indesiderati**

Gli effetti collaterali sistemici dei preparati corticosteroidi per uso topico sono estremamente improbabili per i bassi dosaggi impiegati: in caso di insorgenza interrompere la terapia.

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.**

**Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.**

**E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.**

**Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).**

#### **Scadenza e conservazione**

60 mesi

Attenzione: non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

**TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

**Revisione del Foglio Illustrativo da parte del Ministero della Salute: Maggio 2011**

Agenzia Italiana del Farmaco