

**CALCIFOLIN 15 capsule**  
**Calcio folinato**  
*capsule da mg 15, per uso orale*

**Medicinale equivalente**

**CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Farmaci antianemici

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Il Calcifolin trova utilità, come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da metotressato. Il Calcifolin trova inoltre indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati.

**CONTROINDICAZIONI**

Ipersensibilità verso uno dei componenti.

CALCIFOLIN non deve essere somministrato per il trattamento dell'anemia perniciosa o altre anemie megaloblastiche quando la vit. B<sub>12</sub> è carente, se non in associazione alla medesima.

**PRECAUZIONI D'IMPIEGO**

Il CALCIFOLIN, somministrato nell'anemia perniciosa o in altre anemie megaloblastiche conseguenti a carenza di vit. B<sub>12</sub> può determinare remissione ematologica lasciando inalterata la progressione delle lesioni neurologiche (vedere anche controindicazioni). In questi casi il prodotto deve essere associato ad appropriata terapia con vitamina B<sub>12</sub> ed il trattamento condotto sotto controllo ematologico e neurologico. Le anemie in gravidanza conseguenti all'aumentato fabbisogno di folati possono essere migliorate o normalizzate con somministrazioni di acido folinico.

Nel trattamento del superdosaggio da antagonisti dell'acido folico la somministrazione del Calcifolin deve essere effettuata possibilmente entro 1 ora, risultando generalmente inefficace una somministrazione dopo un periodo di 4 ore. La somministrazione del farmaco deve essere eseguita con attenzione in modo da evitare pericolo di reazioni allergiche od effetti collaterali.

**INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E INTERAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE**

L'acido folinico antagonizza gli effetti degli antifolici. Agisce come "rescue" (salvataggio) nella terapia con alte dosi di metotressato e come antidoto in caso di superdosaggio.

**AVVERTENZE SPECIALI**

Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini.

**DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

- Nel trattamento delle anemie da carenza di folati la posologia è di 15-25 mg/die per 10-15 giorni.

- Nella prevenzione degli effetti tossici da metotressato, la posologia media è di 50 mg ogni 6 ore per 3 giorni consecutivi, iniziando 24 ore dopo l'infusione di metotressato.

Questa posologia può essere modificata tenuto conto degli schemi terapeutici utilizzati.

### **SOVRADOSAGGIO**

Non sono stati segnalati fino ad ora casi di sovradosaggio.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

La somministrazione del prodotto può essere seguita, anche se molto raramente, da reazioni generali di ipersensibilità.

Qualora si verificassero effetti indesiderati non descritti, comunicarlo al proprio medico curante.

### **ATTENZIONE**

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

### **COMPOSIZIONE**

Ogni capsula opercolata contiene:

#### **Principio attivo:**

Calcio folinato pentaidrato  
(eq. Ad ac. folinico mg 15) mg 19,10

#### **Eccipienti:**

Lattosio, Silice precipitata, Magnesio stearato, Cellulosa microcristallina, Gelatina, Biossido di titanio, Acqua.

### **FORMA FARMACEUTICA**

10 capsule da mg 15

### **TITOLARE A.I.C.**

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.  
VIA CONCA D'ORO, 212, 00141 - ROMA (RM).

### **OFFICINA DI PRODUZIONE**

I.BIR.N. - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l.  
Via Vittorio Grassi nn. 9/15 - 00155 Roma

### **Ultima revisione da parte dell'AIFA:**

10 agosto 2012