

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**  
**EVION 100 mg compresse rivestite**  
d,l -alfa-tocoferil acetato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è EVION e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere EVION
3. Come prendere EVION
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare EVION
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è EVION e a cosa serve**

EVION contiene il principio attivo d,l-alfa-tocoferil acetato (Vitamina E) che appartiene alla classe delle vitamine.

EVION è utilizzato per trattare la mancanza di vitamina E.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

**2. Cosa deve sapere prima di prendere EVION**

**Non prenda EVION**

- se è allergico al d,l-alfa-tocoferil acetato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- se è allergico ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico al d,l-alfa-tocoferil acetato.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere EVION se:

- ha il diabete insulino dipendente poiché la vitamina E può diminuire in misura considerevole il fabbisogno di insulina. Il medico le chiederà di effettuare regolarmente analisi del sangue aggiustando la dose, se necessario.
- sta assumendo altri medicinali tra cui digitale, contraccettivi orali, anticoagulanti orali o vitamina K per possibili interazioni ( Vedere paragrafo Altri medicinali ed EVION)

### **Altri medicinali e EVION**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico o il farmacista in particolare se sta assumendo:

- digitale (medicinale che stimola il muscolo cardiaco) poiché la Vitamina E può diminuire il fabbisogno di digitale e causare iperdigilizzazione (aumento dell'attività della digitale sul cuore.)
- anticoagulanti orali ( medicinali utilizzati per fluidificare il sangue ).
- vitamina K
- contraccettivi orali ( medicinali utilizzati per prevenire la gravidanza )
- insulina, poiché la vitamina E può diminuirne in misura considerevole il fabbisogno. Il medico le chiederà di effettuare regolarmente analisi del sangue aggiustando la dose, se necessario.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono stati segnalati effetti imputabili alla somministrazione di questo medicinale.

**EVION contiene saccarosio, lattosio , glucosio.** Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

**EVION contiene anche glicerolo.** Può causare mal di testa, disturbi gastrici e diarrea.

## **3. Come prendere EVION**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è da 1 a 3 compresse da 100 mg al giorno o secondo prescrizione del medico.

### **Se prende più EVION di quanto deve**

Per assunzioni ad alte dosi possono comparire disturbi gastrointestinali, stanchezza e debolezza muscolare, tromboflebite, tromboembolismo polmonare, creatinuria ed aumento dell'attività creatin-chinasica del siero.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

- disturbi gastrointestinali.
- stanchezza
- debolezza muscolare
- tromboflebite (infiammazione delle vene con formazione di coaguli)
- tromboembolismo polmonare (presenza di piccoli coaguli nelle arterie polmonari),
- creatinuria (aumento dell'eliminazione nelle urine della creatina)
- aumento dell'attività creatin-chinasica (proteina che interviene nella produzione di energia) del siero

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare EVION**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene EVION**

- Il principio attivo è d,l-alfa-tocoferil acetato. Una compressa rivestita contiene 100 mg di d,l-alfa-tocoferil acetato.
- Gli altri componenti sono saccarosio, talco, amido di mais, latte magro polvere, estratto di malto, glucosio, magnesio carbonato, aroma di arancio, 2,3-butandione, titanio diossido (E171), calcio carbonato, glicerolo, povidone, ferro ossido rosso (E172), silice colloidale anidra, caolino, cera carnauba, polimeri di metacrilati, metilcellulosa, magnesio ossido.

### **Descrizione dell'aspetto di EVION e contenuto della confezione**

Astuccio da 20 compresse rivestite da 100 mg confezionati in blister di accoppiato polivinile cloruro/Al.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

DOMPE' PRIMARY S.R.L. -VIA SANTA LUCIA 6, 20122 - MILANO (MI).

**Produttore**

Famar Italia S.p.A. - Via Zambelletti, 25 - 20021 Baranzate (MI)  
Bracco S.p.A. Via E. Folli, 50 - 20134 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco