

## **FOGLIO ILLUSTRATIVO**

### **ECOSTERIL 1% crema dermatologica econazolo nitrato**

#### **COMPOSIZIONE**

100 g di crema contengono:

*Principio Attivo:*

Econazolo nitrato 1 g

*Eccipienti:*

Estere poliglicolico di acidi grassi

Glicole propilenico

Metile p-idrossibenzoato

Propile p-idrossibenzoato

Profumo anallergico

Acqua depurata

#### **FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Crema. Astuccio contenente 1 tubo da 30 g di crema dermatologica all'1%

#### **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Antimicotico per uso topico

#### **TITOLARE A.I.C.**

COGITO CONSULTING SRL – Corso Adda 65 – 26900 Lodi

#### **PRODUZIONE E CONTROLLO**

Special Product's Line S.r.l. – Via Campobello 15 – 00040 Pomezia (Roma)

Mastelli S.r.l. - Via Bussana Vecchia, 32 – 18032 Sanremo (Imperia)

#### **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti, muffe.

Infezioni cutanee sostenute da Gram-positivi; onicomicosi; balanite micotica

#### **INFORMAZIONI PER L'USO DEL MEDICINALE**

##### **Controindicazioni**

Ipersensibilità verso uno o più componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

##### **Precauzioni d'impiego**

Nelle donne in stato di gravidanza il farmaco deve essere somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

### **Interazioni**

Evitare l'uso contemporaneo con miconazolo.

### **Avvertenze**

Usare con cautela nelle zone cutanee con caratteristiche eczematose.

L'uso specie se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò accada, interrompere il trattamento e istituire una terapia adeguata.

**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

### **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

Salvo diversa prescrizione medica si consiglia di applicare la crema sulla lesione, con un leggero massaggio, 1 o 2 volte al giorno (mattina e sera) per almeno 10 giorni.

Detergere con garze sterili le zone cutanee infette allo stadio umido (spazi interdigitali della mano e del piede, pieghe dei glutei, ecc.) prima di applicare Ecosteril crema. Nelle onicomicosi si consiglia una medicazione occlusiva.

### **SOVRADOSAGGIO**

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

Tenere presente la possibilità di sviluppo di microorganismi non sensibili. In tale evenienza sospendere il trattamento ed adottare le opportune misure.

L'econazolo è generalmente ben tollerato anche dalle pelli sensibili. In rarissimi casi sono possibili irritazioni locali in zone eczematose: in tali situazioni far precedere la terapia da un trattamento antieczematoso.

Nel caso si verificassero effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo, avvertire il proprio medico o il proprio farmacista.

### **SPECIALI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non congelare.

### **VALIDITÀ**

La specialità medicinale, a confezionamento integro, ha una validità di 36 mesi. La data di scadenza è riportata sulla confezione e sul confezionamento primario.

**ATTENZIONE:** Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

### **ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

## **FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**ECOSTERIL 50 mg ovuli**  
**ECOSTERIL 150 mg ovuli**  
econazolo nitrato

### **COMPOSIZIONE**

Ogni ovulo da 150 mg contiene:

*Principio Attivo:* Econazolo nitrato 150 mg

*Eccipienti:* Trigliceridi di acidi grassi idrogenati

Ogni ovulo da 50 mg contiene:

*Principio Attivo:* Econazolo nitrato 50 mg

*Eccipienti:* Trigliceridi di acidi grassi idrogenati

### **FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Ovuli.

Astuccio contenente 15 ovuli da 50 mg

Astuccio contenente 6 ovuli da 150 mg

### **CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA**

Antimicrobico ed antisettico ginecologico

### **TITOLARE A.I.C.:**

COGITO CONSULTING SRL – Corso Adda 65 – 26900 Lodi

### **PRODUZIONE E CONTROLLO:**

Special Product's Line S.r.l. – Via Campobello 15 – 00040 Pomezia (Roma)

Mastelli S.r.l. - Via Bussana Vecchia, 32 – 18032 Sanremo (Imperia)

### **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

Micosi vulvovaginali (pure o miste)

### **INFORMAZIONI PER L'USO DEL MEDICINALE**

#### **Controindicazioni**

Ipersensibilità verso uno o più componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

#### **Precauzioni d'impiego**

Nelle donne in stato di gravidanza il farmaco deve essere somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

Tenere presente la possibilità di sviluppo di microorganismi non sensibili. In tale evenienza, sospendere il trattamento e adottare le opportune misure.

### **Interazioni**

Evitare l'uso contemporaneo con miconazolo.

### **Avvertenze**

L'uso specie prolungato di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò accada, interrompere il trattamento e istituire una terapia adeguata.

**Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

### **DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE**

Salvo diversa prescrizione medica la terapia consigliata è la seguente:

Ovuli da 50 mg: 1 ovulo, ogni sera prima di coricarsi, per non meno di 15 giorni.

Ovuli da 150 mg: 1 ovulo, ogni sera prima di coricarsi, per 3 sere consecutive.

Assicurarsi di introdurre l'ovulo in profondità nella vagina.

Il trattamento deve essere protratto anche dopo la scomparsa dei disturbi soggettivi (prurito, leucorrea).

### **SOVRADOSAGGIO**

Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

Le reazioni indesiderabili (eruzioni cutanee, cefalea, bruciore, irritazione vaginale e crampi pelvici) sono, nei rari casi di comparsa, modeste e transitorie, tali però da richiedere la consultazione del medico curante che valuterà l'opportunità di interrompere il trattamento.

Nel caso si verificassero effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo, avvertire il proprio medico o il proprio farmacista.

### **SPECIALI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

### **VALIDITÀ**

La specialità medicinale, a confezionamento integro, ha una validità di 36 mesi. La data di scadenza è riportata sulla confezione e sul confezionamento primario.

**ATTENZIONE:** Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

### **ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**