

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

**Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo**  
**Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone**  
**Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo 6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia**  
alcool benzilico, sodio benzoato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento non superiore ai 10 giorni.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo
3. Come usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Che cos'è Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo e a cosa serve**

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo contiene i principi attivi alcool benzilico e sodio benzoato ed appartiene ad una categoria di farmaci detti antisettici (antibatterici) del cavo orofaringeo (bocca e gola).

L'alcool benzilico calma il dolore e il senso di bruciore mentre il sodio benzoato agisce come antisettico (antibatterico) e anticatarrale (rende più fluide le secrezioni delle vie respiratorie), rendendo più facile la deglutizione della saliva e degli alimenti.

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie è indicata per calmare il senso di bruciore e dolore dovuto alle infiammazioni della bocca e della gola in quanto ha un'azione disinfettante e antibatterica nei confronti di germi che possono provocare malattie del cavo orofaringeo (bocca e gola).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un periodo di trattamento non superiore a 10 giorni

### **2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

#### **NON usi Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

- se è allergico all'alcool benzilico o al sodio benzoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo pastiglie.

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico.

### **Bambini**

Non somministri il medicinale ai bambini al di sotto dei 6 anni perché la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state stabilite per questa fascia d'età.

### **Altri medicinali e Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

In gravidanza Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo deve essere usato solo dopo aver consultato il medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

### **Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo contiene zucchero**

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo contiene zucchero, ciò è da tenere in considerazione in caso di diabete o di diete ipocaloriche.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

## **3. Come usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 2 - 3 ore fino ad un massimo giornaliero di 8 pastiglie.

Non superare le dosi indicate.

Le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicinale.

Consulti il medico se non nota risultati apprezzabili dopo breve periodo di trattamento (non superiore a 10 giorni).

### **Uso nei bambini**

Nei bambini dai 6 ai 10 anni: una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 5 - 6 ore fino ad un massimo giornaliero di 4 pastiglie.

### **Se prende più Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo di quanto deve**

Avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino in caso di ingestione accidentale di una dose superiore a quella raccomandata per l'assunzione giornaliera di questo medicinale.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I componenti di questo medicinale sono sostanze ben tollerate e pertanto la somministrazione di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo non presenta di norma effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usi questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo**

Pastiglie gusto mentolo eucaliptolo

- I principi attivi sono alcool benzilico e sodio benzoato. Una pastiglia contiene 6,4 mg di alcool benzilico e 52 mg di sodio benzoato (equivalente a 44,1 mg di acido benzoico).
- Gli altri componenti sono saccarosio, glucosio, essenza menta, levomentolo, cineolo, indigotina (E132), estratto di curcumina (E100).

Pastiglie gusto miele limone

- I principi attivi sono alcool benzilico e sodio benzoato. Una pastiglia contiene 6,4 mg di alcool benzilico e 52 mg di sodio benzoato (equivalente a 44,1 mg di acido benzoico).
- Gli altri componenti sono saccarosio, glucosio, aroma limone, aroma miele, levomentolo, aroma agrumix.

Pastiglie gusto arancia

- I principi attivi sono alcool benzilico e sodio benzoato. Una pastiglia contiene 6,4 mg di alcool benzilico e 52 mg di sodio benzoato (equivalente a 44,1 mg di acido benzoico).
- Gli altri componenti sono saccarosio, glucosio, aroma arancio, levomentolo, aroma agrumix.

### **Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo e contenuto della confezione**

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo si presenta in forma di pastiglie; è disponibile nei gusti mentolo eucaliptolo, miele limone e arancia.

Confezioni da 10, 16, 18, 20, 36 pastiglie.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Alfasigma S.p.A. – Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (MI)

Produttore:

Alfasigma S.p.A. – Via E. Fermi, n. 1 – 65020 Alanno (PE)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a**

Agosto 2017

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo 6,4 mg + 52 mg compresse orosolubili alcool benzilico, sodio benzoato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento non superiore ai 10 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili
3. Come usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili e a cosa serve**

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili contiene i principi attivi alcool benzilico e sodio benzoato, ed appartiene ad una categoria di farmaci detti antisettici (antibatterici) del cavo orofaringeo (bocca e gola).

L'alcool benzilico calma il dolore ed il senso di bruciore mentre il sodio benzoato agisce come antisettico (antibatterico) e anticatarrale (rende più fluide le secrezioni delle vie respiratorie), rendendo più facile la deglutizione della saliva e degli alimenti.

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili è indicata per calmare il senso di bruciore e dolore dovuto alle infiammazioni della bocca e della gola in quanto hanno un'azione disinfettante e antibatterica nei confronti di numerosi germi che possono provocare malattie del cavo orofaringeo (bocca e gola)

Si rivolga al medico o al farmacista se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un periodo di trattamento non superiore ai 10 giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

##### **NON usi Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

- se è allergico all'alcool benzilico o al sodio benzoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è affetto da una rara malattia detta fenilchetonuria, perché contiene aspartame.

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili.

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili non contengono zucchero e possono essere utilizzate da chi deve evitare di assumere saccarosio (zucchero).

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico.

### **Bambini**

Non somministri il medicinale ai bambini al di sotto dei 6 anni perché la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state stabilite per questa fascia d'età.

### **Altri medicinali e Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In caso stiate usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

In gravidanza Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili deve essere usata solo dopo aver consultato il medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

### **Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili contiene aspartame**

Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

## **3. Come usare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Una compressa da sciogliere lentamente in bocca ogni 2 - 3 ore fino ad un massimo giornaliero di 8 compresse.

Non superare le dosi indicate.

Le compresse vanno sciolte lentamente in bocca per mantenere il più a lungo possibile la mucosa sotto l'azione del medicinale.

Consulti il medico se non nota risultati apprezzabili dopo breve periodo di trattamento (non superiore a 10 giorni).

### **Uso nei bambini**

Nei bambini dai 6 ai 10 anni: una compressa da sciogliere lentamente in bocca ogni 5 - 6 ore fino ad un massimo giornaliero di 4 compresse.

### **Se prende più Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili di quanto deve**



Avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino in caso di ingestione accidentale di una dose superiore a quella raccomandata per l'assunzione giornaliera di questo medicinale.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I componenti di questo medicinale sono sostanze ben tollerate e pertanto la somministrazione di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili non presenta di norma effetti indesiderati.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili**

- I principi attivi sono alcool benzilico e sodio benzoato. Una compressa contiene 6,4 mg di alcool benzilico e 52 mg di sodio benzoato.
- Gli altri componenti sono: mannitolo, polivinilpirrolidone K30, aroma menta polvere, magnesio stearato, silice precipitata, aroma eucalipto polvere, aspartame, aroma limone polvere.

##### **Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili e contenuto della confezione**

Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo compresse orosolubili si presenta in forma di compresse da sciogliere in bocca ed è disponibile in confezioni da 30 compresse.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
Alfasigma S.p.A. – Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (MI)

Produttore:  
Alfasigma S.p.A. – Via E. Fermi, n. 1 – 65020 Alanno (PE)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a**  
Agosto 2017

Agenzia Italiana del Farmaco