

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Salonpas soluzione cutanea metile salicilato/mentolo/canfora

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas
3. Come usare Salonpas
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Salonpas
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve

Salonpas contiene i principi attivi metile salicilato, mentolo e canfora. Salonpas è usato per ridurre il dolore locale.

Salonpas è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di:

- malattie dolorose delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli di origine reumatica e traumatica;
- torcicollo;
- dolori intercostali;
- strappi muscolari;
- contusioni e distorsioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas

Non usi Salonpas

- se è allergico al metile salicilato, al mentolo, alla canfora o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è in età pediatrica.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Salonpas.

Interrompa il trattamento con Salonpas e si rivolga al medico:

- se il dolore persiste dopo 3 giorni di trattamento;
- se manifesta irritazioni, reazioni allergiche o altre reazioni sulla pelle, perché l'uso dei prodotti locali, specie se ripetuto o prolungato, può provocare queste reazioni. In questi casi il medico le prescriverà una terapia idonea.

Faccia particolare attenzione:

- non usi dosi eccessive di Salonpas e non usi Salonpas per più di 3 giorni perché potrebbero comparire disturbi neurologici e psicologici;
- non spruzzi la soluzione vicino agli occhi, alle mucose o a zone di pelle irritate o con ferite;
- non spruzzi la soluzione in modo continuo (più di 2-5 secondi) sulla stessa zona di pelle;
- la soluzione è infiammabile, non avvicini il contenitore alle fiamme e non spruzzi la soluzione su fiamme o corpi incandescenti;
- il recipiente è sottopressione;
- non perforare o bruciare il contenitore dopo l'uso.

Bambini e adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica. Questo medicinale contiene derivati terpenici (mentolo e canfora) che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini.

Altri medicinali e Salonpas

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Salonpas non deve essere usato in concomitanza con altri medicinali o cosmetici contenenti derivati terpenici (ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpinina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina), indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Salonpas non è raccomandato durante la gravidanza o in donne in età fertile che usano misure contraccettive.

Allattamento

Non usi Salonpas durante l'allattamento.

Se è incinta o se sta allattando e deve usare Salonpas, si rivolga al medico che valuterà l'effettiva necessità del trattamento e la terrà sotto controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Salonpas non influenza la capacità di guida o l'uso di macchinari.

3. Come usare Salonpas

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 3-4 applicazioni al giorno in base alla sua condizione. Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.

Come usare Salonpas

- Agiti bene la soluzione prima di usarla;
- Spruzzi una quantità sufficiente di soluzione sulla zona da trattare;
- Mentre spruzza la soluzione tenga il contenitore a distanza di circa 10 cm dalla zona di pelle da trattare;
- Non spruzzi la soluzione in modo continuo (più di 2-5 secondi) sulla stessa zona di pelle.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica.

Se usa più Salonpas di quanto deve

In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Salonpas, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Salonpas

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Salonpas

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi con frequenza non nota i seguenti effetti indesiderati, generalmente transitori:

- irritazione della pelle;
- eruzioni sulla pelle dovute ad allergia;
- infiammazione della pelle di natura allergica dovuta al contatto con il medicinale (dermatite da contatto);
- ustioni nella sede di applicazione.

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini e negli adolescenti

A causa della presenza di mentolo e canfora e se non vengono osservate le dosi raccomandate, può esservi il rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Salonpas

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 50°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Il prodotto è infiammabile, non deve essere avvicinato a fiamme o spruzzato su corpi incandescenti.

Non perforare o bruciare il contenitore dopo l'uso.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scade". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Salonpas

- I principi attivi sono metile salicilato, mentolo e canfora. 100 mL di soluzione contengono metile salicilato 1,75 g, mentolo 3,20 g, canfora 3 g.
- Gli altri componenti sono benzile nicotinato, glicole salicilato, squalano, gas di petrolio liquefatto.

Descrizione dell'aspetto di Salonpas e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene un contenitore sotto pressione da 80 mL o 120 mL dotato di valvola spray.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Salonpas cerotti medicati metile salicilato/mentolo/canfora

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas
3. Come usare Salonpas
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Salonpas
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve

Salonpas contiene i principi attivi metile salicilato, mentolo e canfora. Salonpas è usato per ridurre il dolore locale.

Salonpas è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di:

- malattie dolorose delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
- dolori dei muscoli e delle articolazioni di origine reumatica;
- torcicollo;
- dolori intercostali;
- stiramenti muscolari;
- dolore dopo contusioni e distorsioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento, in particolare se compare un eccessivo rossore, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas

Non usi Salonpas

- se è allergico al metile salicilato, al mentolo, alla canfora o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è in età pediatrica.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Salonpas.

Interrompa il trattamento con Salonpas e si rivolga al medico:

- se il dolore persiste per più di 5-7 giorni, in particolare se si manifesta eccessivo rossore;
- se manifesta reazioni allergiche o altre reazioni sulla pelle, perché l'uso dei prodotti locali, specie se prolungato, può provocare queste reazioni. In questi casi il medico le prescriverà una terapia idonea;
- se la pelle diventa irritata.

Faccia particolare attenzione:

- non applichi il cerotto su zone della pelle irritate;
- non applichi il cerotto vicino agli occhi e alle mucose;

Il trattamento non deve essere prolungato per più di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprietà lipofile non è nota la velocità di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici.

Bambini e adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica. Questo medicinale contiene derivati terpenici (mentolo e canfora) che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini.

Altri medicinali e Salonpas

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Salonpas non deve essere usato in concomitanza con altri medicinali o cosmetici contenenti derivati terpenici indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Salonpas non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

Allattamento

Non usi Salonpas durante l'allattamento.

Se è incinta o se sta allattando e deve usare Salonpas, si rivolga al medico che valuterà l'effettiva necessità del trattamento e la terrà sotto controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Salonpas non influenza la capacità di guida o l'uso di macchinari.

Salonpas contiene gomma naturale (latex) e dibutilidrossitoluene

Il cerotto di questo medicinale è costituito di gomma latex. Può causare gravi reazioni allergiche.

Salonpas contiene dibutilidrossitoluene, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.

3. Come usare Salonpas

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 applicazioni al giorno. Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.

Come applicare Salonpas

- Pulisca e asciughi la parte di pelle colpita.
- Stacchi il cerotto adesivo dal supporto
- Applichi uno o più cerotti sulla parte dolente.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento, in particolare se compare un eccessivo rossore, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica.

Se usa più Salonpas di quanto deve

In caso di uso di una dose eccessiva di Salonpas, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Salonpas

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Salonpas

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi con frequenza non nota i seguenti effetti indesiderati, generalmente transitori:

- irritazione della pelle;
- eruzioni sulla pelle dovute ad allergia;
- infiammazione della pelle di natura allergica dovuta al contatto con il medicinale (dermatite da contatto);
- ustioni nella sede di applicazione.

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini e negli adolescenti

A causa della presenza di mentolo e canfora e se non vengono osservate le dosi raccomandate, può esservi il rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Salonpas

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scade" La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Salonpas

- I principi attivi sono metile salicilato, mentolo e canfora. Ogni cerotto contiene metile salicilato 36,06 mg, mentolo 32,73 mg, canfora 7,11 mg.
- Gli altri componenti sono zinco ossido, alfa-tocoferolo acetato, gomma naturale, gomma butilica, estere del glicerolo di colofonia idrogenata, estere del glicerolo di colofonia maleata, polibutilene, silice colloidale idrata, titanio diossido, amido acrilato 1000, dibutilidrossitoluene, profumo S529.

Descrizione dell'aspetto di Salonpas e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene 10 cerotti adesivi da 6,5 x 4,2 cm per uso esterno.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50

20019 Settimo Milanese (MI)

Alfasigma S.p.A. - Via Pontina Km 30,400 - 00071 Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Salonpas cerotti medicati metile salicilato/mentolo/canfora

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas
3. Come usare Salonpas
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Salonpas
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Salonpas e a cosa serve

Salonpas contiene i principi attivi metile salicilato, mentolo e canfora. Salonpas è usato per ridurre il dolore locale.

Salonpas è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di:

- malattie dolorose delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
- dolori dei muscoli e delle articolazioni di origine reumatica;
- torcicollo;
- dolori intercostali;
- stiramenti muscolari;
- dolore dopo contusioni e distorsioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento, in particolare se compare un eccessivo rossore, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

2. Cosa deve sapere prima di usare Salonpas

Non usi Salonpas

- se è allergico al metile salicilato, al mentolo, alla canfora o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è in età pediatrica.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Salonpas.

Interrompa il trattamento con Salonpas e si rivolga al medico:

- se il dolore persiste per più di 5-7 giorni, in particolare se si manifesta eccessivo rossore;
- se manifesta reazioni allergiche o altre reazioni sulla pelle, perché l'uso dei prodotti locali, specie se prolungato, può provocare queste reazioni. In questi casi il medico le prescriverà una terapia idonea;
- se la pelle diventa irritata.

Faccia particolare attenzione:

- non applichi il cerotto su zone della pelle irritate;
- non applichi il cerotto vicino agli occhi e alle mucose;

Il trattamento non deve essere prolungato per più di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprietà lipofile non è nota la velocità di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici.

Bambini e adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica. Questo medicinale contiene derivati terpenici (mentolo e canfora) che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini.

Altri medicinali e Salonpas

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Salonpas non deve essere usato in concomitanza con altri medicinali o cosmetici contenenti derivati terpenici indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Salonpas non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

Allattamento

Non usi Salonpas durante l'allattamento.

Se è incinta o se sta allattando e deve usare Salonpas, si rivolga al medico che valuterà l'effettiva necessità del trattamento e la terrà sotto controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Salonpas non influenza la capacità di guida o l'uso di macchinari.

Salonpas contiene gomma naturale (latex) e dibutilidrossitoluene

Il cerotto di questo medicinale è costituito di gomma latex. Può causare gravi reazioni allergiche.

Salonpas contiene dibutilidrossitoluene, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.

3. Come usare Salonpas

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 applicazioni al giorno. Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.

Come applicare Salonpas

- Pulisca e asciughi la parte di pelle colpita.
- Stacchi il cerotto adesivo dal supporto
- Applichi il cerotto sulla parte dolente.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento, in particolare se compare un eccessivo rossore, se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Uso nei bambini e negli adolescenti

Salonpas non deve essere usato nei pazienti in età pediatrica.

Se usa più Salonpas di quanto deve

In caso di uso di una dose eccessiva di Salonpas, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Salonpas

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Salonpas

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi con frequenza non nota i seguenti effetti indesiderati, generalmente transitori:

- irritazione della pelle;
- eruzioni sulla pelle dovute ad allergia;
- infiammazione della pelle di natura allergica dovuta al contatto con il medicinale (dermatite da contatto);
- ustioni nella sede di applicazione.

Effetti indesiderati aggiuntivi nei bambini e negli adolescenti

A causa della presenza di mentolo e canfora e se non vengono osservate le dosi raccomandate, può esservi il rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Salonpas

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scade" La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Salonpas

- I principi attivi sono metile salicilato, mentolo e canfora. Ogni cerotto contiene metile salicilato 144,24 mg, mentolo 130,92 mg, canfora 28,44 mg.
- Gli altri componenti sono zinco ossido, alfa-tocoferolo acetato, gomma naturale, gomma butilica, estere del glicerolo di colofonia idrogenata, estere del glicerolo di colofonia maleata, polibutilene, silice colloidale idrata, titanio diossido, amido acrilato 1000, dibutilidrossitoluene, profumo S529.

Descrizione dell'aspetto di Salonpas e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene 2 cerotti adesivi da 13 x 8,4 cm per uso esterno.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Enrico Fermi, 50

20019 Settimo Milanese (MI)

Alfasigma S.p.A. - Via Pontina Km 30,400 - 00071 Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il