

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Debridat 100 mg supposte trimebutina maleato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Debridat
3. Come usare Debridat
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Debridat
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve

Debridat contiene il principio attivo trimebutina, una sostanza che regola la motilità del tratto gastrointestinale.

Debridat è indicato in caso di:

- sindrome del colon irritabile
- alterazione della motilità dell'esofago e dello stomaco.

2. Cosa deve sapere prima di usare Debridat

Non usi Debridat

- se è allergico alla trimebutina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha un'occlusione intestinale causata da paralisi dell'intestino (ileo paralitico) o altre malattie caratterizzate da un'ostruzione dell'apparato gastrointestinale
- se ha la colite ulcerosa, una malattia infiammatoria e ulcerosa cronica del colon
- se ha il megacolon tossico, una malattia caratterizzata da una notevole dilatazione del colon.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Debridat.

Altri medicinali e Debridat

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni della trimebutina con altri medicinali.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico prima di usare questo medicinale.

Non usi Debridat nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, senza aver prima consultato il medico.

Non sono stati effettuati studi clinici con Debridat sulla fertilità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Debridat può causare vertigini, capogiri e disturbi della vista che possono influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Se presenta o ha presentato in passato questi sintomi eviti di guidare un veicolo o di usare macchinari. .

3. Come usare Debridat

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 2-3 supposte al giorno.

Se prende più Debridat di quanto deve

In caso di somministrazione di una dose eccessiva di Debridat, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Sono stati riportati casi di abuso intenzionale, tentativo di suicidio o di uso accidentale di una dose eccessiva di Debridat.

Dosi eccessive di Debridat, assunte per via orale, hanno causato perdita di coscienza, coma, sonnolenza, convulsioni, disturbi del linguaggio, restringimento delle pupille, interruzioni transitorie del respiro, sudorazione profusa, battito del cuore accelerato, pressione alta, modificazioni dell'elettrocardiogramma. Questi effetti sono comparsi entro 3 ore dall'assunzione della trimebutina.

Se dimentica di usare Debridat

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Debridat

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Mal di testa
- Dolore addominale
- Stitichezza
- Diarrea
- Bocca secca
- Difficoltà nella digestione

- Nausea
- Vomito
- Eruzioni sulla pelle
- Stanchezza

Effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili))

- Disturbi psichici correlati all'uso di sostanze e da dipendenza
- Sonnolenza
- Vertigine
- Prurito
- Urticaria

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Debridat

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Debridat

- Il principio attivo è la trimebutina maleato. Ogni supposta contiene 100 mg di trimebutina maleato.
- Gli altri componenti sono gliceridi semisintetici.

Descrizione dell'aspetto di Debridat e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene 10 supposte.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

Alfasigma S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00071 Pomezia (RM).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Debridat 150 mg capsule molli trimebutina maleato

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale trimebutina base

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Debridat
3. Come prendere Debridat
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Debridat
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve

Debridat contiene il principio attivo trimebutina, una sostanza che regola la motilità del tratto gastrointestinale.

Debridat è indicato in caso di:

- sindrome del colon irritabile
- alterazione della motilità dell'esofago e dello stomaco.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Debridat

Non usi Debridat

- se è allergico alla trimebutina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha un'occlusione intestinale causata da paralisi dell'intestino (ileo paralitico) o altre malattie caratterizzate da un'ostruzione dell'apparato gastrointestinale
- se ha la colite ulcerosa, una malattia infiammatoria e ulcerosa cronica del colon
- se ha il megacolon tossico, una malattia caratterizzata da una notevole dilatazione del colon
- se è allergico alle arachidi o alla soia (vedere paragrafo "Debridat contiene sodio etileparaidrossibenzoato, sodio propileparaidrossibenzoato, soia e olio di arachidi").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Debridat.

Altri medicinali e Debridat

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni della trimebutina con altri medicinali.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Non usi Debridat nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, senza aver prima consultato il medico.

Non sono stati effettuati studi clinici con Debridat sulla fertilità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Debridat può causare vertigini e sonnolenza che possono influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Se presenta o ha presentato in passato questi sintomi eviti di guidare un veicolo o di usare macchinari.

Debridat 150 mg capsule molli contiene sodio etileparaidrossibenzoato, sodio propileparaidrossibenzoato, olio di soia

Sodio etileparaidrossibenzoato e sodio propileparaidrossibenzoato possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Questo medicinale contiene soia. Se è allergico alle arachidi o alla soia, non usi questo medicinale.

Questo medicinale contiene olio di soia. Non lo usi se è allergico alle arachidi o alla soia.

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale contiene sodio metilparaidrossibenzoato e saccarosio

Sodio metilparaidrossibenzoato può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Debridat contiene saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 18 g di saccarosio per dose (45 mL). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito. Può essere dannoso per i denti.

3. Come prendere Debridat

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Debridat 150 mg capsule molli

La dose raccomandata è 2-3 capsule al giorno (pari 300-450 mg al giorno). L'uso delle capsule è consigliato nell'adulti.

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale

Uso negli adulti

La dose raccomandata di sospensione ricostituita è dai 30 ai 45 mL al giorno (ossia 2-3 cucchiaini da minestra).

Uso nei bambini

Bambini fino a 6 mesi di età

La dose raccomandata di sospensione ricostituita è 2,5 mL (ossia mezzo cucchiaino da caffè) 3 volte al giorno.

Bambini dai 6 mesi ad 1 anno di età

La dose raccomandata di sospensione ricostituita è 5 mL (ossia 1 cucchiaino da caffè) 2 volte al giorno.

Bambini da 1 anno a 5 anni di età

La dose raccomandata di sospensione ricostituita è 5 mL (ossia 1 cucchiaino da caffè) 3 volte al giorno.

Bambini sopra i 5 anni di età

La dose raccomandata di sospensione ricostituita è 10 mL (ossia 2 cucchiaini da caffè) 3 volte al giorno.

Come preparare la sospensione orale di Debridat

- Aggiunga poco alla volta acqua di fonte al flacone, finché l'acqua non raggiunge la linea in rilievo sul contenitore
- Agiti bene il flacone prima di prendere Debridat

1 mL di sospensione ricostituita contiene 4,8 mg di trimebutina. Un cucchiaino da caffè convenzionalmente corrisponde a 5 mL (pari a 24 mg di trimebutina) e un cucchiaio da minestra convenzionalmente corrisponde a 15 mL (pari a 72 mg di trimebutina).

Se prende più Debridat di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Debridat, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Sono stati riportati casi di abuso intenzionale, tentativo di suicidio o di uso accidentale di una dose eccessiva di Debridat. Dosi eccessive di Debridat hanno causato perdita di coscienza, coma, sonnolenza, convulsioni, disturbi del linguaggio, restringimento delle pupille, interruzioni transitorie del respiro, sudorazione profusa, battito del cuore accelerato, pressione alta, modificazioni dell'elettrocardiogramma. Questi effetti sono comparsi entro 3 ore dall'assunzione di una dose eccessiva di trimebutina.

Se dimentica di prendere Debridat

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Debridat

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Mal di testa
- Dolore addominale
- Stitichezza
- Diarrea
- Bocca secca
- Difficoltà nella digestione
- Nausea
- Vomito
- Eruzioni sulla pelle

- Stanchezza

Effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili))

- Disturbi psichici correlati all'uso di sostanze e da dipendenza
- Sonnolenza
- Vertigine
- Prurito
- Urticaria

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Debridat

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale

Usi la sospensione ricostituita entro 20 giorni dalla ricostituzione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Debridat

Debridat 150 mg capsule molli

- Il principio attivo è la trimebutina maleato. Ogni capsula molle contiene 150 mg di trimebutina maleato. Gli altri componenti sono olio di soia, olii vegetali idrogenati, cera d'api, lecitina di soia, olio di soia idrogenato, gelatina, glicerolo, , sodio etileparaidrossibenzoato, sodio propileparaidrossibenzoato, titanio biossido.

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale

- Il principio attivo è la trimebutina base. 100 g di granulato per sospensione orale contiene 787 mg di trimebutina base.
- Gli altri componenti sono sodio metilparaidrossibenzoato, aroma arancia polvere, saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di Debridat e contenuto della confezione

Debridat 150 mg capsule molli

Ogni confezione di Debridat 150 mg capsule molli contiene 1 blister da 20 capsule molli.

Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale

Ogni confezione di Debridat 72 mg/15 mL granulato per sospensione orale contiene 1 flacone da 250 mL di sospensione estemporanea.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

Alfasigma S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00071 Pomezia (RM).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Debridat 50 mg soluzione iniettabile trimebutina maleato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Debridat
3. Come usare Debridat
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Debridat
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Debridat e a cosa serve

Debridat contiene il principio attivo trimebutina, una sostanza che regola la motilità del tratto gastrointestinale.

Debridat è indicato in caso di:

- sindrome del colon irritabile
- alterazione della motilità dell'esofago e dello stomaco
- perdita del tono dei muscoli intestinali con conseguente alterazione della motilità dell'intestino, dopo un'operazione chirurgica
- preparazione a un'endoscopia del tratto gastrointestinale.

2. Cosa deve sapere prima di usare Debridat

Non usi Debridat

- se è allergico alla trimebutina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha un'occlusione intestinale causata da paralisi dell'intestino (ileo paralitico) o altre malattie caratterizzate da un'ostruzione dell'apparato gastrointestinale
- se ha la colite ulcerosa, una malattia infiammatoria e ulcerosa cronica del colon
- se ha il megacolon tossico, una malattia caratterizzata da una notevole dilatazione del colon
- nei bambini sotto i 3 anni di età. (vedere paragrafo "Debridat contiene alcool benzilico e sodio").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Debridat.

Faccia attenzione perchè l'impiego della soluzione iniettabile deve avvenire sotto il diretto controllo del medico.

Altri medicinali e Debridat

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni della trimebutina con altri medicinali.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di usare questo medicinale

Non usi Debridat nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, senza aver prima consultato il medico.

Non sono stati effettuati studi clinici con Debridat sulla fertilità

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Debridat può causare vertigini e sonnolenza che possono influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Se presenta o ha presentato in passato questi sintomi eviti di guidare un veicolo o di usare macchinari.

Debridat contiene alcool benzilico e sodio

Debridat contiene alcool benzilico (25 mg/5 mL). L'alcool benzilico può causare reazioni allergiche. L'alcool benzilico è stato associato al rischio di gravi effetti indesiderati inclusi problemi respiratori (sindrome da respiro agonico) nei bambini piccoli.

Non somministri a neonati fino a 4 settimane di età se non diversamente raccomandato dal medico. Non usi per più di una settimana nei bambini piccoli (meno di 3 anni di età) se non diversamente raccomandato dal medico o dal farmacista. Vedere paragrafo "Non usi Debridat".

Chiedi consiglio al tuo medico o al farmacista se è in stato di gravidanza, se la sospetta o la sta pianificando, o se sta allattando con latte materno in quanto l'alcool benzilico, contenuto nelle fiale, può accumularsi nel suo organismo e causare effetti indesiderati (come l'acidosi metabolica).

Chiedi consiglio al tuo medico o al farmacista se ha malattie del fegato o del rene in quanto l'alcool benzilico, contenuto nelle fiale, può accumularsi nel suo organismo e causare effetti indesiderati (come l'acidosi metabolica).

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per fiala, cioè è essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come usare Debridat

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Il medico o altro personale sanitario le somministrerà Debridat.

Uso di Debridat in chirurgia

La dose raccomandata è 2-3 fiale (100-150 mg) al giorno, che può essere iniettata nel muscolo o in vena.

Uso di Debridat durante endoscopia del tratto gastro-intestinale

La dose raccomandata è 1-2 fiale (50-100 mg) al giorno, che può essere iniettata o somministrata localmente.

Se prende più Debridat di quanto deve

In caso di uso di una dose eccessiva di Debridat, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Sono stati riportati casi di abuso intenzionale, tentativo di suicidio o di uso accidentale di una dose eccessiva di Debridat. Sono stati segnalati casi di pressione bassa e perdita di coscienza (lipotimia) in seguito alla somministrazione per via endovenosa di dosi singole superiori a 100 mg e nei casi in cui l'iniezione è stata effettuata troppo velocemente.

Inoltre, dosi eccessive di Debridat, assunte per via orale, hanno causato perdita di coscienza, coma, sonnolenza, convulsioni, disturbi del linguaggio, restringimento delle pupille, interruzioni transitorie del respiro, sudorazione profusa, battito del cuore accelerato, pressione alta, modificazioni dell'elettrocardiogramma. Questi effetti sono comparsi entro 3 ore dall'assunzione della trimebutina.

Se dimentica di usare Debridat

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Debridat

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Mal di testa
- Dolore addominale
- Stitichezza
- Diarrea
- Bocca secca
- Difficoltà nella digestione
- Nausea
- Vomito
- Eruzioni sulla pelle
- Stanchezza

Effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Disturbi psichici correlati all'uso di sostanze e da dipendenza
- Sonnolenza
- Vertigine
- Prurito
- Urticaria

In seguito all'uso delle soluzione endovenosa sono state riportate pressione bassa e perdita di coscienza (lipotimia).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Debridat

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare in frigorifero (2°C-8°C).

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Debridat

- Il principio attivo è la trimebutina maleato. Ogni fiala contiene 50 mg di trimebutina maleato.
- Gli altri componenti sono alcool benzilico, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di Debridat e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene 5 fiale da 5 mL.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

Alfasigma S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00071 Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il